



КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА ЕГЭ

МАТЕМАТИКА

РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ
ПОВЫШЕННОГО И ВЫСОКОГО
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

98

99

100

96

97

95

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Семенов, И. В. Ященко, И. Р. Высоцкий, А. С. Трепалин, Е. А. Ку.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА ЕГЭ

МАТЕМАТИКА

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности



Москва
Издательство «Интеллект-Центр»
2019

УДК 373.167.1:51(075.3)

ББК 22.1я721

М34

Семенов, А. В.

М34 Математика. Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное пособие. / А. В. Семенов, И. В. Яценко, И. Р. Высоцкий, А. С. Трепалин, Е. А. Кукса; Московский Центр непрерывного математического образования. — Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 2019. — 144 с.

ISBN 978-5-907033-93-1

В предлагаемом пособии дана характеристика основных типов заданий повышенного и высокого уровня сложности, используемых на ЕГЭ по математике. Особое внимание уделяется разбору заданий, вызвавших наибольшие затруднения. Для тренировки и самоподготовки к ЕГЭ предлагаются задания с развёрнутым ответом различного уровня сложности по всем содержательным блокам.

Пособие адресовано старшеклассникам, преподавателям и родителям. Оно поможет школьникам проверить свои знания и умения по предмету, а учителям — оценить степень достижения требований образовательных стандартов отдельными учащимися и обеспечить их целенаправленную подготовку к экзамену.

УДК 373.167.1:51(075.3)
ББК 22.1я721

Генеральный директор

М. Б. Миндюк

Редактор *Д. П. Локтионов*

Художественный редактор *Е. Ю. Воробьева*

Компьютерная верстка и макет: *Ю. А. Погодина*

Подписано в печать 15.02.2019 г. Формат 60x84 1/8. Бумага типографская.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,0. Тираж 3000 экз.

Заказ № 204

ООО «Издательство «Интеллект-Центр»

125445, Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 7, пом. I, ком. 14

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография».

140400, г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а.

ИНН 5022013940. Тел.: 8(496) 618-60-16.

E-mail: bab40@yandex.ru, www.kolomna-print.ru

ISBN 978-5-907033-93-1

© ООО «Издательство «Интеллект-Центр», 2019
© МЦНМО, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Уравнения	5
1.1. Тригонометрические уравнения	5
1.2. Показательные уравнения	11
1.3. Логарифмические уравнения	17
1.4. Комбинированные уравнения	22
2. Неравенства и их системы	32
2.1. Рациональные неравенства	32
2.2. Логарифмические неравенства	38
2.3. Показательные неравенства	45
2.4. Системы неравенств	50
3. Задания с параметром	55
4. Стереометрия	75
4.1. Параллелепипеды	75
4.2. Призмы	78
4.3. Треугольные пирамиды	81
4.4. Четырёхугольные пирамиды	86
4.5. Тела вращения	90
5. Планиметрия	94
5.1. Планиметрические задачи (одна конфигурация с окружностью)	94
5.2. Планиметрические задачи (одна конфигурация без окружности)	100
5.3. Планиметрические задачи (две конфигурации)	105
6. Арифметика и алгебра	111
7. Экономические задачи	125
Ответы	137

ВВЕДЕНИЕ

Содержание заданий с развёрнутым ответом контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2019 года не будет отличаться от содержания вариантов 2018 года. Со структурой варианта можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru) в разделе «ЕГЭ: демоверсии, спецификации, кодификаторы». В рамках спецификации экзамена по математике профильного уровня продолжается расширение тематики задач, особенно это касается геометрической части экзамена, а также заданий по началам математического анализа. Указанные изменения нашли своё отражение в книге, которую вы держите в руках.

Вторая часть варианта экзамена по математике содержит задания с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности и предназначается, прежде всего, для будущих абитуриентов технических, экономических, математических и других вузов, предъявляющих повышенные требования к уровню математической подготовки абитуриентов. Именно им и адресовано пособие «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ».

Все решения заданий с развёрнутым ответом должны быть записаны в Бланке ответов № 2 (дополнительном бланке ответов № 2). Обоснованность и полноту решения этих заданий устанавливают эксперты и выставляют баллы в соответствии с Критериями оценивания заданий с развёрнутым ответом (демонстрационный вариант ЕГЭ по математике на сайте ФИПИ).

В пособии собраны задания, которые были в вариантах прошлых лет, диагностических работах. К этим заданиям даны решения, которые предлагались экспертам по проверке заданий с развёрнутым ответом. В каждом разделе сначала даны задания с решениями, а потом задания для самостоятельной работы. Ни в коем случае приведённые решения не претендуют на роль эталона — эти решения даны в очень сжатом виде. Очень часто придётся «расшифровывать» эти решения, дополняя их промежуточными преобразованиями и вычислениями, в них часто лишь обозначены основные этапы решения задачи. Задания пособия можно решать, используя разные подходы и методы, — ведь на экзамене проверяется математическая грамотность решения. Авторы рекомендуют сначала попробовать решить задание самостоятельно, а потом уже знакомиться с авторским решением. После изучения заданий с решениями обязательно нужно решить задания для самостоятельного решения.

Весь материал разбит на главы. Уравнениям (показательным, логарифмическим, тригонометрическим) посвящена первая глава. Вторая глава содержит задания по неравенствам (рациональным, показательным, логарифмическим). В третьей главе собраны задания высокого уровня сложности — задания с параметром. Геометрии посвящены четвёртая (стереометрия) и пятая (планиметрия) главы. В геометрических задачах есть пункт на доказательство какого-либо геометрического факта. Арифметические и алгебраические задачи повышенного и высокого уровня сложности даны в шестой главе. Последняя глава посвящена задачам с экономическим содержанием.

Гарантией успешной сдачи экзамена является систематическое изучение математики, включающее в себя вдумчивое решение математических задач и в школе, и дома, и на курсах подготовки абитуриентов.

При решении заданий повышенного уровня сложности нужно учитывать, что решение должно быть обязательно доведено до ответа — только в этом случае можно рассчитывать на какие-то баллы. В заданиях высокого уровня сложности баллы могут быть выставлены за законченный фрагмент решения. На экзамене нет калькулятора, поэтому в подготовительной работе особо следует уделить внимание вычислениям.

В пособии использованы задачи, предложенные А. Р. Рязановским, П. В. Семёновым, В. С. Панферовым, И. Н. Сергеевым, И. Р. Высоцким, М. Я. Пратусевичем, С. А. Шестаковым, О. Н. Косухиным, А. В. Семеновым, В. А. Смирновым, А. В. Хачатуряном, Р. К. Гординым, А. И. Суздальцевым, Д. А. Фёдоровых, М. А. Волчкевичем.

1. УРАВНЕНИЯ

1.1. Тригонометрические уравнения

1. а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 1 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение:

$$2\cos^2 x - 1 - \sqrt{2} \cos x + 1 = 0; \quad 2\cos^2 x - \sqrt{2} \cos x = 0; \quad \cos x \cdot (2\cos x - \sqrt{2}) = 0.$$


Значит, или $\cos x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{15\pi}{4}$; $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{15\pi}{4}$; $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{5\pi}{2}$.



2. а) Решите уравнение $2\sqrt{3} \sin^2\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin 2x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение:

$$2\sqrt{3} \cos^2 x + 2 \sin x \cdot \cos x = 0; \quad \cos x \cdot (\sin x + \sqrt{3} \cos x) = 0.$$


Значит, $\cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\sqrt{3} \cos x$; $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$; $x = -\frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{10\pi}{3}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{10\pi}{3}$; $-\frac{5\pi}{2}$.



3. а) Решите уравнение $4\cos^4 x - 4\cos^2 x + 1 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение:

$$(2\cos^2 x - 1)^2 = 0; 2\cos^2 x = 1; \cos^2 x = \frac{1}{2},$$


откуда $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ или $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, значит, $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\pi]$.

Получим числа: $-\frac{7\pi}{4}; -\frac{5\pi}{4}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{7\pi}{4}; -\frac{5\pi}{4}$.



4. а) Решите уравнение $\frac{5\cos x + 4}{4\operatorname{tg} x - 3} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Решение.

а) Решим уравнение: $\frac{5\cos x + 4}{4\operatorname{tg} x - 3} = 0; \begin{cases} \cos x = -\frac{4}{5}, \\ \operatorname{tg} x \neq \frac{3}{4}. \end{cases}$

Из уравнения $\cos x = -\frac{4}{5}$ получаем, что $x = \pi - \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = \pi + \arccos \frac{4}{5} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Пусть $\varphi = \arccos \frac{4}{5}$, тогда $\cos \varphi = \frac{4}{5}$ и $\varphi \in (0; \frac{\pi}{2})$, значит $\sin \varphi = \frac{3}{5}$, то есть $\operatorname{tg} \varphi = \frac{3}{4}$. Следовательно, $\operatorname{tg}(\pi + \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n) = \operatorname{tg}(\arccos \frac{4}{5}) = \operatorname{tg} \varphi = \frac{3}{4}$, чего быть не должно.


Получаем решение исходного уравнения: $x = \pi - \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Получим число $-3\pi - \arccos \frac{4}{5}$.

Ответ: а) $\pi - \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

б) $-3\pi - \arccos \frac{4}{5}$.



5. а) Решите уравнение $\frac{5}{\cos^2\left(\frac{13\pi}{2} - x\right)} + \frac{7}{\sin x} - 6 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение: $\frac{5}{\sin^2 x} + \frac{7}{\sin x} - 6 = 0$. Пусть $t = \frac{1}{\sin x}$, тогда уравнение примет вид:

$$5t^2 + 7t - 6 = 0; (5t - 3)(t + 2) = 0, \text{ откуда } t = \frac{3}{5} \text{ или } t = -2.$$

При $t = \frac{3}{5}$ получаем, что $\sin x = \frac{5}{3}$ — нет корней.


При $t = -2$ получаем, что $\sin x = -\frac{1}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Получим число $\frac{11\pi}{6}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{11\pi}{6}$.



6. а) Решите уравнение $2\operatorname{tg}^2 x - \frac{5}{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} + 4 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение: $2\operatorname{tg}^2 x + \frac{5}{\cos x} + 4 = 0$; $\frac{2 - 2\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{5}{\cos x} + 4 = 0$.

Пусть $t = \cos x$, тогда уравнение примет вид:

$$\frac{2 - 2t^2}{t^2} + \frac{5}{t} + 4 = 0; \frac{2t^2 + 5t + 2}{t^2} = 0; \frac{(2t + 1)(t + 2)}{t^2} = 0,$$

откуда $t = -\frac{1}{2}$ или $t = -2$.

При $t = -2$ получаем, что $\cos x = -2$ — нет корней.


При $t = -\frac{1}{2}$ получаем, что $\cos x = -\frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Получим число $\frac{10\pi}{3}$.

Ответ: а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{10\pi}{3}$.



7. а) Решите уравнение $2 \cos(\pi - x) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sqrt{3} \sin x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[-3\pi; -2\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение:

$$2 \cos x \cdot \sin x + \sqrt{3} \sin x = 0; \sin x (2 \cos x + \sqrt{3}) = 0,$$


откуда $\sin x = 0$; $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$.

Получим числа: -3π ; $-\frac{17\pi}{6}$; -2π .

Ответ: а) πn , $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) -3π ; $-\frac{17\pi}{6}$; -2π .




8. а) Решите уравнение $\frac{3 \operatorname{tg}^2 x - 1}{\sqrt{7} \cos x} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Решение.

$$\text{а) } \frac{3 \operatorname{tg}^2 x - 1}{\sqrt{7} \cos x} = 0; \quad \begin{cases} 3 \operatorname{tg}^2 x - 1 = 0, \\ \cos x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \cos x > 0, \end{cases}$$

откуда $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.




б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Получим число $\frac{23\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{23\pi}{6}$.



9. а) Решите уравнение $\frac{8\sin^2 x - 14\sin x + 5}{\sqrt{-6\cos x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{9\pi}{2}; -3\pi]$.


Решение.

а) $\frac{8\sin^2 x - 14\sin x + 5}{\sqrt{-6\cos x}} = 0;$

$$\begin{cases} 8\sin^2 x - 14\sin x + 5 = 0, \\ \cos x < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} (4\sin x - 5)(2\sin x - 1) = 0, \\ \cos x < 0, \end{cases}$$

откуда или $\begin{cases} \sin x = \frac{5}{4}, \\ \cos x < 0, \end{cases}$ — нет корней, или $\begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \cos x < 0; \end{cases}$

$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.




б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{9\pi}{2}; -3\pi]$.

Получим число $-\frac{19\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{19\pi}{6}$.



10. а) Решите уравнение $\frac{\sqrt{2}\sin^2 x - \cos x - \sqrt{2}}{\sqrt{-5\sin x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.


Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение:

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}\cos^2 x - \cos x - \sqrt{2}}{\sqrt{-5\sin x}} = 0; \quad \frac{\cos x(\sqrt{2}\cos x + 1)}{\sqrt{-5\sin x}} = 0,$$

откуда $\begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x < 0; \end{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $\begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \sin x < 0; \end{cases}$

$x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.




б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Получим числа: $\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}$.



Задания для самостоятельного решения

- а) Решите уравнение $\cos 2x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
- а) Решите уравнение $2\cos^2\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \sin 2x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.
- а) Решите уравнение $16\cos^4 x - 24\cos^2 x + 9 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; 3\pi]$.
- а) Решите уравнение $\frac{5\operatorname{tg}x - 12}{13\cos x - 5} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[4\pi; \frac{11\pi}{2}\right]$.
- а) Решите уравнение $\frac{5}{\sin^2 x} - \frac{9}{\cos\left(\frac{7\pi}{2} + x\right)} + 4 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
- а) Решите уравнение $4\operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{\sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)} + 1 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.
- а) Решите уравнение $2\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cdot \sin(x - \pi) + \sqrt{2}\cos x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{5\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}\right]$.
- а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg}^2 x - 3}{\sqrt{3}\sin x} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
- а) Решите уравнение $\frac{6\sin^2 x - 5\sin x - 4}{\sqrt{-2\cos x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.
- а) Решите уравнение $\frac{2\sqrt{3}\cos^2 x + 3\sin x - 2\sqrt{3}}{\sqrt{8\cos x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

1.2. Показательные уравнения

В этом разделе при отборе корней часто приходится пользоваться не только приближёнными значениями логарифмических выражений, но и свойствами логарифмов. Далее приведём примеры оценки и сравнения чисел.

$$1. \log_7 48 < \log_7 49 = 2.$$

$$2. \log_7 \sqrt{50} > \log_7 \sqrt{49} = 1.$$

3. $\log_{30} 3 = \frac{1}{\log_3 30}$. Поскольку $30 > 27$, $\log_3 30 > \log_3 27$ (основание логарифма больше 1), следовательно, $\frac{1}{\log_3 30} < \frac{1}{\log_3 27} = \frac{1}{3}$, а значит, $\log_{30} 3 < \frac{1}{3}$.

С другой стороны, $30 < 81$, откуда $\log_3 30 < \log_3 81 = 4$, а значит, $\log_{30} 3 > \frac{1}{4}$.

4. Сравним $\log_{0,3} 10$ и -2 несколькими способами.

$$\text{Первый способ: } \log_{0,3} 10 = \log_{\frac{3}{10}} 10 = \frac{1}{\lg \frac{3}{10}} = \frac{1}{\lg 3 - \lg 10} = \frac{1}{\frac{1}{\log_3 10} - 1} = -\frac{\log_3 10}{\log_3 10 - 1}.$$

Далее будем преобразовывать неравенство по классическим правилам, при этом левую и правую часть при необходимости будем менять местами так, чтобы знак неравенства (изначально обозначим его « \vee ») оставался неизменным. Когда сравнение левой и правой части станет очевидным, вместо « \vee » подставим нужный знак и, пройдя цепочку преобразований в обратном порядке, получим необходимое сравнение чисел.

$$\begin{aligned} \log_{0,3} 10 \vee -2 \\ -\frac{\log_3 10}{\log_3 10 - 1} \vee -2 \\ 2 \vee \frac{\log_3 10}{\log_3 10 - 1} \\ 2\log_3 10 - 2 \vee \log_3 10 \\ \log_3 10 \vee 2 \\ \log_3 10 \vee \log_3 9 \end{aligned}$$

Поскольку $10 > 9$ и $3 > 1$, значение выражения слева больше, значит, вместо « \vee » везде теперь можно поставить знак « $>$ », и получаем ответ: $\log_{0,3} 10 > -2$.

Второй способ. Преобразуем -2 :

$$-2 \cdot (\log_{0,3} 0,3) = \log_{0,3} (0,3)^{-2} = \log_{0,3} \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \log_{0,3} \frac{100}{9} = \log_{0,3} \left(11 \frac{1}{9}\right).$$

Рассмотрим функцию $f(x) = \log_{0,3} x$: она убывающая (т. к. $0,3 < 1$), следовательно, если $x_1 < x_2$, то $\log_{0,3} x_1 > \log_{0,3} x_2$. Таким образом, поскольку $11 \frac{1}{9} > 10$, получаем:

$$\log_{0,3} \left(11 \frac{1}{9}\right) < \log_{0,3} 10, \text{ откуда } \log_{0,3} 10 > -2.$$

Рассуждение, использованное при решении вторым способом, можно использовать более широко для любых монотонных непрерывных функций.

5. Оценим значение $\log_2 \sqrt[5]{7} = \frac{1}{5} \log_2 7$ и $\log_{0,5} \sqrt[7]{5} = \frac{1}{7} \log_{0,5} 5$.

$$\begin{aligned} 4 < 7 < 8 \\ \log_2 4 < \log_2 7 < \log_2 8 \\ \frac{2}{5} < \frac{1}{5} \log_2 7 < \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 < 5 < 8 \\ \log_{0,5} 8 < \log_{0,5} 5 < \log_{0,5} 4 \\ -\frac{\log_2 8}{7} < \frac{1}{7} \log_{0,5} 5 < -\frac{\log_{0,5} 4}{7} \\ -\frac{3}{7} < \frac{1}{7} \log_{0,5} 5 < -\frac{2}{7} \end{aligned}$$

Во втором столбце при переходе ко второй строчке все знаки поменялись (мы записали двойное неравенство в классическом виде, поэтому знаки-то остались, но «края» неравенства поменялись местами), потому что $f(x) = \log_{0,5} x$ — убывающая функция (основание логарифма меньше 1).

1. а) Решите уравнение $0,5^{2x^2 - 10x + 12} + 0,5^{-2x^2 + 10x - 12} = 2$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 20; \log_5 40]$.

Решение.

а) Пусть $0,5^{2x^2 - 10x + 12} = t$, тогда уравнение примет вид:

$$t + t^{-1} = 2; \quad t + \frac{1}{t} = 2; \quad \frac{t^2 - 2t + 1}{t} = 0,$$

откуда $t = 1$.

При $t = 1$ получаем: $0,5^{2x^2 - 10x + 12} = 1$; $2x^2 - 10x + 12 = 0$; $2(x - 3)(x - 2) = 0$; откуда $x = 2$ или $x = 3$.

б) Поскольку $\log_5 20 < 2 < \log_5 40 < 3$, отрезку $[\log_5 20; \log_5 40]$ принадлежит только корень $x = 2$.

Ответ: а) 2; 3;
 б) 2.

2. а) Решите уравнение $2^{x-2} + 9 \cdot 2^{5-x} = 17$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 35; 6]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение: $2^{x-2} + 9 \cdot 2^{3+2-x} = 17$; $2^{x-2} + \frac{9 \cdot 2^3}{2^{x-2}} = 17$.

Пусть $2^{x-2} = t$, тогда уравнение примет вид:

$$t + \frac{72}{t} = 17; \quad \frac{t^2 - 17t + 72}{t} = 0; \quad \frac{(t-8)(t-9)}{t} = 0;$$

откуда $t = 8$ или $t = 9$.

При $t = 8$ получаем: $2^{x-2} = 8$; $x - 2 = 3$; $x = 5$.

При $t = 9$ получаем: $2^{x-2} = 9$; $x - 2 = \log_2 9$; $x = 2 + \log_2 9$.

б) Поскольку $5 < \log_2 35 < \log_2 36 = 2 + \log_2 9 < 6$, отрезку $[\log_2 35; 6]$ принадлежит только корень $x = 2 + \log_2 9$.

Ответ: а) 5; $2 + \log_2 9$;
 б) $2 + \log_2 9$.

3. а) Решите уравнение $3^{x+\frac{1}{x}} - 2 \cdot 3^{3-x-\frac{1}{x}} = 25$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{1}{3}; \frac{5}{2}]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение: $3^{x+\frac{1}{x}} - 2 \cdot 3^3 \cdot 3^{-x-\frac{1}{x}} = 25$; $3^{x+\frac{1}{x}} - \frac{54}{3^{x+\frac{1}{x}}} = 25$. Пусть $3^{x+\frac{1}{x}} = t$,

тогда уравнение примет вид:

$$t - \frac{54}{t} = 25; \quad \frac{t^2 - 25t - 54}{t} = 0; \quad \frac{(t-27)(t+2)}{t} = 0,$$

откуда $t = -2$ или $t = 27$.

При $t = -2$ получаем: $3^{x+\frac{1}{x}} = -2$ — нет решений.

При $t = 27$ получаем: $3^{x+\frac{1}{x}} = 27$; $x + \frac{1}{x} = 3$; $\frac{x^2 - 3x + 1}{x} = 0$, откуда $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ или $x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$.

б) Поскольку $\frac{1}{3} < \frac{3 - \sqrt{5}}{2} < \frac{5}{2} < \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$, отрезку $\left[\frac{1}{3}; \frac{5}{2}\right]$ принадлежит только корень $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

Ответ: а) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$; $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$;

б) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

4. а) Решите уравнение $\frac{4^{6x^2 - 10x - 1} - 25}{4^{3x^2 - 5x - 0.5} - 5} = 13$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{63} \frac{1}{4}; \log_8 63\right]$.

Решение.

а) Пусть $4^{3x^2 - 5x - 0.5} = t$, тогда уравнение примет вид:

$$\frac{t^2 - 25}{t - 5} = 13; \quad \frac{t^2 - 13t + 40}{t - 5} = 0; \quad \frac{(t - 5)(t - 8)}{t - 5} = 0,$$

откуда $t = 8$.

При $t = 8$ получаем, что

$$4^{3x^2 - 5x - 0.5} = 8; \quad 3x^2 - 5x - 0.5 = 1.5; \quad 3x^2 - 5x - 2 = 0; \quad (3x + 1)(x - 2) = 0,$$

откуда $x = -\frac{1}{3}$ или $x = 2$.

б) Поскольку $\log_{63} \frac{1}{4} = -\log_{63} 4 < -\log_{64} 4 = -\frac{1}{3} < \log_8 63 < 2$, отрезку $\left[\log_{63} \frac{1}{4}; \log_8 63\right]$ принадлежит только корень $x = -\frac{1}{3}$.

Ответ: а) $-\frac{1}{3}$; 2;

б) $-\frac{1}{3}$.

5. а) Решите уравнение $20^{\sqrt{2x^2 - 5x + 1} - 2} = 2^{\sqrt{2x^2 - 5x + 1} - 2} \cdot 5^{2\sqrt{2x^2 - 5x + 1} - 4}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{49} \frac{1}{3}; \log_3 49\right]$.

Решение.

а) Пусть $t = \sqrt{2x^2 - 5x + 1} - 2$, тогда уравнение примет вид:

$$20^t = 2^t \cdot 5^{2t}; \quad 2^{2t} \cdot 5^t = 2^t \cdot 5^{2t}; \quad \left(\frac{2}{5}\right)^t = 1,$$

откуда $t = 0$.

При $t = 0$ получаем, что

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 1} - 2 = 0; \quad 2x^2 - 5x + 1 = 4; \quad (2x + 1)(x - 3) = 0;$$

откуда $x = -\frac{1}{2}$ или $x = 3$.

б) Поскольку $-\frac{1}{2} = -\log_{49} 7 < -\log_{49} 3 = \log_{49} \frac{1}{3} < 3 < \log_3 49$, отрезку $[\log_{49} \frac{1}{3}; \log_3 49]$ принадлежит только корень $x = 3$.

Ответ: а) $-\frac{1}{2}; 3$;

б) 3.

6. а) Решите уравнение $7^{2x^2+x} = 49^{\frac{2x+1}{x+1}}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{0,2}(\sqrt{5}+1); \frac{4\sqrt{3}}{7}]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение:

$$7^{2x^2+x} = 7^{2 \cdot \frac{2x+1}{x+1}}; \quad 2x^2+x = 2 \cdot \frac{2x+1}{x+1}; \quad x(2x+1) - 2 \cdot \frac{2x+1}{x+1} = 0; \quad \frac{(2x+1)(x^2+x-2)}{x+1} = 0;$$

$$\frac{(2x+1)(x+2)(x-1)}{x+1} = 0, \text{ откуда } x = -2; x = -\frac{1}{2}; x = 1.$$

б) Поскольку

$$-2 = \log_{0,2} 25 < \log_{0,2}(\sqrt{5}+1) < \log_{\frac{1}{5}} \sqrt{5} = -\frac{1}{2} < \frac{4\sqrt{3}}{7} < 1,$$

отрезку $[\log_{0,2}(\sqrt{5}+1); \frac{4\sqrt{3}}{7}]$ принадлежит только корень $x = -\frac{1}{2}$.

Ответ: а) $-2; -\frac{1}{2}; 1$;

б) $-\frac{1}{2}$.

7. а) Решите уравнение $\frac{44-4^{-x}}{8-2^{-x}} = 7$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\log_4 11; 0]$.

Решение.

а) Пусть $t = 2^{-x}$, тогда уравнение примет вид:

$$\frac{44-t^2}{8-t} = 7; \quad \frac{44-t^2-56+7t}{8-t} = 0; \quad \frac{t^2-7t+12}{t-8} = 0; \quad \frac{(t-3)(t-4)}{t-8} = 0,$$

откуда $t = 3$ или $t = 4$.

При $t = 3$ получаем: $2^{-x} = 3$, откуда $x = -\log_2 3$.

При $t = 4$ получаем $2^{-x} = 4$, откуда $x = -2$.

б) Поскольку $-2 = -\log_4 16 < -\log_4 11 < -\log_4 9 = -\log_2 3 < 0$, отрезку $[-\log_4 11; 0]$ принадлежит только корень $x = -\log_2 3$.

Ответ: а) $-2; -\log_2 3$;

б) $-\log_2 3$.

8. а) Решите уравнение $3 \cdot 5^{3 \cdot 2^{-|x|} + 2} - 8 \cdot 125^{2^{-|x|} + \frac{1}{3}} = 3 \cdot 5^{3 \cdot 2^{-|x|} + 1} + 500$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_2 \frac{4}{5}; 1\right]$.

Решение.

а) Пусть $t = 2^{-|x|}$, тогда уравнение примет вид:

$$3 \cdot 5^{3t+2} - 8 \cdot 125^{t+\frac{1}{3}} = 3 \cdot 5^{3t+1} + 500; \quad 3 \cdot 5^2 \cdot 5^{3t} - 8 \cdot 5^{3t+1} = 3 \cdot 5 \cdot 5^{3t} + 500;$$

$$75 \cdot 5^{3t} - 40 \cdot 5^{3t} - 15 \cdot 5^{3t} = 500; \quad 20 \cdot 5^{3t} = 500; \quad 5^{3t} = 25,$$

откуда $t = \frac{2}{3}$.

При $t = \frac{2}{3}$ получаем: $2^{-|x|} = \frac{2}{3}$; $-|x| = \log_2 \frac{2}{3}$; $|x| = \log_2 \frac{3}{2}$, откуда $x = -\log_2 \frac{3}{2}$ или $x = \log_2 \frac{3}{2}$.

б) Поскольку $-\log_2 \frac{3}{2} < -\log_2 \frac{5}{4} = \log_2 \frac{4}{5} < \log_2 \frac{3}{2} < \log_2 2 = 1$, отрезку $\left[\log_2 \frac{4}{5}; 1\right]$ принадлежит только корень $x = \log_2 \frac{3}{2}$.

Ответ: а) $-\log_2 \frac{3}{2}; \log_2 \frac{3}{2}$;

б) $\log_2 \frac{3}{2}$.

9. а) Решите уравнение $\frac{16^x - 8^{x+\frac{2}{3}} + 5}{2^x - 3} = 5$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$.

Решение.

а) Пусть $t = 2^x$, тогда уравнение примет вид:

$$\frac{t^4 - 4t^3 + 5}{t-3} = 5; \quad \frac{t^4 - 4t^3 + 5 - 5t + 15}{t-3} = 0; \quad \frac{t^3(t-4) - 5(t-4)}{t-3} = 0; \quad \frac{(t^3-5)(t-4)}{t-3} = 0,$$

откуда $t = \sqrt[3]{5}$ или $t = 4$.

При $t = \sqrt[3]{5}$ получаем: $2^x = \sqrt[3]{5}$; $x = \frac{1}{3} \log_2 5$.

При $t = 4$ получаем: $2^x = 4$; $x = 2$.

б) Поскольку $\frac{2}{3} < \frac{1}{3} \log_2 5 < 1 < 2$, отрезку $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$ принадлежит только корень $x = \frac{1}{3} \log_2 5$.

Ответ: а) $\frac{1}{3} \log_2 5; 2$;

б) $\frac{1}{3} \log_2 5$.

Задачи для самостоятельного решения

1. а) Решите уравнение $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x^2-13x-7} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2x^2+13x+7} = 2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_4 \frac{1}{3}; \log_3 4\right]$.

2. а) Решите уравнение $3^{x-1} + 5 \cdot 3^{3-x} = 14$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 14; 2,5]$.

3. а) Решите уравнение $7^{x-\frac{1}{x}} - 9 \cdot 7^{2-x+\frac{1}{x}} = 40$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{2}{5}; \frac{5}{2}\right]$.

4. а) Решите уравнение $\frac{6^{8x^2+22x}-4}{6^{4x^2+11x}-2} = 218$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 0,05; \log_{80} 3]$.

5. а) Решите уравнение $36\sqrt{3x^2+5x+7}-3 = 3\sqrt{3x^2+5x+7}-3 \cdot 2^4\sqrt{3x^2+5x+7}-12$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_7 \frac{1}{36}; \log_{216} 7\right]$.

6. а) Решите уравнение $9^{3x^2+4x} = 9^{\frac{11x+3}{x+1}}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{\frac{1}{4}} \left(\sqrt[3]{4} + 1\right); \frac{2\sqrt{30}}{11}\right]$.

7. а) Решите уравнение $\frac{13-9^{-x}}{4-3^{-x}} = 12$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2; -\frac{3}{2}\right]$.

8. а) Решите уравнение $5 \cdot 8^{2 \cdot 3^{|x|} + 1} - 5 \cdot 64^{3^{|x|} + \frac{1}{3}} = 9 \cdot 8^{2 \cdot 3^{|x|} + \frac{1}{3}} + 1024$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-1; \log_3 \frac{5}{4}\right]$.

9. а) Решите уравнение $\frac{243^x - 2 \cdot 81^x - 27}{3^x - 3} = 27$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right]$.

1.3. Логарифмические уравнения

При решении логарифмических уравнений мы пользуемся методом равносильных преобразований. При этом иногда возникают ситуации, что при переходе к следующему уравнению некоторые ограничения можно не записывать, потому что запись и так содержит эту информацию. Покажем это на примере решения одного и того же уравнения.

$$\log_2(2x + 1) = \log_4(x + 2)^2.$$

$$\log_2(2x + 1) = \log_2|x + 2|.$$

Модуль появился, т. к. $\sqrt{a^2} = |a|$.

$$\begin{cases} \log_4(2x + 1)^2 = \log_4(x + 2)^2, \\ 2x + 1 > 0. \end{cases}$$

Второе условие появляется, поскольку первое уравнение системы уже не запрещает значению выражения $2x + 1$ быть отрицательным или равным нулю.

«Отбрасываем» логарифм:

$$\begin{cases} 2x + 1 = |x + 2|; \\ x + 2 \neq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2x + 1)^2 = (x + 2)^2; \\ 2x + 1 > 0. \end{cases}$$

Дополнительно писать, что $2x + 1 > 0$ не нужно, т. к. $2x + 1$ равняется модулю, который не может быть меньше нуля, а вот равным нулю он быть может, потому добавим условие $x + 2 \neq 0$; вместо него можно было записать $2x + 1 \neq 0$, это было бы равнозначно.

Поскольку слева и справа под логарифмом стояли полные квадраты, необходимости здесь уточнять, что они должны быть неотрицательными, нет; условие того, что они не равны нулю, содержит вторая строчка системы.

Решение полученных систем:

$$\begin{cases} 2x + 1 = x + 2, \\ x + 2 > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2x + 1 = -x - 2, \\ x + 2 < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 1 = x + 2, \\ 2x + 1 > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2x + 1 = -x - 2, \\ 2x + 1 > 0 \end{cases}$$

$$x = 1;$$

нет решений.

$$x = 1;$$

нет решений.

Ответ: 1.

Ответ: 1.

1. а) Решите уравнение $\log_9(x^3 - 2x^2 + 1) = \log_3|x - 1|$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 4; \sqrt{5}]$.

Решение.

а) $\log_9(x^3 - 2x^2 + 1) = \log_3|x - 1|$; $\log_9(x^3 - 2x^2 + 1) = 2\log_9|x - 1|$;

$$\begin{cases} x^3 - 2x^2 + 1 = (x - 1)^2, \\ x \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 2x = 0, \\ x \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x(x - 1)(x - 2) = 0, \\ x \neq 1, \end{cases}$$

откуда $x = 0$ или $x = 2$.

б) Поскольку $0 < \log_5 4 < 2 < \sqrt{5}$, отрезку $[\log_5 4; \sqrt{5}]$ принадлежит только корень $x = 2$.

Ответ: а) 0; 2;

б) 2.

2. а) Решите уравнение $\log_4(2x^2 - 2x - 40) + \log_{0,25}(x^2 - 3x + 2) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; 2\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение: $\log_4(2x^2 - 2x - 40) = \log_4(x^2 - 3x + 2)$.

$$\begin{cases} 2x^2 - 2x - 40 = x^2 - 3x + 2, \\ x^2 - 3x + 2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + x - 42 = 0, \\ x^2 - 3x + 2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -7, \\ x = 6, \\ x^2 - 3x + 2 > 0, \end{cases}$$

откуда $x = 6, x = -7$.

б) Поскольку $-7 < -2\pi < 6 < 2\pi$, отрезку $[-2\pi; 2\pi]$ принадлежит только корень $x = 6$.

Ответ: а) $-7; 6$;

б) 6 .

3. а) Решите уравнение $\log_{x^2+x-2}(x^3 + 2x^2 - 5x - 5) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 0,25; \log_3 17]$.

Решение.

а) Исходное уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} x^3 + 2x^2 - 5x - 5 = 1, \\ x^2 + x - 2 > 0, \\ x^2 + x - 2 \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0, \\ (x+2)(x-1) > 0, \\ x^2 + x - 3 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+1)(x+3)(x-2) = 0, \\ (x+2)(x-1) > 0, \\ x^2 + x - 3 \neq 0; \end{cases}$$

откуда $x = -3, x = 2$.

б) Поскольку $-3 < -\log_3 4 = \log_3 0,25 < -1 < 2 < \log_3 17$, отрезку $[\log_3 0,25; \log_3 17]$ принадлежит только корень $x = 2$.

Ответ: а) $-3; 2$;

б) 2 .

4. а) Решите уравнение $(3x - 1) \log_{\frac{1}{x^2} - 1} \sqrt{2x^2 - 5x + 3} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5^{-0,5}; 5^{0,5}]$.

Решение.

а) Заметим, что $x = \frac{1}{3}$ является решением исходного уравнения.

Решим уравнение $\log_{\frac{1}{x^2} - 1} \sqrt{2x^2 - 5x + 3} = 0$. Оно равносильно системе

$$\begin{cases} \sqrt{2x^2 - 5x + 3} = 1, \\ \frac{1}{x^2} - 1 > 0, \\ \frac{1}{x^2} - 1 \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x^2 - 5x + 2 = 0, \\ x \neq \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x \neq 0, \\ -1 < x < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (2x - 1)(x - 2) = 0, \\ x \neq \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x \neq 0, \\ -1 < x < 1, \end{cases}$$

откуда $x = \frac{1}{2}$.

б) Поскольку $\frac{1}{3} < \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2} < \sqrt{5}$, отрезку $[5^{-0,5}; 5^{0,5}]$ принадлежит только корень $x = \frac{1}{2}$.

Ответ: а) $\frac{1}{3}; \frac{1}{2}$;

б) $\frac{1}{2}$.

5. а) Решите уравнение $\log_{2^x+1} \frac{x^2-5x+6}{2x^2+x+11} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 0,01; \log_5 0,5]$.

Решение.

а) Поскольку $2^x + 1 > 1$, исходное уравнение эквивалентно уравнению

$$\frac{x^2-5x+6}{2x^2+x+11} = 1; \quad \frac{-x^2-6x-5}{2x^2+x+11} = 0; \quad \frac{(x+5)(x+1)}{2x^2+x+11} = 0,$$

откуда $x = -5, x = -1$.

б) Поскольку

$$-5 < -\log_5 100 = \log_5 0,01 < -1 < -\log_5 2 = \log_5 0,5,$$

отрезку $[\log_5 0,01; \log_5 0,5]$ принадлежит только корень $x = -1$.

Ответ: а) $-5; -1$;

б) -1 .

6. а) Решите уравнение $\log_{2x^2+6x-8}(x^2+3x+2) = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\sqrt{21}; \log_{\frac{3}{4}} \frac{1}{2}]$.

Решение.

а) Исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 + 3x + 2 = 2x^2 + 6x - 8, \\ 2(x^2 + 3x - 4) > 0, \\ 2(x^2 + 3x - 4) \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 3x - 10 = 0, \\ (x+4)(x-1) > 0, \\ 2x^2 + 6x - 9 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+5)(x-2) = 0, \\ (x+4)(x-1) > 0, \\ x \neq \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$

откуда $x = -5; x = 2$.

б) Поскольку $-5 < -\sqrt{21} < 2 = \log_{\frac{3}{4}} \frac{9}{16} < \log_{\frac{3}{4}} \frac{8}{16} = \log_{\frac{3}{4}} \frac{1}{2}$, отрезку $[-\sqrt{21}; \log_{\frac{3}{4}} \frac{1}{2}]$ принадлежит только корень $x = 2$.

Ответ: а) $-5; 2$;

б) 2 .

7. а) Решите уравнение $\log_2^2(x-3) + \log_2(x-3)^4 = 5$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 119; \log_3 119]$.

Решение.

а) Исходное уравнение эквивалентно уравнению

$$\log_2^2(x-3) + 4\log_2(x-3) - 5 = 0; \quad (\log_2(x-3) + 5)(\log_2(x-3) - 1) = 0;$$

$$\begin{cases} \log_2(x-3) = -5, & \left[x-3 = \frac{1}{32}, \right. \\ \log_2(x-3) = 1; & \left. x-3 = 2, \right. \end{cases}$$

откуда $x = 3\frac{1}{32}$ или $x = 5$.

б) Поскольку $\log_5 119 < 3 < 3\frac{1}{32} < 4 < \log_3 119 < 5$, отрезку $[\log_5 119; \log_3 119]$ принадлежит только корень $x = 3\frac{1}{32}$.

Ответ: а) $3\frac{1}{32}; 5$;

б) $3\frac{1}{32}$.

8. а) Решите уравнение $\log_8 \left(\log_2 \left(\log_{16}^2 \left(x + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{8} \right) + 11 \right) = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{26} 4; 4]$.

Решение.

а) $\log_8 \left(\log_2 \left(\log_{16}^2 \left(x + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{8} \right) + 11 \right) = 1;$

$$\log_2 \left(\log_{16}^2 \left(x + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{8} \right) = -3; \quad \log_{16}^2 \left(x + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}; \quad \log_{16} \left(x + \frac{1}{x} \right) = \pm \frac{1}{2};$$

$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} = 4, \\ x + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Первое уравнение совокупности имеет корни $x = 2 - \sqrt{3}$ и $x = 2 + \sqrt{3}$.

Второе уравнение совокупности не имеет решений.

Решение исходного уравнения: $x = 2 - \sqrt{3}; x = 2 + \sqrt{3}$.

б) Поскольку $2 - \sqrt{3} < \frac{1}{3} = \log_{27} 3 < \log_{27} 4 < \log_{26} 4 < 1 < 2 + \sqrt{3} < 4$, отрезку $[\log_{26} 4; 4]$

принадлежит только корень $x = 2 + \sqrt{3}$.

Ответ: а) $2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3};$

б) $2 + \sqrt{3}$.

9. а) Решите уравнение $\log_{2 - \frac{1}{x+2}} \left(x^2 + 3x - \frac{2}{x+2} - 6 \right) = 1 + \log_{2 - \frac{1}{x+2}} (x^2 + 3x - 8)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi\sqrt{\pi}; \log_2 \pi]$.

Решение.

а) Пусть $y = 2 - \frac{1}{x+2}$, $z = x^2 + 3x - 8$, тогда уравнение примет вид:

$$\log_y (z + 2y - 2) = 1 + \log_y z; \quad \begin{cases} \log_y (z + 2y - 2) = \log_y yz, \\ z > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} z + 2y - 2 - yz = 0, \\ z > 0, \\ y > 0, \\ y \neq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (z - 2)(1 - y) = 0, \\ z > 0, \\ y > 0, \\ y \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} z = 2, \\ y > 0, \\ y \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 3x - 8 = 2, \\ 2 - \frac{1}{x+2} > 0, \\ 2 - \frac{1}{x+2} \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (x + 5)(x - 2) = 0, \\ \frac{2x + 3}{x + 2} > 0, \\ \frac{x + 1}{x + 2} \neq 0, \end{cases}$$

откуда $x = -5; x = 2$.

б) Поскольку $-\pi\sqrt{\pi} < -3\sqrt{3} < -5 < \log_2 \pi < \log_2 4 = 2$, отрезку $[-\pi\sqrt{\pi}; \log_2 \pi]$ принадлежит только корень $x = -5$.

Ответ: а) $-5; 2;$

б) -5 .

10. а) Решите уравнение $1 + \log_3(9x^2 + 1) = \log_{\sqrt{3}}\sqrt{3x^4 + 63}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$.

Решение.

а) $1 + \log_3(9x^2 + 1) = \log_{\sqrt{3}}\sqrt{3x^4 + 63}$;

$$\log_3(9x^2 + 1) = \log_3(3x^4 + 63) - \log_3 3; \quad \log_3(9x^2 + 1) = \log_3(x^4 + 21);$$

$$9x^2 + 1 = x^4 + 21; \quad x^4 - 9x^2 + 20 = 0; \quad (x^2 - 4)(x^2 - 5) = 0.$$

Таким образом, уравнение имеет 4 корня: $x = -\sqrt{5}$, $x = -2$, $x = 2$, $x = \sqrt{5}$.

б) Поскольку $-\sqrt{5} < -2 < \frac{3}{2} < 2 < \sqrt{5} < \frac{5}{2}$, промежутку $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$ принадлежат только корни $x = 2$ и $x = \sqrt{5}$.

Ответ: а) $-\sqrt{5}$; -2 ; 2 ; $\sqrt{5}$;

б) 2 ; $\sqrt{5}$.

Задания для самостоятельного решения

1. а) Решите уравнение $\log_{25}(x^3 - 8x + 8) = \log_5|x - 2|$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\log_7 3; \sqrt{7}\right]$.

2. а) Решите уравнение $\log_{\frac{1}{9}}(2x^2 + 4x - 30) + \log_9(x^2 + x - 2) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; \pi\right]$.

3. а) Решите уравнение $\log_{x^2+x-6}(x^3 - 13x + 13) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 0,03; \log_2 7]$.

4. а) Решите уравнение $(x + 1) \cdot \log_{\frac{9}{x^2-4}} \sqrt{2x^2 - 3x - 1} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3^{-0,5}; 3^{0,5}\right]$.

5. а) Решите уравнение $\log_{7^{x+2}} \frac{x^2 - 7x + 12}{2x^2 - x + 5} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{16}{\sqrt{5}}; \log_7 6\right]$.

6. а) Решите уравнение $\log_{2x^2-4x-30}(x^2 - x - 2) = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_3 0,03; \frac{5\sqrt{78}}{6}\right]$.

7. а) Решите уравнение $\log_4^2(x + 1) + \log_{0,25}(x + 1)^2 = 3$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{26} 24; 65]$.

8. а) Решите уравнение $\log_3 \left(\log_{36} \left(\log_{216} \left(x + \frac{4}{x} \right) + \frac{1}{18} \right) + \frac{7}{2} \right) = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{126} 24; 5]$.

9. а) Решите уравнение $\log_{\frac{1}{x-1}-1} \left(9x^2 - 27x + \frac{2}{x-1} + 18 \right) = 1 + \log_{\frac{1}{x-1}-1} (9x^2 - 27x + 22)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 \pi; \sqrt{\pi}]$.

10. а) Решите уравнение $\log_{\sqrt{2}} \sqrt{2x^4 + 20} = 1 + \log_2 (10x^2 + 1)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{11}{4}; \frac{2}{3}\right]$.

1.4. Комбинированные уравнения

1. а) Решите уравнение $\log_4 (\sin x + \sin 2x + 16) = 2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение, избавившись от логарифма:

$$\sin x + \sin 2x + 16 = 16; \quad 2 \sin x \cos x + \sin x = 0; \quad \sin x \cdot (2 \cos x + 1) = 0,$$


откуда $\sin x = 0$; $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $\cos x = -\frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: -4π ; $-\frac{10\pi}{3}$; -3π ; $-\frac{8\pi}{3}$.

Ответ: а) $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

б) -4π ; $-\frac{10\pi}{3}$; -3π ; $-\frac{8\pi}{3}$.



2. а) Решите уравнение $9^{\sin x} + 9^{-\sin x} = \frac{10}{3}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Решение.

а) Пусть $t = 9^{\sin x}$, тогда $9^{-\sin x} = \frac{1}{9^{\sin x}} = \frac{1}{t}$ и исходное уравнение запишется в виде

$$t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}, \text{ откуда } t = 3 \text{ или } t = \frac{1}{3}.$$

При $t = 3$ получим: $9^{\sin x} = 3$, откуда $\sin x = \frac{1}{2}$; $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

При $t = \frac{1}{3}$ получим: $9^{\sin x} = \frac{1}{3}$, откуда $\sin x = -\frac{1}{2}$; $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$.


Полученные решения также можно записать одной серией: $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi s$, $s \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Получим числа: $-\frac{19\pi}{6}$; $-\frac{17\pi}{6}$; $-\frac{13\pi}{6}$.

Ответ: а) $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi s$, $s \in \mathbb{Z}$.

б) $-\frac{19\pi}{6}$; $-\frac{17\pi}{6}$; $-\frac{13\pi}{6}$.



3. а) Решите уравнение $12^{\sin x} = 4^{\sin x} \cdot 3^{-\sqrt{3}\cos x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение: $4^{\sin x} \cdot 3^{\sin x} = 4^{\sin x} \cdot 3^{-\sqrt{3}\cos x}$. Так как $4^{\sin x} > 0$ при любом значении x , на $4^{\sin x}$ можно разделить обе части уравнения:

$$3^{\sin x} = 3^{-\sqrt{3}\cos x}; \sin x = -\sqrt{3}\cos x; \operatorname{tg} x = -\sqrt{3},$$


откуда $x = -\frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Получим числа: $\frac{8\pi}{3}$; $\frac{11\pi}{3}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{8\pi}{3}$; $\frac{11\pi}{3}$.



4. а) Решите уравнение $(25^{\cos x})^{\sin x} = 5^{\cos x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение:

$$25^{\cos x \sin x} = 5^{\cos x}; 5^{2\sin x \cos x} = 5^{\cos x}; 2\sin x \cos x = \cos x; \cos x(2\sin x - 1) = 0,$$


откуда или $\cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = \frac{1}{2}$; $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$.

Получим числа: $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{11\pi}{6}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{7\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$

б) $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{11\pi}{6}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{7\pi}{6}$.



5. а) Решите уравнение $(\frac{1}{16})^{\cos x} + 3 \cdot (\frac{1}{4})^{\cos x} - 4 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[4\pi; 7\pi]$.

Решение.

а) Пусть $y = (\frac{1}{4})^{\cos x}$, тогда уравнение примет вид:

$$y^2 + 3y - 4 = 0; (y + 4)(y - 1) = 0,$$

откуда $y = -4$ или $y = 1$.

При $y = -4$ получаем, что $(\frac{1}{4})^{\cos x} = -4$ — нет корней.

При $y = 1$ получаем, что $(\frac{1}{4})^{\cos x} = 1$, откуда $\cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью неравенств найдём корни, принадлежащие отрезку $[4\pi; 7\pi]$.

$4\pi \leq \frac{\pi}{2} + \pi n \leq 7\pi; 4 - \frac{1}{2} \leq n \leq 7 - \frac{1}{2}; 3,5 \leq n \leq 6,5$, значит, поскольку n целое, получаем: $n = 4, n = 5, n = 6$.

Подставляя полученные значения n , получим числа: $\frac{9\pi}{2}; \frac{11\pi}{2}; \frac{13\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{9\pi}{2}; \frac{11\pi}{2}; \frac{13\pi}{2}$.

6. а) Решите уравнение $(\frac{1}{16})^{\sin x} - (\frac{1}{4})^{\sin x} - 2 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[7\pi; \frac{17\pi}{2}]$.

Решение.

а) Пусть $y = (\frac{1}{4})^{\sin x}$, тогда уравнение примет вид:

$$y^2 - y - 2 = 0; (y + 1)(y - 2) = 0,$$

откуда $y = -1$ или $y = 2$.

При $y = -1$ получаем, что $(\frac{1}{4})^{\sin x} = -1$ — нет корней.


При $y = 2$ получаем, что $(\frac{1}{4})^{\sin x} = 2$, откуда $\sin x = -\frac{1}{2}$; $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[7\pi; \frac{17\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $\frac{43\pi}{6}; \frac{47\pi}{6}$.

Ответ: а) $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{43\pi}{6}; \frac{47\pi}{6}$.



7. а) Решите уравнение $4^{\lg x} + 5 \cdot 2^{\lg x} - 14 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Пусть $y = 2^{\lg x}$, тогда уравнение примет вид:

$$y^2 + 5y - 14 = 0; (y + 7)(y - 2) = 0,$$

откуда $y = -7$ или $y = 2$.

При $y = -7$ получаем, что $2^{\lg x} = -7$ — нет корней.


При $y = 2$ получаем, что $2^{\lg x} = 2$, откуда $\lg x = 1; x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $\frac{5\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{5\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}$.



8. а) Решите уравнение $2^{\sin^2 x} + 2^{\cos^2 x} = 3$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi; \frac{\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Преобразуем исходное уравнение: $2^{1 - \cos^2 x} + 2^{\cos^2 x} = 3; \frac{2}{2^{\cos^2 x}} + 2^{\cos^2 x} = 3$.

Пусть $t = 2^{\cos^2 x}$, тогда уравнение примет вид:

$$\frac{2}{t} + t = 3; \frac{t^2 - 3t + 2}{t} = 0; \frac{(t-1)(t-2)}{t} = 0,$$

откуда $t = 1$ или $t = 2$.

При $t = 1$ получаем: $2^{\cos^2 x} = 1; \cos^2 x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

При $t = 2$ получаем: $2^{\cos^2 x} = 2; \cos^2 x = 1; \sin^2 x = 0$, откуда $x = \pi m, m \in \mathbb{Z}$.


Объединяя эти два решения, получаем решение исходного уравнения: $x = \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Получим числа: $-\pi; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$;

б) $-\pi; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}$.



9. а) Решите уравнение $(3 \cos 2x - 11 \cos x + 7) \sqrt{-7 \operatorname{tg} x} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Решение.

а) Произведение равно нулю, если хотя бы один из его множителей равен нулю и все множители определены. Поэтому решение уравнения — это объединение решений уравнения

$$\sqrt{-7 \operatorname{tg} x} = 0 \text{ и системы } \begin{cases} 3 \cos 2x - 11 \cos x + 7 = 0, \\ \operatorname{tg} x \leq 0. \end{cases}$$

Решим уравнение: $\sqrt{-7 \operatorname{tg} x} = 0$; $\operatorname{tg} x = 0$, откуда $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решим систему:

$$\begin{cases} 3 \cos 2x - 11 \cos x + 7 = 0, \\ \operatorname{tg} x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 6 \cos^2 x - 3 - 11 \cos x + 7 = 0, \\ \operatorname{tg} x \leq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3 \cos x - 4)(2 \cos x - 1) = 0, \\ \operatorname{tg} x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x = \frac{4}{3} \\ \cos x = \frac{1}{2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg} x \leq 0, \end{cases}$$


откуда получаем, что $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Получим числа: $3\pi; \frac{11\pi}{3}; 4\pi$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$;

б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}; 4\pi$.



10. а) Решите уравнение $\frac{4^{\cos x} - 2^{\sqrt{3}}}{\sqrt{7 \sin x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

Решение.

а) $\frac{4^{\cos x} - 2^{\sqrt{3}}}{\sqrt{7 \sin x}} = 0$;

$$\begin{cases} 4^{\cos x} = 2^{\sqrt{3}}, \\ \sin x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 2^{2\cos x} = 2^{\sqrt{3}}, \\ \sin x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 2\cos x = \sqrt{3}, \\ \sin x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \sin x > 0, \end{cases}$$


откуда $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Получим число $\frac{25\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{25\pi}{6}$.



11. а) Решите уравнение $\frac{16^{\sin x} - 6 \cdot 4^{\sin x} + 8}{\sqrt{3}\operatorname{tg}x - 1} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Исходное уравнение эквивалентно системе:
$$\begin{cases} 16^{\sin x} - 6 \cdot 4^{\sin x} + 8 = 0, \\ \sqrt{3}\operatorname{tg}x - 1 \neq 0, \\ \cos x \neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы. Пусть $t = 4^{\sin x}$, тогда уравнение принимает вид:

$$t^2 - 6t + 8 = 0; (t - 2)(t - 4) = 0,$$

откуда $t = 2$ или $t = 4$.

При $t = 2$ получаем: $4^{\sin x} = 2$, откуда $\sin x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

При $t = 4$ получаем: $4^{\sin x} = 4$, откуда $\sin x = 1$, $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$, — не удовлетворяют условию $\cos x \neq 0$.

Решим неравенство: $\sqrt{3}\operatorname{tg}x - 1 \neq 0$; $\operatorname{tg}x \neq \frac{\sqrt{3}}{3}$, откуда $x \neq \frac{\pi}{6} + \pi l, l \in \mathbb{Z}$.


Таким образом, исходное уравнение имеет решение: $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Получим число $-\frac{7\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{7\pi}{6}$.



12. а) Решите уравнение $(6\sin^2 x - 11\sin x + 4)\log_{13}(-\operatorname{tg}x) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Решение.

а) Произведение равно нулю, если хотя бы один из его множителей равен нулю и все множители определены. Поэтому решение уравнения — это объединение решений уравнения $\log_{13}(-\operatorname{tg}x) = 0$ и системы

$$\begin{cases} 6\sin^2 x - 11\sin x + 4 = 0, \\ -\operatorname{tg}x > 0. \end{cases}$$

Решим уравнение:

$$\log_{13}(-\operatorname{tg}x) = 0; \operatorname{tg}x = -1,$$

откуда $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решим систему:

$$\begin{cases} 6\sin^2 x - 11\sin x + 4 = 0, \\ -\operatorname{tg}x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (3\sin x - 4)(2\sin x - 1) = 0, \\ \operatorname{tg}x < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg}x < 0, \end{cases}$$


откуда получаем, что $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Получим числа: $\frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{17\pi}{6}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{17\pi}{6}$.



13. а) Решите уравнение $\sqrt{2\cos x + 1} \cdot \log_2(2\sin x) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Решение.

а) Произведение равно нулю, если хотя бы один из его множителей равен нулю и все множители определены. Поэтому решение уравнения — это объединение решений систем

$$\begin{cases} \sqrt{2\cos x + 1} = 0, \\ 2\sin x > 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} 2\cos x + 1 \geq 0, \\ \log_2(2\sin x) = 0. \end{cases}$$

Решим первую систему:

$$\begin{cases} \sqrt{2 \cos x + 1} = 0, \\ 2 \sin x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2}, \\ \sin x > 0, \end{cases}$$

откуда $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решим вторую систему:

$$\begin{cases} 2 \cos x + 1 \geq 0, \\ \log_2(2 \sin x) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \geq -\frac{1}{2}, \\ 2 \sin x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \geq -\frac{1}{2}, \\ \sin x = \frac{1}{2}, \end{cases}$$


откуда получаем, что $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Получим число $-\frac{10\pi}{3}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$

б) $-\frac{10\pi}{3}$.



14. а) Решите уравнение $\frac{2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x}{\log_7(\sin x)} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Решение.

а) Исходное уравнение эквивалентно системе:
$$\begin{cases} 2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x = 0, \\ \log_7(\sin x) \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x = 0, \\ \sin x \neq 1, \\ \sin x > 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы:

$$2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x = 0; \quad \cos x \left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 0,$$

откуда $\cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, или $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}; x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

С учётом условий $\sin x \neq 1$ и $\sin x > 0$ получаем решение исходного уравнения:


$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Получим число $\frac{\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$

б) $\frac{\pi}{6}$.



15. а) Решите уравнение $\frac{3\operatorname{tg}^2 x - 1}{\log_5(\cos x)} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Исходное уравнение эквивалентно системе:
$$\begin{cases} 3\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0, \\ \log_5(\cos x) \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 3\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0, \\ \cos x \neq 1, \\ \cos x > 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы:

$$3\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0; \operatorname{tg} x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3},$$

откуда $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.


С учётом условий $\cos x \neq 1$ и $\cos x > 0$ получаем решение исходного уравнения:
 $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Получим число $\frac{\pi}{6}$.

Ответ: а) $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{\pi}{6}$.



Задания для самостоятельного решения

1. а) Решите уравнение $\log_7(2\cos^2 x + 3\cos x - 1) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

2. а) Решите уравнение $4^{\cos x} + 4^{-\cos x} = \frac{5}{2}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

3. а) Решите уравнение $(25^{\cos x})^{-\sin x} = (0,2)^{\sqrt{3}\cos x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

4. а) Решите уравнение $(4^{\cos x})^{-\sin x} = (0,5)^{\sqrt{2}\cos x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{9\pi}{2}; 6\pi\right]$.

5. а) Решите уравнение $81^{\cos x} - 2 \cdot 9^{\cos x} - 3 = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; \pi]$.
6. а) Решите уравнение $3 \cdot 81^{\sin x} + 2 \cdot 9^{\sin x} - 1 = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; \pi]$.
7. а) Решите уравнение $\left(\frac{1}{9}\right)^{\operatorname{tg} x} - 6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\operatorname{tg} x} + 9 = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi; 8\pi]$.
8. а) Решите уравнение $3^{\sin^2 x} + 3^{\cos^2 x} = 4$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.
9. а) Решите уравнение $(6 \cos 2x - 8 \cos x - 1) \sqrt{5 \operatorname{tg} x} = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.
10. а) Решите уравнение $\frac{9^{\sin x} - 3^{\sqrt{2}}}{\sqrt{5 \cos x}} = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 4\pi]$.
11. а) Решите уравнение $\frac{4 \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^{\cos x} - 9 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{\cos x} + 2}{\operatorname{tg} x - \sqrt{3}} = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
12. а) Решите уравнение $(10 \cos^2 x - 17 \cos x + 6) \log_4(\sqrt{2} \sin x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[5\pi; \frac{13\pi}{2}\right]$.
13. а) Решите уравнение $\sqrt{2 \sin x + \sqrt{2}} \cdot \log_4(2 \cos x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
14. а) Решите уравнение $\frac{2 \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x}{\log_{17}(\cos x)} = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.
15. а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg}^2 x - 3}{\log_6(\sin x)} = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

2. НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ

2.1. Рациональные неравенства

1. Решите неравенство $\frac{12x^2 - 31x + 14}{4x^2 + 3x - 1} \leq 0$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно неравенству $\frac{(x-2)(12x-7)}{(4x-1)(x+1)} \leq 0$, откуда $-1 < x < \frac{1}{4}$

или $\frac{7}{12} \leq x \leq 2$.

Ответ: $(-1; \frac{1}{4})$, $[\frac{7}{12}; 2]$.

2. Решите неравенство $\frac{x^5 - x^2}{x^2} \geq \frac{x^3 - 1}{4x^2}$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно неравенству

$$\frac{x^2(x^3 - 1)}{x^2} - \frac{x^3 - 1}{4x^2} \geq 0; \quad \frac{(x^3 - 1)(4x^2 - 1)}{4x^2} \geq 0;$$
$$\frac{(x-1)(x^2 + x + 1)(2x-1)(2x+1)}{x^2} \geq 0; \quad \frac{(x-1)(2x-1)(2x+1)}{x^2} \geq 0,$$

откуда $-\frac{1}{2} \leq x < 0$, $0 < x \leq \frac{1}{2}$ или $x \geq 1$.

Ответ: $[-\frac{1}{2}; 0)$, $(0; \frac{1}{2}]$, $[1; +\infty)$.

3. Решите неравенство $4x^2 - 10x - \frac{8x^3 - 42x^2 + 75x - 51}{2x - 5} \leq -9$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно неравенству

$$\frac{8x^3 - 20x^2 - 20x^2 + 50x - 8x^3 + 42x^2 - 75x + 51 + 18x - 45}{2x - 5} \leq 0;$$
$$\frac{2x^2 - 7x + 6}{2x - 5} \leq 0; \quad \frac{(2x-3)(x-2)}{2x-5} \leq 0, \quad \text{откуда } x \leq \frac{3}{2} \text{ или } 2 \leq x < \frac{5}{2}.$$

Ответ: $(-\infty; \frac{3}{2}]$, $[2; \frac{5}{2})$.

4. Решите неравенство $2x(x-1) \leq -\sqrt{28}(x-1)$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно неравенству

$$(x-1)(2x + 2\sqrt{7}) \leq 0; \quad (x-1)(x + \sqrt{7}) \leq 0,$$

откуда $-\sqrt{7} \leq x \leq 1$.

Ответ: $[-\sqrt{7}; 1]$.

5. Решите неравенство $6x \geq |2x + 6| + |3 - 2x|$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно неравенству $|x + 3| + |x - \frac{3}{2}| - 3x \leq 0$. Рассмотрим три случая.

Первый случай: $x < -3$. Неравенство принимает вид:

$$-x - 3 - x + \frac{3}{2} - 3x \leq 0; \quad 5x \geq -\frac{3}{2}; \quad x \geq -\frac{3}{10}.$$

С учётом условия $x < -3$ получаем, что в этом случае решений нет.

Второй случай: $-3 \leq x < \frac{3}{2}$. Неравенство принимает вид:

$$x + 3 - x + \frac{3}{2} - 3x \leq 0; \quad 3x \geq \frac{9}{2}; \quad x \geq \frac{3}{2}.$$

С учётом условия $-3 \leq x < \frac{3}{2}$ получаем, что в этом случае решений нет.

Третий случай: $x \geq \frac{3}{2}$. Неравенство принимает вид:

$$x + 3 + x - \frac{3}{2} - 3x \leq 0; \quad x \geq \frac{3}{2}.$$

Получаем, что в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x \geq \frac{3}{2}$.

Ответ: $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

6. Решите неравенство $-4|x^2 - 1| - 3 \geq \frac{1}{x^2 - 1}$.

Решение.

Заметим, что $x = \pm 1$ не является решением неравенства.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $-1 < x < 1$. В этом случае $x^2 - 1 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$4x^2 - 4 - 3 \geq \frac{1}{x^2 - 1}; \quad 4x^4 - 11x^2 + 7 \leq 1; \quad (x^2 - 2)(4x^2 - 3) \leq 0.$$

Поскольку $x^2 - 2 < x^2 - 1 < 0$, неравенство равносильно неравенству $4x^2 - 3 \geq 0$, откуда получаем, что $x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ или $x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

С учётом условия $-1 < x < 1$ получаем решение:

$$-1 < x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \leq x < 1.$$

Второй случай: $x < -1$ или $x > 1$. В этом случае $x^2 - 1 > 0$ и неравенство принимает вид:

$$-4x^2 + 4 - 3 \geq \frac{1}{x^2 - 1}; \quad -4x^4 + 5x^2 - 1 \geq 1; \quad 4x^4 - 5x^2 + 2 \leq 0.$$

Последнее неравенство решений не имеет.

Решение неравенства: $-1 < x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \leq x < 1$.

Ответ: $\left(-1; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right], \left[\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$.

7. Решите неравенство $\left|2x^2 + \frac{19}{8}x - \frac{1}{8}\right| \geq 3x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{19}{8}$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно совокупности неравенств:

$$\begin{cases} 2x^2 + \frac{19}{8}x - \frac{1}{8} \geq 3x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{19}{8} & \begin{cases} x^2 - \frac{9}{4}x - \frac{9}{4} \leq 0 \\ x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \leq 0; \end{cases} & \begin{cases} (x-3)\left(x + \frac{3}{4}\right) \leq 0 \\ (x+1)\left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0, \end{cases} \\ -2x^2 - \frac{19}{8}x + \frac{1}{8} \geq 3x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{19}{8}; \end{cases}$$

откуда $-1 \leq x \leq 3$.

Ответ: $[-1; 3]$.

8. Решите неравенство $\frac{1}{|3x+1|} \geq 1-x$.

Решение.

Преобразуем исходное неравенство:

$$\frac{1}{|3x+1|} - 1 + x \geq 0; \quad \frac{1+|3x+1|(x-1)}{|3x+1|} \geq 0.$$

Заметим, что $x = -\frac{1}{3}$ не является решением неравенства, а при $x \neq -\frac{1}{3}$ оно равносильно неравенству $1+|3x+1|(x-1) \geq 0$.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $x < -\frac{1}{3}$. Неравенство принимает вид:

$$1 - (3x+1)(x-1) \geq 0; \quad 3x^2 - 2x - 2 \leq 0; \quad \left(x - \frac{1+\sqrt{7}}{3}\right) \cdot \left(x - \frac{1-\sqrt{7}}{3}\right) \leq 0,$$

откуда $\frac{1-\sqrt{7}}{3} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{7}}{3}$.

С учётом условия $x < -\frac{1}{3}$ получаем решение: $\frac{1-\sqrt{7}}{3} \leq x < -\frac{1}{3}$.

Второй случай: $x > -\frac{1}{3}$. Неравенство принимает вид:

$$1 + (3x+1)(x-1) \geq 0; \quad 3x^2 - 2x \geq 0; \quad x(3x-2) \geq 0,$$

откуда $x \leq 0$ или $x \geq \frac{2}{3}$.

С учётом условия $x > -\frac{1}{3}$ получаем решение: $-\frac{1}{3} < x \leq 0, x \geq \frac{2}{3}$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $\frac{1-\sqrt{7}}{3} \leq x < -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} < x \leq 0, x \geq \frac{2}{3}$.

Ответ: $\left[\frac{1-\sqrt{7}}{3}; -\frac{1}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}; 0\right], \left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

9. Решите неравенство $x(|3x-8| - |x-2|) \leq 2|3x-8| - 2|x-2|$.

Решение.

Преобразуем неравенство: $(x-2)(|3x-8| - |x-2|) \leq 0$.

Заметим, что $x = 2$ является решением неравенства.

Рассмотрим три случая.

Первый случай: $x < 2$. В этом случае $x-2 < 0$, $3x-8 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$-3x+8+x-2 \geq 0; \quad 2x \leq 6; \quad x \leq 3.$$

Получаем, что в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству.

Второй случай: $2 < x \leq \frac{8}{3}$. В этом случае $x-2 > 0$, $3x-8 \leq 0$ и неравенство принимает вид:

$$-3x+8-x+2 \leq 0; \quad 4x \geq 10; \quad x \geq \frac{5}{2}.$$

С учётом условия $2 < x \leq \frac{8}{3}$ получаем решение: $\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{8}{3}$.

Третий случай: $x > \frac{8}{3}$. В этом случае $x-2 > 0$, $3x-8 > 0$ и неравенство принимает вид:

$$3x-8-x+2 \leq 0; \quad 2x \leq 6; \quad x \leq 3.$$

С учётом условия $x > \frac{8}{3}$ получаем решение: $\frac{8}{3} < x \leq 3$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x \leq 2, \frac{5}{2} \leq x \leq 3$.

Ответ: $(-\infty; 2], \left[\frac{5}{2}; 3\right]$.

10. Решите неравенство $\frac{1}{|x+2|} - \frac{1}{|x-3|} \geq -\frac{1}{6}$.

Решение.

Заметим, что $x = -2$ и $x = 3$ не являются решением неравенства, а при $x \neq -2$ и $x \neq 3$ преобразуем неравенство:

$$6(|x-3| - |x+2|) + |x+2||x-3| \geq 0; \quad 6(|x-3| - |x+2|) + |x^2 - x - 6| \geq 0.$$

Рассмотрим три случая.

Первый случай: $x < -2$. В этом случае $x+2 < 0$, $x-3 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$6(-x+3+x+2) + x^2 - x - 6 \geq 0; \quad x^2 - x + 24 \geq 0.$$

Решением последнего неравенства является любое число, значит, в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству.

Второй случай: $-2 < x < 3$. В этом случае $x+2 > 0$, $x-3 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$6(-x+3-x-2) - x^2 + x + 6 \geq 0; \quad x^2 + 11x - 12 \leq 0; \quad (x+12)(x-1) \leq 0,$$

откуда $-12 \leq x \leq 1$.

С учётом условия $-2 < x < 3$ получаем решение: $-2 < x \leq 1$.

Третий случай: $x > 3$. В этом случае $x+2 > 0$, $x-3 > 0$ и неравенство принимает вид:

$$6(x-3-x-2) + x^2 - x - 6 \geq 0; \quad x^2 - x - 36 \geq 0;$$

$$\left(x - \frac{1 - \sqrt{145}}{2}\right) \left(x - \frac{1 + \sqrt{145}}{2}\right) \geq 0,$$

откуда $x \leq \frac{1 - \sqrt{145}}{2}$ или $x \geq \frac{1 + \sqrt{145}}{2}$.

С учётом условия $x > 3$ получаем решение: $x \geq \frac{1 + \sqrt{145}}{2}$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x < -2$, $-2 < x \leq 1$, $x \geq \frac{1 + \sqrt{145}}{2}$.

Ответ: $(-\infty; -2), (-2; 1], \left[\frac{1 + \sqrt{145}}{2}; +\infty\right)$.

11. Решите неравенство $|8x-2| - \frac{16x+5}{8x} \geq \frac{8x-1}{8|x|} - 6$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$2|4x-1| + 4 - \frac{x}{|x|} + \frac{1}{8|x|} - \frac{5}{8x} \geq 0.$$

Заметим, что $x = 0$ не является решением неравенства.

Рассмотрим три случая.

Первый случай: $x < 0$. В этом случае $4x-1 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$-8x + 2 + 4 + 1 - \frac{1}{8x} - \frac{5}{8x} \geq 0; \quad 8x - 7 + \frac{3}{4x} \leq 0.$$

Поскольку $x < 0$, домножим обе части неравенства на $4x$, поменяв знак неравенства:

$$32x^2 - 28x + 3 \geq 0; \quad (8x-1)(4x-3) \geq 0,$$

откуда $x \leq \frac{1}{8}$ или $x \geq \frac{3}{4}$.

Получаем, что в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству.

Второй случай: $0 < x < \frac{1}{4}$. В этом случае $4x-1 < 0$ и неравенство принимает вид:

$$-8x + 2 + 4 - 1 + \frac{1}{8x} - \frac{5}{8x} \geq 0; \quad 8x - 5 + \frac{1}{2x} \leq 0.$$

Домножим обе части неравенства на $2x > 0$:

$$16x^2 - 10x + 1 \leq 0; \quad (8x - 1)(2x - 1) \leq 0,$$

откуда $\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{1}{2}$.

С учётом условия $0 < x < \frac{1}{4}$ получаем решение: $\frac{1}{8} \leq x < \frac{1}{4}$.

Третий случай: $x \geq \frac{1}{4}$. В этом случае $4x - 1 \geq 0$ и неравенство принимает вид:

$$8x - 2 + 4 - 1 + \frac{1}{8x} - \frac{5}{8x} \geq 0; \quad 8x + 1 - \frac{1}{2x} \geq 0.$$

Домножим обе части неравенства на $2x > 0$: $16x^2 + 2x - 1 \geq 0$, откуда $x \leq -\frac{\sqrt{17}+1}{16}$ или $x \geq \frac{\sqrt{17}-1}{16}$.

Получаем, что в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству, поскольку $\frac{\sqrt{17}-1}{16} < \frac{1}{4}$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x < 0$; $x \geq \frac{1}{8}$.

Ответ: $(-\infty; 0)$, $[\frac{1}{8}; +\infty)$.

12. Решите неравенство $\frac{x^2+1}{|x|-1} \leq -\frac{17}{12}$.

Решение.

Пусть $t = |x|$, тогда неравенство принимает вид:

$$\frac{t^2+1}{t-1} \leq -\frac{17}{12}; \quad \frac{t^2+1}{t-1} + \frac{17}{12} \leq 0; \quad \frac{12t^2+17t-5}{12(t-1)} \leq 0; \quad \frac{(3t+5)(4t-1)}{t-1} \leq 0,$$

откуда $t \leq -\frac{5}{3}$ или $\frac{1}{4} \leq t < 1$.

При $t \leq -\frac{5}{3}$ получаем, что $|x| \leq -\frac{5}{3}$ — нет решений.

При $\frac{1}{4} \leq t < 1$ получаем, что $\frac{1}{4} \leq |x| < 1$, откуда $-1 < x \leq -\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{4} \leq x < 1$.

Решение неравенства: $-1 < x \leq -\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4} \leq x < 1$.

Ответ: $(-1; -\frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}; 1)$.

13. Решите неравенство $|4x-1| + |4x-7| \leq 6$.


Решение.

Решим неравенство графическим способом.

Рассмотрим функцию: $f(x) = |4x-1| + |4x-7|$. Её графиком является ломаная: при $x < \frac{1}{4}$ это часть прямой $y = -8x + 8$, при $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{7}{4}$ это часть прямой $y = 6$, а при $x \geq \frac{7}{4}$ это часть прямой $y = 8x - 8$ (см. рисунок).

График функции $f(x)$ лежит не выше прямой $y = 6$ только на своем горизонтальном участке при $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{7}{4}$, а значит, решением исходного неравенства является отрезок $[\frac{1}{4}; \frac{7}{4}]$.

Ответ: $[\frac{1}{4}; \frac{7}{4}]$.



Задания для самостоятельного решения

1. Решите неравенство $\frac{6x^2 - 25x + 21}{3x^2 + 4x - 4} \leq 0$.
2. Решите неравенство $9 \cdot \frac{x^5 - 8x^2}{x^2 + 2x + 1} \geq 16 \cdot \frac{x^3 - 8}{x^2 + 2x + 1}$.
3. Решите неравенство $x^2 - 5x + 10 + \frac{2x^3 - 21x^2 + 75x - 102}{10 - 2x} \leq 1$.
4. Решите неравенство $3x(x - 1) \leq \sqrt{18}(x - 1)$.
5. Решите неравенство $3x - |x + 6| - |3 - x| \geq 0$.
6. Решите неравенство $-6|x^2 - 1| - 1 \geq \frac{1}{x^2 - 1}$.
7. Решите неравенство $\left| x^2 + \frac{17}{4}x + \frac{13}{10} \right| \geq 2x^2 + \frac{53}{20}x + \frac{1}{2}$.
8. Решите неравенство $\frac{1}{|2x - 1|} \geq 1 + \frac{2x}{3}$.
9. Решите неравенство $x(|3x + 8| - |x + 2|) \geq 3|3x + 8| - 3|x + 2|$.
10. Решите неравенство $\frac{2}{|x + 3|} - \frac{2}{|x - 2|} \geq -\frac{1}{3}$.
11. Решите неравенство $|6x - 12| - \frac{3x + 8}{x} \geq \frac{7 - 9x}{|x|} - 5$.
12. Решите неравенство $\frac{3(x + 1)^2 - 16}{3|x + 1| - 6} \leq \frac{11}{6}$.
13. Решите неравенство $|5x - 2| + |5x + 6| \leq 8$.
14. Решите неравенство $x^3 - 6x^2 + \frac{21x^2 + 3x + 12}{x + 4} \geq 3$.
15. Решите неравенство $2|x + 2| + \frac{1}{2}|x - 1| - \frac{1}{2}x \leq 7$.

Тренировочная работа

1. Решите неравенство $\frac{20x^2 - 32x + 3}{3x^2 + 7x + 2} \leq 0$.
2. Решите неравенство $4 \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x + 1} \leq 9 \cdot \frac{x + 1}{x^2 - 2x + 1}$.
3. Решите неравенство $x^2 + 2x - \frac{x^3 + 5x^2 - 21x - 104}{x + 5} \geq 10$.
4. Решите неравенство $x(x - 2) \leq -\sqrt{28}(x - 2)$.
5. Решите неравенство $6x + |2x - 18| + |2x + 9| \geq 0$.

6. Решите неравенство $-8|x^2 - 1| - 2 \geq \frac{1}{x^2 - 1}$.
7. Решите неравенство $\left|x^2 - \frac{29}{12}x - \frac{35}{12}\right| \geq 2x^2 - \frac{61}{12}x - \frac{19}{12}$.
8. Решите неравенство $\frac{1}{|2x+1|} \geq \frac{5+2x}{3}$.
9. Решите неравенство $(x-1)(|3x-14| - |x-4|) \leq |3x-14| - |x-4|$.
10. Решите неравенство $\frac{6}{|x+9|} - \frac{6}{|x|} < 4$.
11. Решите неравенство $|2x-2| - \frac{4x+5}{2x} \geq \frac{2x-1}{2|x|} - 6$.
12. Решите неравенство $\frac{(2x-1)^2}{|2x-1|-2} \leq -\frac{1}{15}$.
13. Решите неравенство $|3x+8| + |3x-2| \leq 10$.
14. Решите неравенство $x^3 + 5x^2 + \frac{28x^2 + 5x - 30}{x-6} \leq 5$.
15. Решите неравенство $4|x+1| + \frac{1}{2}|x-4| - \frac{5}{2}x \leq 12$.

2.2. Логарифмические неравенства

1. Решите неравенство $\log_{6x^2-x-1}(2x^2-5x+3) \geq 0$.


Решение.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < 6x^2 - x - 1 < 1$. В этом случае получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} 6x^2 - x - 1 > 0, \\ 6x^2 - x - 1 < 1, \\ 2x^2 - 5x + 3 > 0, \\ 2x^2 - 5x + 3 \leq 1; \end{cases} \begin{cases} (2x-1)(3x+1) > 0, \\ (2x+1)(3x-2) < 0, \\ (x-1)(2x-3) > 0, \\ (x-2)(2x-1) \leq 0. \end{cases}$$

Изобразим решение каждого неравенства на координатной прямой, расположив рисунки друг под другом:




Получаем решение системы неравенств: $\frac{1}{2} < x < \frac{2}{3}$.

Второй случай: $6x^2 - x - 1 > 1$. В этом случае получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} 6x^2 - x - 1 > 1, \\ 2x^2 - 5x + 3 \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (2x + 1)(3x - 2) > 0, \\ (x - 2)(2x - 1) \geq 0. \end{cases}$$

Изобразим решение каждого неравенства на координатной прямой, расположив рисунки друг под другом:



Решение системы неравенств: $x < -\frac{1}{2}$ или $x \geq 2$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x < -\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < x < \frac{2}{3}$, $x \geq 2$.

Ответ: $(-\infty; -\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}; \frac{2}{3})$, $[2; +\infty)$.

2. Решите неравенство $\log_{4-x} \frac{x+3}{(x-4)^2} \geq -2$.

Решение.

Исходное неравенство равносильно следующему неравенству:

$$\log_{4-x}(x+3) - \log_{4-x}(x-4)^2 \geq -2; \quad \log_{4-x}(x+3) \geq 0.$$

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < 4 - x < 1$. В этом случае получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} \log_{4-x}(x+3) \geq 0, \\ 0 < 4 - x < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x + 3 \leq 1, \\ 3 < x < 4, \end{cases} \quad \text{нет решений.}$$

Второй случай: $4 - x > 1$. В этом случае получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} \log_{4-x}(x+3) \geq 0, \\ 4 - x > 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3 \geq 1, \\ x < 3, \end{cases}$$

откуда $-2 \leq x < 3$.

Решение неравенства: $-2 \leq x < 3$.

Ответ: $[-2; 3)$.

3. Решите неравенство $\log_2^2(-\log_2 x) + \log_2 \log_2^2 x \leq 3$.

Решение.

Из условия следует, что $-\log_2 x > 0$, поэтому $\log_2 \log_2^2 x = 2 \log_2(-\log_2 x)$.

Пусть $t = \log_2(-\log_2 x)$. Тогда неравенство принимает вид:

$$t^2 + 2t \leq 3; \quad (t - 1)(t + 3) \leq 0; \quad -3 \leq t \leq 1.$$

Обратная замена:

$$-3 \leq \log_2(-\log_2 x) \leq 1; \quad \frac{1}{8} \leq -\log_2 x \leq 2; \quad -2 \leq \log_2 x \leq -\frac{1}{8},$$

откуда $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt[8]{2}}$.

Ответ: $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt[8]{2}}\right]$.

4. Решите неравенство $\log_2^2(4x) \cdot \log_4(0,125x)^2 \leq \log_2 3 \cdot \log_3 \frac{x}{8}$.

Решение.

Преобразуем отдельно множители левой части неравенства и произведение, стоящее в правой, с учетом того, что $x > 0$:

$$\log_2^2(4x) = (\log_2 4 + \log_2 x)^2 = (\log_2 x + 2)^2.$$

$$\log_4(0,125x)^2 = \log_2 \frac{x}{8} = \log_2 x - \log_2 8 = \log_2 x - 3.$$

$$\log_2 3 \cdot \log_3 \frac{x}{8} = \frac{\log_3 \frac{x}{8}}{\log_3 2} = \log_2 \frac{x}{8} = \log_2 x - \log_2 8 = \log_2 x - 3.$$

Теперь исходное неравенство примет вид: $(\log_2 x + 2)^2 (\log_2 x - 3) \leq \log_2 x - 3$.

Пусть $t = \log_2 x$. Тогда получаем неравенство

$$(t + 2)^2 (t - 3) \leq t - 3; \quad (t - 3)((t + 2)^2 - 1) \leq 0; \quad (t - 3)(t + 1)(t + 3) \leq 0,$$

откуда $-1 \leq t \leq 3$ или $t \leq -3$.

Обратная замена:

$$\begin{cases} -1 \leq \log_2 x \leq 3 \\ \log_2 x \leq -3; \end{cases} \quad \begin{cases} 0,5 \leq x \leq 8 \\ 0 < x \leq 0,125. \end{cases}$$

Ответ: $(0; 0,125], [0,5; 8]$.

5. Решите неравенство $\log_{123}(4x - x^2) \cdot \log_{\frac{x+1}{2x}} 123 \leq \log_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2x}} (1 + 2x - x^2)$.

Решение.

$$\log_{123}(4x - x^2) \cdot \log_{\frac{x+1}{2x}} 123 \leq \log_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2x}} (1 + 2x - x^2);$$


$$\log_{\frac{x+1}{2x}} (4x - x^2) \leq \log_{\frac{x+1}{2x}} (1 + 2x - x^2).$$

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < \frac{x+1}{2x} < 1$. Получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} 0 < \frac{x+1}{2x} < 1, \\ 4x - x^2 \geq 1 + 2x - x^2, \\ 1 + 2x - x^2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x+1}{2x} > 0, \\ \frac{1-x}{2x} < 0, \\ 2x \geq 1, \\ x^2 - 2x - 1 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x+1}{2x} > 0, \\ \frac{x-1}{2x} > 0, \\ x \geq \frac{1}{2}, \\ (x-1-\sqrt{2})(x-1+\sqrt{2}) < 0. \end{cases}$$

Изобразим множество решений каждого неравенства полученной системы:




Получаем, что $1 < x < 1 + \sqrt{2}$.

Второй случай: $\frac{x+1}{2x} > 1$. Получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{x+1}{2x} > 1, \\ 4x - x^2 \leq 1 + 2x - x^2, \\ 4x - x^2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x-1}{2x} < 0, \\ x(x-4) < 0, \\ 2x \leq 1, \end{cases}$$

откуда $0 < x \leq \frac{1}{2}$.



Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $0 < x \leq \frac{1}{2}$, $1 < x < 1 + \sqrt{2}$.

Ответ: $(0; \frac{1}{2}]$, $(1; 1 + \sqrt{2})$.

6. Решите неравенство $\log_2 \frac{x^2}{4} \cdot \log_{0,5}(0,5x) \leq \frac{\log_3 \frac{x}{2}}{\log_3 2}$.

Решение.

Преобразуем отдельно множители левой части неравенства и частное, стоящее в правой части, с учётом того, что $x > 0$:

$$\log_2 \frac{x^2}{4} = \log_2 x^2 - \log_2 4 = 2\log_2 x - 2; \quad \log_{0,5}(0,5x) = \log_{0,5} 0,5 + \log_{0,5} x = 1 - \log_2 x;$$

$$\frac{\log_3 \frac{x}{2}}{\log_3 2} = \log_2 \frac{x}{2} = \log_2 x - \log_2 2 = \log_2 x - 1.$$

Теперь неравенство примет вид:

$$(2\log_2 x - 2) \cdot (1 - \log_2 x) \leq \log_2 x - 1; \quad -2(\log_2 x - 1)^2 \leq \log_2 x - 1.$$

Пусть $t = \log_2 x$, тогда неравенство принимает вид:

$$-2(t-1)^2 \leq t-1; \quad (t-1)(2t-1) \geq 0,$$

откуда $t \leq \frac{1}{2}$ или $t \geq 1$.

Обратная замена:

$$\begin{cases} \log_2 x \leq \frac{1}{2} \\ \log_2 x \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x \leq \sqrt{2} \\ x \geq 2. \end{cases}$$

Ответ: $(0; \sqrt{2}]$, $[2; +\infty)$.

7. Решите неравенство $\log_3 \frac{1}{x} + \log_{\frac{1}{x}} 3 \leq 2,5$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$-\log_3 x - \log_x 3 \leq 2,5; \quad \log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} + 2,5 \geq 0.$$

Пусть $z = \log_3 x$, тогда неравенство принимает вид:

$$z + \frac{1}{z} + 2,5 \geq 0; \quad \frac{2z^2 + 5z + 2}{z} \geq 0; \quad \frac{(2z+1)(z+2)}{z} \geq 0; \quad \begin{cases} -2 \leq z \leq -0,5 \\ z > 0. \end{cases}$$

Обратная замена: $\begin{cases} -2 \leq \log_3 x \leq -0,5 \\ \log_3 x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{9} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \\ x > 1. \end{cases}$

Ответ: $[\frac{1}{9}; \frac{1}{\sqrt{3}}]$, $(1; +\infty)$.

8. Решите неравенство $\log_{x^2}(x+1)^2 \leq 1$.

Решение.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < x^2 < 1$. Неравенство принимает вид:

$$(x+1)^2 \geq x^2; \quad 2x+1 \geq 0; \quad x \geq -\frac{1}{2}.$$

С учётом условия $0 < x^2 < 1$ получаем решение: $-\frac{1}{2} \leq x < 0$, $0 < x < 1$.

Второй случай: $x^2 > 1$. Неравенство принимает вид:

$$0 < (x+1)^2 \leq x^2; \quad \begin{cases} 2x+1 \leq 0; \\ x \neq -1, \end{cases} \quad \text{откуда } x < -1 \text{ или } -1 < x \leq -\frac{1}{2}.$$

С учётом условия $x^2 > 1$ получаем решение: $x < -1$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $x < -1$, $-\frac{1}{2} \leq x < 0$, $0 < x < 1$.

Ответ: $(-\infty; -1)$, $[-\frac{1}{2}; 0)$, $(0; 1)$.

9. Решите неравенство $\log_{x-3}(x-1) \cdot \log_{2x+3}(x-3) \geq 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\log_{x-3}(x-1)}{\log_{x-3}(2x+3)} \geq 0; \quad \begin{cases} \log_{2x+3}(x-1) \geq 0, \\ x-3 > 0, \\ x-3 \neq 1. \end{cases}$$

Решим неравенство $\log_{2x+3}(x-1) \geq 0$. Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < 2x+3 < 1$, то есть $-\frac{3}{2} < x < -1$. В этом случае неравенство принимает вид:

$$0 < x-1 \leq 1; \quad 1 < x \leq 2,$$

откуда с учётом условия $-\frac{3}{2} < x < -1$ получаем, что решений нет.

Второй случай: $2x+3 > 1$, то есть $x > -1$. В этом случае неравенство принимает вид:

$$x-1 \geq 1; \quad x \geq 2,$$

откуда с учётом условия $x > -1$ получаем решение: $x \geq 2$.

Исходное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq 2, \\ x > 3, \\ x \neq 4, \end{cases}$$

откуда получаем решение: $3 < x < 4, x > 4$.

Ответ: (3; 4), (4; +∞).

10. Решите неравенство $\log_{x^2-1}(2x^2+3x+1) \leq 1$.

Решение.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < x^2-1 < 1$, то есть $1 < x^2 < 2$. Неравенство принимает вид:

$$2x^2+3x+1 \geq x^2-1; \quad x^2+3x+2 \geq 0; \quad (x+1)(x+2) \geq 0,$$

откуда с учётом условия $1 < x^2 < 2$ получаем решение: $1 < x < \sqrt{2}$.

Второй случай: $x^2-1 > 1$, то есть $x^2 > 2$. Неравенство принимает вид:

$$0 < 2x^2+3x+1 \leq x^2-1; \quad \begin{cases} x^2+3x+2 \leq 0, \\ 2x^2+3x+1 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+1)(x+2) \leq 0, \\ (2x+1)(x+1) > 0, \end{cases}$$

откуда $-2 \leq x \leq -1$. С учётом условия $x^2 > 2$ получаем решение: $-2 \leq x < -\sqrt{2}$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $-2 \leq x < -\sqrt{2}; 1 < x < \sqrt{2}$.

Ответ: $[-2; -\sqrt{2})$, $(1; \sqrt{2})$.

Задания для самостоятельного решения

1. Решите неравенство $\log_{2x^2+9x+10}(3x^2+4x+1) \leq 0$.

2. Решите неравенство $\log_{3-x} \frac{x+4}{(x-3)^4} \geq -4$.

3. Решите неравенство $\log_2^2(-\log_3 x) + \log_2 \log_3^2 x \leq 8$.
4. Решите неравенство $\log_4^2(16x) \cdot \log_{16}(0,0625x)^2 \leq \log_4 \frac{x}{16}$.
5. Решите неравенство $\log_{813}(x^2 - 4x + 3) \cdot \log_{\frac{2x+3}{3x}} 813 \leq \log_{\frac{2}{3} + \frac{1}{x}}(x^2 - 2x - 8)$.
6. Решите неравенство $\log_5 \frac{x^3}{25} \cdot \log_{0,2}(0,04x) \leq \frac{5 \log_2 \frac{x}{25}}{\log_2 5}$.
7. Решите неравенство $\log_4 \frac{1}{x} + \log_{\frac{1}{x}} 8 \leq 3,5$.
8. Решите неравенство $\log_{x^2-1}(x+2)^2 \leq 1$.
9. Решите неравенство $\log_{x-2}(x+3) \cdot \log_{3x+4}(x-2) \geq 0$.
10. Решите неравенство $\log_{2x^2-1}(x^2 + 3x - 3) \geq 1$.

Тренировочная работа

1. Решите неравенство $\log_{6x^2+5x}(2x^2 - 3x + 1) \geq 0$.
2. Решите неравенство $\log_{5-x} \frac{x+2}{(x-5)^4} \geq -4$.
3. Решите неравенство $\log_{0,5}^2(-\log_3 x) - \log_{0,5} \log_3^2 x \leq 3$.
4. Решите неравенство $\log_{0,5}^2(4x) \cdot \log_{0,25}(0,25x)^2 \leq \log_{0,5} 5 \cdot \log_5 \frac{x}{4}$.
5. Решите неравенство $\log_{12}(x^2 + 2x - 3) \cdot \log_{\frac{2x-2}{x}} 12 \leq \log_{2-\frac{2}{x}}(x^2 - 5x + 6)$.
6. Решите неравенство $\log_3 \frac{x^2}{81} \cdot \log_{\frac{1}{3}} \frac{x}{9} \leq \frac{3 \log_2 \frac{x}{9}}{\log_2 3}$.
7. Решите неравенство $\log_5 \frac{1}{x} + \log_{\frac{1}{x}} \sqrt{5} \leq -1,5$.
8. Решите неравенство $\log_{x^2-2}(x+2)^2 \leq 1$.
9. Решите неравенство $\log_{x+2}(x+4) \cdot \log_{2x+5}(x+2) \geq 0$.
10. Решите неравенство $\log_{2x^2+x-1}(3x^2 - x - 4) \geq 1$.

2.3. Показательные неравенства

1. Решите неравенство $2^{2x+4} - 16 \cdot 2^{x+3} - 2^{x+1} + 16 \leq 0$.

Решение.

Пусть $t = 2^x$, тогда неравенство принимает вид:

$$16t^2 - 128t - 2t + 16 \leq 0; \quad 8t^2 - 64t - t + 8 \leq 0;$$

$$8t(t-8) - (t-8) \leq 0; \quad (8t-1)(t-8) \leq 0,$$

откуда $\frac{1}{8} \leq t \leq 8$.

Обратная замена: $\frac{1}{8} \leq 2^x \leq 8$, откуда $-3 \leq x \leq 3$.

Ответ: $[-3; 3]$.

2. Решите неравенство $\frac{6}{2^x - 2} - \frac{1}{2^x - 4} \leq 0,75$.

Решение.

Пусть $t = 2^x - 3$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{6}{t+1} - \frac{1}{t-1} \leq \frac{3}{4}; \quad \frac{24t - 24 - 4t - 4 - 3t^2 + 3}{4(t+1)(t-1)} \leq 0; \quad \frac{-3t^2 + 20t - 25}{(t+1)(t-1)} \leq 0;$$

$$\frac{3t^2 - 20t + 25}{(t+1)(t-1)} \geq 0; \quad \frac{(3t-5)(t-5)}{(t+1)(t-1)} \geq 0,$$

откуда $t < -1$, $1 < t \leq \frac{5}{3}$ или $t \geq 5$.

При $t < -1$ имеем: $2^x - 3 < -1$; $2^x < 2$; $x < 1$.

При $1 < t \leq \frac{5}{3}$ имеем: $1 < 2^x - 3 \leq \frac{5}{3}$, $4 < 2^x \leq \frac{14}{3}$; $2 < x \leq \log_2 \frac{14}{3}$.

При $t \geq 5$ имеем: $2^x - 3 \geq 5$; $2^x \geq 8$; $x \geq 3$.

Ответ: $(-\infty; 1)$, $(2; \log_2 \frac{14}{3}]$, $[3; +\infty)$.

3. Решите неравенство $\frac{\left(\frac{10}{3}\right)^{-|x^2+4x+2|} - 0,09}{2x+5} \leq 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\left(\frac{3}{10}\right)^{|x^2+4x+2|} - \left(\frac{3}{10}\right)^2}{2x+5} \leq 0; \quad \frac{\left(\frac{3}{10}\right)^{|x^2+4x+2|-2} - 1}{2x+5} \leq 0.$$

Полученное неравенство равносильно неравенству $\frac{|x^2+4x+2|-2}{2x+5} \geq 0$, так как $\frac{3}{10} < 1$.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $x^2 + 4x + 2 < 0$. Неравенство принимает вид:

$$\frac{-x^2 - 4x - 2 - 2}{2x+5} \geq 0; \quad \frac{x^2 + 4x + 4}{2x+5} \leq 0; \quad \frac{(x+2)^2}{2x+5} \leq 0,$$

откуда $x < -\frac{5}{2}$ или $x = -2$.

С учётом неравенства $x^2 + 4x + 2 < 0$, то есть $-2 - \sqrt{2} < x < -2 + \sqrt{2}$, получаем решение в этом случае: $-2 - \sqrt{2} < x < -\frac{5}{2}$; $x = -2$.

Второй случай: $x^2 + 4x + 2 \geq 0$. Неравенство принимает вид:

$$\frac{x^2 + 4x + 2 - 2}{2x + 5} \geq 0; \quad \frac{x^2 + 4x}{2x + 5} \geq 0; \quad \frac{x(x + 4)}{2x + 5} \geq 0,$$

откуда $-4 < x < -\frac{5}{2}$ или $x \geq 0$.

С учётом условия $x^2 + 4x + 2 \geq 0$, то есть $x \leq -2 - \sqrt{2}$ или $x \geq -2 + \sqrt{2}$, получаем решение в этом случае: $-4 \leq x \leq -2 - \sqrt{2}$ или $x \geq 0$.

Объединяя все случаи, получаем решение неравенства: $-4 \leq x < -\frac{5}{2}$, $x = -2$, $x \geq 0$.

Ответ: $[-4; -\frac{5}{2})$, -2 , $[0; +\infty)$.

4. Решите неравенство $4^{\frac{9x^2}{4}} - \left(\frac{3x}{2} + 1\right)^{\frac{9x^2 - 4}{4 \log_2(\frac{3x}{2} + 1)}} \leq 3$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$4^{\frac{9x^2}{4}} - \left(\frac{3x}{2} + 1\right)^{\left(\log_{\frac{3x}{2} + 1} 2\right) \cdot \frac{9x^2 - 4}{4}} \leq 3;$$

$$\begin{cases} 4^{\frac{9x^2}{4}} - 2^{\frac{9x^2 - 4}{4}} \leq 3, \\ \frac{3x}{2} + 1 > 0, \\ \frac{3x}{2} + 1 \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 2 \cdot 4^{\frac{9x^2}{4}} - 2^{\frac{9x^2}{4}} \leq 6, \\ x > -\frac{2}{3}, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Пусть $t = 2^{\frac{9x^2}{4}}$. Тогда первое неравенство системы принимает вид:

$$2t^2 - t \leq 6; \quad 2t^2 - t - 6 \leq 0; \quad (2t + 3)(t - 2) \leq 0,$$

откуда $-\frac{3}{2} \leq t \leq 2$.

Обратная замена: $-\frac{3}{2} \leq 2^{\frac{9x^2}{4}} \leq 2$; $\frac{9x^2}{4} \leq 1$; $x^2 \leq \frac{4}{9}$, откуда $-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$.

С учётом условий $\begin{cases} x > -\frac{2}{3}, \\ x \neq 0 \end{cases}$ получаем решение исходного неравенства: $-\frac{2}{3} < x < 0$,

$0 < x \leq \frac{2}{3}$.

Ответ: $(-\frac{2}{3}; 0)$, $(0; \frac{2}{3}]$.

5. Решите неравенство $\frac{7^{(x^2+1)\log_7 2} - 32^x}{1-3x} \geq 0$.

Решение.

$$\frac{7^{(x^2+1)\log_7 2} - 32^x}{1-3x} \geq 0; \quad \frac{(7^{\log_7 2})^{2(x^2+1)} - 32^x}{1-3x} \geq 0;$$

$$\frac{2^{2x^2+2} - 2^{5x}}{3x-1} \leq 0; \quad \frac{2x^2+2-5x}{3x-1} \leq 0; \quad \frac{(2x-1)(x-2)}{3x-1} \leq 0,$$

откуда $x < \frac{1}{3}$ или $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$.

Ответ: $(-\infty; \frac{1}{3}), [\frac{1}{2}; 2]$.

6. Решите неравенство $(5 \cdot 2^{x^2})^{\frac{1}{x}} - 2(2 \cdot 5^{\frac{1}{x}})^{x-1} \geq 2^{x+2}$.

Решение.

$$(5 \cdot 2^{x^2})^{\frac{1}{x}} - 2(2 \cdot 5^{\frac{1}{x}})^{x-1} \geq 2^{x+2}; \quad 5^{\frac{1}{x}} \cdot 2^x - 2 \cdot 2^{x-1} \cdot 5^{1-\frac{1}{x}} \geq 4 \cdot 2^x;$$

$$2^x(5^{\frac{1}{x}} - 5^{1-\frac{1}{x}}) \geq 4 \cdot 2^x; \quad 5^{\frac{1}{x}} - 5^{1-\frac{1}{x}} \geq 4.$$

Пусть $t = 5^{\frac{1}{x}}$, тогда неравенство принимает вид:

$$t - \frac{5}{t} \geq 4; \quad \frac{t^2 - 4t - 5}{t} \geq 0; \quad \frac{(t-5)(t+1)}{t} \geq 0,$$

откуда $-1 \leq t < 0$ или $t \geq 5$.

При $-1 \leq t < 0$ имеем: $-1 \leq 5^{\frac{1}{x}} < 0$ — нет решений.

При $t \geq 5$ имеем: $5^{\frac{1}{x}} \geq 5; \frac{1}{x} \geq 1$, откуда $0 < x \leq 1$.

Ответ: $(0; 1]$.

7. Решите неравенство $54 \cdot 3^{x^2+2x-1} - 3^{|-15x+20|} \geq 3^{x^2+2x+2}$.

Решение.

Представим 54 как $2 \cdot 3^3$, тогда неравенство примет вид:

$$2 \cdot 3^{x^2+2x+2} - 3^{|-15x+20|} \geq 3^{x^2+2x+2}; \quad 3^{x^2+2x+2} \geq 3^{|-15x+20|}; \quad x^2+2x+2 \geq |-15x+20|;$$

$$\begin{cases} x^2+2x+2 \geq -15x+20, & \begin{cases} x^2+17x-18 \geq 0, & \begin{cases} (x+18)(x-1) \geq 0, \\ (x-2)(x-11) \geq 0, \end{cases} \end{cases} \\ x^2+2x+2 \geq 15x-20; & \begin{cases} x^2-13x+22 \geq 0; \end{cases} \end{cases}$$

откуда $x < -18; 1 < x \leq 2$ или $x > 11$.

Ответ: $(-\infty; -18], [1; 2], [11; +\infty)$.

8. Решите неравенство $45^x - 3 \cdot 5^x + 0,6 < \frac{9^x}{5}$.

Решение.

$$45^x - 3 \cdot 5^x + 0,6 < \frac{9^x}{5}; \quad (5^x - 0,2)(9^x - 3) < 0; \quad (5^x - 5^{-1})(3^{2x} - 3) < 0;$$

$$(x + 1)(2x - 1) < 0,$$

откуда $-1 < x < 0,5$.

Ответ: $(-1; 0,5)$.

9. Решите неравенство $2^x \cdot 3^{\frac{1}{x}} > 6$.

Решение.

Возьмем от каждой из частей неравенства логарифм по основанию 2:

$$\log_2 \left(2^x \cdot 3^{\frac{1}{x}} \right) > \log_2 6; \quad x + \frac{1}{x} \log_2 3 > \log_2 3 + 1;$$

$$\frac{x^2 - x(1 + \log_2 3) + \log_2 3}{x} > 0; \quad \frac{(x-1)(x - \log_2 3)}{x} > 0,$$

откуда $0 < x < 1$ или $x > \log_2 3$.

Ответ: $(0; 1), (\log_2 3; +\infty)$.

10. Решите неравенство $4 \cdot 16^{-x} - 65 \cdot 4^{-x} + 16 \leq 0$.

Решение.

Пусть $t = 4^{-x}$, тогда неравенство принимает вид:

$$4t^2 - 65t + 16 \leq 0; \quad (4t - 1)(t - 16) \leq 0;$$

откуда $\frac{1}{4} \leq t \leq 16$.

Обратная замена: $\frac{1}{4} \leq 4^{-x} \leq 16; \quad -1 \leq -x \leq 2$, откуда $-2 \leq x \leq 1$.

Ответ: $[-2; 1]$.

Задания для самостоятельного решения

1. Решите неравенство $5^{2x+4} - 25 \cdot 5^{x+4} - 5^x + 25 \leq 0$.

2. Решите неравенство $\frac{6}{1 - 2 \cdot 2^x} - \frac{1}{1 - 4 \cdot 2^x} \leq \frac{3}{2^{x+2}}$.

3. Решите неравенство $\frac{4^{-|x^2 - 4x + 2|} - \frac{1}{16}}{5 - 2x} \leq 0$.

4. Решите неравенство $4^{x^2} - (1 - x)^{\frac{x^2 - 1}{\log_2(1 - x)}} \leq 3$.

5. Решите неравенство $\frac{5^{(x^2 - 3)\log \sqrt{5}^3} - 27^{x+7}}{6 - x} \geq 0$.

6. Решите неравенство $(9 \cdot 5^{x^2})^{\frac{1}{x}} - 50 \left(5 \cdot 3^{\frac{1}{x}}\right)^{x-2} \geq 5^x$.

7. Решите неравенство $6 \cdot 5^{2x^2 - 7x + 13} - 5^{|-9x + 17|} \geq 5^{2x^2 - 7x + 14}$.

8. Решите неравенство $250^x - 5 \cdot 2^x + 1,25 < \frac{5^{3x}}{4}$.

9. Решите неравенство $3^x \cdot 25^{\frac{1}{x}} \geq 45$.

10. Решите неравенство $9^{\frac{3}{2}-x} - 244 \cdot 3^{-x} + 9 \leq 0$.

Тренировочная работа

1. Решите неравенство $0,5^{2x+5} - 2 \cdot 0,5^{x+3} - 64 \cdot 0,5^{x+2} + 128 \leq 0$.

2. Решите неравенство $\frac{6}{2^{x-2} - 2} - \frac{1}{2^{x-2} - 4} \leq \frac{3}{4}$.

3. Решите неравенство $\frac{5^{-|0,25x^2 + 2x + 2|} - 0,04}{x + 5} \leq 0$.

4. Решите неравенство $4^{(x+1)^2} - (-x)^{\frac{(x+1)^2 - 1}{\log_2(-x)}} \leq 3$.

5. Решите неравенство $\frac{3^{(x^2-1)\log_{\sqrt{3}}16} - 32^{x-1}}{1-2x} \leq 0$.

6. Решите неравенство $(7 \cdot 6^{x^2})^{\frac{1}{x}} - 6 \left(6 \cdot 7^{\frac{1}{x}}\right)^{x-1} \geq 6^{x+1}$.

7. Решите неравенство $4^{x^2 - 9x + 54} - 4^{|-12x + 57|} \geq 3 \cdot 4^{x^2 - 9x + 53}$.

8. Решите неравенство $12^x - 729 \cdot 4^x + 364,5 < \frac{3^x}{2}$.

9. Решите неравенство $8^{x+1} \cdot 3^{-\frac{1}{x}} > 3$.

10. Решите неравенство $81^{\frac{3}{4}-x} - 730 \cdot 9^{-x} + 27 \leq 0$.

2.4. Системы неравенств

1. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} 3^x + \frac{54}{3^x} \geq 29, \\ \log_{x+3} \left(\frac{x+1}{4} \right) \leq 0. \end{cases}$$

Решение.

1. Решим первое неравенство системы: $3^x + \frac{54}{3^x} \geq 29$.

Пусть $t = 3^x$, тогда неравенство примет вид:

$$t + \frac{54}{t} - 29 \geq 0; \quad \frac{t^2 - 29t + 54}{t} \geq 0; \quad \frac{(t-2)(t-27)}{t} \geq 0,$$

откуда $0 < t \leq 2$; $t \geq 27$.

При $0 < t \leq 2$ получим: $0 < 3^x \leq 2$, откуда $x \leq \log_3 2$.

При $t \geq 27$ получим: $3^x \geq 27$, откуда $x \geq 3$.

Решение первого неравенства исходной системы: $x \leq \log_3 2$, $x \geq 3$.

2. Решим второе неравенство системы: $\log_{x+3} \left(\frac{x+1}{4} \right) \leq 0$.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $0 < x+3 < 1$.

$$\begin{cases} \frac{x+1}{4} \geq 1, \\ 0 < x+3 < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3, \\ -3 < x < -2; \end{cases} \quad \text{нет решений.}$$

Второй случай: $x+3 > 1$.

$$\begin{cases} 0 < \frac{x+1}{4} \leq 1, \\ x+3 > 1; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 < x \leq 3, \\ x > -2, \end{cases} \quad \text{откуда } -1 < x \leq 3.$$

Решение второго неравенства исходной системы: $-1 < x \leq 3$.

3. Поскольку $-1 < \log_3 2 < 3$, получаем решение исходной системы неравенств: $-1 < x \leq \log_3 2$, $x = 3$.



Ответ: $(-1; \log_3 2]$, 3.

2. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} \log_{2-x}(x+2) \cdot \log_{x+3}(3-x) \leq 0, \\ 4^{x^2+x-3} - 0,5^{2x^2-6x-2} \leq 0. \end{cases}$$

Решение.

1. Решим первое неравенство системы: $\log_{2-x}(x+2) \cdot \log_{x+3}(3-x) \leq 0$.

Значения, при которых определено неравенство: $-2 < x < 1$, $1 < x < 2$.

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $-2 < x < 1$. Получаем, что $x+3 > 1$, $3-x > 2$, а значит, $\log_{x+3}(3-x) > 0$; $2-x > 1$, тогда

$$\begin{cases} \log_{2-x}(x+2) \cdot \log_{x+3}(3-x) \leq 0, \\ -2 < x < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_{2-x}(x+2) \leq 0, \\ -2 < x < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x+2 \leq 1, \\ -2 < x < 1, \end{cases}$$

откуда $-2 < x \leq -1$.

Второй случай: $1 < x < 2$. Получаем, что $0 < 2 - x < 1$, $x + 2 > 3$, $x + 3 > 4$, $3 - x > 1$, а значит, $\log_{2-x}(x+2) < 0$ и $\log_{x+3}(3-x) > 0$, следовательно, при $1 < x < 2$ первое неравенство исходной системы верно.

Решение первого неравенства исходной системы: $-2 < x \leq -1$, $1 < x < 2$.

2. Решим второе неравенство системы:


$$4^{x^2+x-3} - 0,5^{2x^2-6x-2} \leq 0; \quad 2^{2x^2+2x-6} \leq 2^{-2x^2+6x+2};$$

$$2x^2 + 2x - 6 \leq -2x^2 + 6x + 2; \quad x^2 - x - 2 \leq 0,$$

откуда $-1 \leq x \leq 2$.

Решение второго неравенства исходной системы: $-1 \leq x \leq 2$.

3. Решение исходной системы неравенств: $x = -1$, $1 < x < 2$.



Ответ: -1 , $(1; 2)$.

3. Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 4^{x-\frac{1}{2}} - 17 \cdot 2^{x-2} + 2 \leq 0, \\ \log_{3x-5}(2x^2 - 9x + 10) \geq 0. \end{cases}$$

Решение.

1. Решим первое неравенство системы: $4^{x-\frac{1}{2}} - 17 \cdot 2^{x-2} + 2 \leq 0$.

Пусть $t = 2^x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t^2}{2} - \frac{17}{4}t + 2 \leq 0; \quad 2t^2 - 17t + 8 \leq 0; \quad (2t-1)(t-8) \leq 0,$$

откуда $\frac{1}{2} \leq t \leq 8$; $\frac{1}{2} \leq 2^x \leq 8$; $-1 \leq x \leq 3$.

Решение первого неравенства исходной системы: $-1 \leq x \leq 3$.

2. Решим второе неравенство системы: $\log_{3x-5}(2x^2 - 9x + 10) \geq 0$.

Рассмотрим два случая. Первый случай: $0 < 3x - 5 < 1$.

$$\begin{cases} 0 < 3x - 5 < 1, \\ \log_{3x-5}(2x^2 - 9x + 10) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5}{3} < x < 2, \\ 0 < 2x^2 - 9x + 10 \leq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5}{3} < x < 2, \\ (2x-5)(x-2) > 0, \\ (2x-3)(x-3) \leq 0, \end{cases}$$

откуда $\frac{5}{3} < x < 2$.


Второй случай: $3x - 5 > 1$.

$$\begin{cases} 3x - 5 > 1, \\ \log_{3x-5}(2x^2 - 9x + 10) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ 2x^2 - 9x + 10 \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ (2x-3)(x-3) \geq 0, \end{cases}$$

откуда $x \geq 3$.

Решение второго неравенства исходной системы: $\frac{5}{3} < x < 2$, $x \geq 3$.

3. Решение исходной системы неравенств: $\frac{5}{3} < x < 2$, $x = 3$.



Ответ: $(\frac{5}{3}; 2)$, 3.

$$4. \text{ Решите систему неравенств } \begin{cases} 25^{x-\frac{1}{2}} - 26 \cdot 5^{x-1} + 5 \geq 0, \\ x \cdot \log_5(3+x-x^2) \geq 0. \end{cases}$$

Решение.

1. Решим первое неравенство системы: $25^{x-\frac{1}{2}} - 26 \cdot 5^{x-1} + 5 \geq 0$.

Пусть $t = 5^x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t^2}{5} - \frac{26}{5}t + 5 \geq 0; \quad t^2 - 26t + 25 \geq 0; \quad (t-1)(t-25) \geq 0,$$

откуда $t \leq 1$ или $t \geq 25$.

При $t \leq 1$ получим: $5^x \leq 1$, откуда $x \leq 0$.

При $t \geq 25$ получим: $5^x \geq 25$, откуда $x \geq 2$.

Решение первого неравенства исходной системы: $x \leq 0, x \geq 2$.

2. Решим второе неравенство системы: $x \cdot \log_5(3+x-x^2) \geq 0$.

Очевидно, $x = 0$ является решением.

При $x \neq 0$ рассмотрим два случая.

Первый случай: $x > 0$.

$$\begin{cases} x > 0, \\ \log_5(3+x-x^2) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ 3+x-x^2 \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ (x+1)(x-2) \leq 0, \end{cases}$$

откуда $0 < x \leq 2$.

Второй случай: $x < 0$.


$$\begin{cases} x < 0, \\ \log_5(3+x-x^2) \leq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x < 0, \\ 0 < 3+x-x^2 \leq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 0, \\ \left(x - \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)\left(x - \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) < 0, \\ (x+1)(x-2) \geq 0, \end{cases}$$

откуда $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < x \leq -1$.

Решение второго неравенства исходной системы: $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < x \leq -1, 0 \leq x \leq 2$.

3. Решение исходной системы неравенств: $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < x \leq -1, x = 0, x = 2$.



Ответ: $\left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}; -1\right], 0, 2$.

5. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5} \leq 2, \\ 3|x + 1| + \frac{1}{2}|x - 2| - \frac{3}{2}x \leq 8. \end{cases}$$

Решение.

1. Решим первое неравенство системы:

$$x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5} \leq 2; \quad x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2}{x - 5} \leq 0;$$

$$\frac{x^4 + x^3 - 2x^2}{x - 5} \leq 0; \quad \frac{x^2(x + 2)(x - 1)}{x - 5} \leq 0,$$

откуда $x \leq -2$, $x = 0$ или $1 \leq x < 5$.

Решение первого неравенства исходной системы: $x \leq -2$, $x = 0$, $1 \leq x < 5$.

2. Решим второе неравенство системы $3|x + 1| + \frac{1}{2}|x - 2| - \frac{3}{2}x \leq 8$.

Рассмотрим три случая.

Первый случай: $x < -1$. Неравенство принимает вид:

$$-3x - 3 - \frac{1}{2}x + 1 - \frac{3}{2}x \leq 8; \quad 5x \geq -10; \quad x \geq -2.$$

С учётом условия $x < -1$ получаем решение: $-2 \leq x < -1$.

Второй случай: $-1 \leq x < 2$. Неравенство принимает вид:

$$3x + 3 - \frac{1}{2}x + 1 - \frac{3}{2}x \leq 8; \quad x \leq 4.$$

Получаем, что в этом случае все значения переменной удовлетворяют исходному неравенству.

Третий случай: $x \geq 2$. Неравенство принимает вид:

$$3x + 3 + \frac{1}{2}x - 1 - \frac{3}{2}x \leq 8; \quad 2x \leq 6; \quad x \leq 3.$$

С учётом условия $x \geq 2$ получаем решение: $2 \leq x \leq 3$.

Решение второго неравенства исходной системы: $-2 \leq x \leq 3$.

3. Решение исходной системы неравенств: $x = -2$, $x = 0$, $1 \leq x \leq 3$.



Ответ: $-2, 0, [1; 3]$.

Задания для самостоятельного решения

1. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} \frac{320 - 4^{-x}}{64 - 2^{-x}} \geq 5, \\ \log_{0,25x^2} \left(\frac{x+6}{4} \right) \leq 1. \end{cases}$$

2. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} 5^{x+2} + 2 \cdot 5^{-x} \geq 51, \\ \log_{2x} 0,25 \geq \log_2 32x - 1. \end{cases}$$

3. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} 3 \cdot 9^{-x} - 28 \cdot 3^{-x} + 9 \leq 0, \\ \log_{x^2} (x+1)^2 \leq 1. \end{cases}$$

4. Решите систему неравенств $\begin{cases} 4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \geq 0, \\ \log_3 \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 1} \leq 1. \end{cases}$

5. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2^x + \frac{80}{2^x} \geq 21, \\ \log_{x-1} \left(\frac{x+1}{5} \right) \leq 0. \end{cases}$

6. Решите систему неравенств $\begin{cases} \log_{3-x}(x+3) \cdot \log_{x+4}(5-x) \leq 0, \\ 16^{x^2-5x+5} - 0,25^{2x^2+8x-30} \leq 0. \end{cases}$

7. Решите систему неравенств $\begin{cases} 9^{x-\frac{3}{2}} - 82 \cdot 3^{x-3} + 3 \leq 0, \\ \log_{3x-8}(2x^2 - 13x + 21) \geq 0. \end{cases}$

8. Решите систему неравенств $\begin{cases} 81^{x+\frac{1}{2}} - 10 \cdot 9^x + 1 \geq 0, \\ x \cdot \log_8(5 + 3x - x^2) \leq 0. \end{cases}$

9. Решите систему неравенств $\begin{cases} 16^{x+\frac{3}{4}} - 33 \cdot 4^{x-\frac{1}{2}} + 1 \geq 0, \\ (x-1) \cdot \log_{x+5}(x+3) \cdot \log_5(x+5)^2 \leq 0. \end{cases}$

10. Решите систему неравенств $\begin{cases} 3^x + 8 \cdot 3^{-x} \geq 9, \\ 2 \log_{(x^2-4x+5)^2}(4x^2+1) \leq \log_{x^2-4x+5}(3x^2+4x+1). \end{cases}$

11. Решите систему неравенств $\begin{cases} 9^{x+\frac{1}{9}} - 4 \cdot 3^{x+\frac{10}{9}} + 27 \geq 0, \\ \log_{8x^2-23x+15}(2x-2) \leq 0. \end{cases}$

12. Решите систему неравенств $\begin{cases} \log_{7-x} \frac{x+3}{(x-7)^8} \geq -8, \\ x^3 + 6x^2 + \frac{40x^2+3x-24}{x-8} \leq 3. \end{cases}$

13. Решите систему неравенств $\begin{cases} \log_{4-x}(28-3x-x^2) \leq 1, \\ x+7 + \frac{14x-24}{x^2-4x+3} \geq \frac{5}{x-1}. \end{cases}$

14. Решите систему неравенств $\begin{cases} \log_{3-x} \frac{(x-3)^4}{x} \geq 4, \\ \frac{x^2-12x+12}{x-1} + \frac{x^2-5x+3}{x-5} \leq 2x-11. \end{cases}$

15. Решите систему неравенств $\begin{cases} \log_{-1-x} \frac{-4-x}{x+1} \leq -1, \\ \frac{x^2+6x+7}{x+2} + \frac{2-6x}{x} \leq x-2. \end{cases}$

3. ЗАДАНИЯ С ПАРАМЕТРОМ

1. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\left| \frac{5}{x} - 3 \right| = ax - 2$$

на промежутке $(0; +\infty)$ имеет более двух корней.

Решение.

Рассмотрим функции $f(x) = ax - 2$ и $g(x) = \left| \frac{5}{x} - 3 \right|$. Исследуем уравнение $f(x) = g(x)$ на промежутке $(0; +\infty)$.

При $a \leq 0$ все значения функции $f(x)$ на промежутке $(0; +\infty)$ отрицательны, а все значения функции $g(x)$ — неотрицательны, поэтому при $a \leq 0$ уравнение $f(x) = g(x)$ не имеет решений на промежутке $(0; +\infty)$.

При $a > 0$ функция $f(x)$ возрастает. Функция $g(x)$ убывает на промежутке $\left(0; \frac{5}{3}\right]$, поэтому уравнение $f(x) = g(x)$ имеет не более одного решения на промежутке $\left(0; \frac{5}{3}\right]$, причем решение будет существовать тогда и только тогда, когда $f\left(\frac{5}{3}\right) \leq g\left(\frac{5}{3}\right)$, откуда получаем $a \cdot \frac{5}{3} - 2 \geq 0$, то есть $a \geq \frac{6}{5}$.

На промежутке $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$ уравнение $f(x) = g(x)$ принимает вид $ax - 2 = 3 - \frac{5}{x}$. Это уравнение сводится к уравнению $ax^2 - 5x + 5 = 0$. Будем считать, что $a > 0$, поскольку случай $a \leq 0$ был рассмотрен ранее. Дискриминант квадратного уравнения $D = 25 - 20a$, поэтому при $a > \frac{5}{4}$ это уравнение не имеет корней; при $a = \frac{5}{4}$ уравнение имеет единственный корень, равный 2; при $0 < a < \frac{5}{4}$ уравнение имеет два корня.

Если уравнение имеет два корня x_1 и x_2 , то есть $0 < a < \frac{5}{4}$, то больший корень $x_2 = \frac{5 + \sqrt{D}}{2a} > \frac{5}{2a} > 2 > \frac{5}{3}$, поэтому он принадлежит промежутку $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$. Меньший корень x_1 принадлежит промежутку $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$ тогда и только тогда, когда

$$a \left(x_1 - \frac{5}{3}\right) \left(x_2 - \frac{5}{3}\right) = a \left(\frac{5}{3}\right)^2 - 5 \cdot \frac{5}{3} + 5 = \frac{25a - 30}{9} > 0,$$

то есть $a > \frac{6}{5}$.

Таким образом, уравнение $\left| \frac{5}{x} - 3 \right| = ax - 2$ имеет следующее количество корней на промежутке $(0; +\infty)$:

- нет корней при $a \leq 0$;
- один корень при $0 < a < \frac{6}{5}$ и $a > \frac{5}{4}$;
- два корня при $a = \frac{6}{5}$ и $a = \frac{5}{4}$;
- три корня при $\frac{6}{5} < a < \frac{5}{4}$.

Ответ: $\frac{6}{5} < a < \frac{5}{4}$.

2. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$a|x-3| = \frac{5}{x+2}$$

на промежутке $[0; +\infty)$ имеет ровно два корня.

Решение.

Рассмотрим функции $f(x) = a|x-3|$ и $g(x) = \frac{5}{x+2}$. Исследуем уравнение $f(x) = g(x)$ на промежутке $[0; +\infty)$.

При $a \leq 0$ все значения функции $f(x)$ на промежутке $[0; +\infty)$ неположительны, а все значения функции $g(x)$ — положительны, поэтому при $a \leq 0$ уравнение $f(x) = g(x)$ не имеет решений на промежутке $[0; +\infty)$.

При $a > 0$ функция $f(x)$ возрастает на промежутке $(3; +\infty)$. Функция $g(x)$ убывает на этом промежутке, поэтому уравнение $f(x) = g(x)$ всегда имеет ровно одно решение на промежутке $(3; +\infty)$, поскольку $f(3) = 0 < 1 = g(3)$ и $f\left(3 + \frac{1}{a}\right) = 1 > \frac{5a}{5a+1} = g\left(3 + \frac{1}{a}\right)$.

На промежутке $[0; 3]$ уравнение $f(x) = g(x)$ принимает вид $3a - ax = \frac{5}{x+2}$. Это уравнение сводится к уравнению $ax^2 - ax + (5 - 6a) = 0$. Будем считать, что $a > 0$, поскольку случай $a \leq 0$ был рассмотрен ранее. Дискриминант квадратного уравнения $D = a^2 - 4a(5 - 6a) = 25a^2 - 20a$, поэтому при $0 < a < \frac{4}{5}$ это уравнение не имеет корней; при $a = \frac{4}{5}$ уравнение имеет единственный корень, равный $\frac{1}{2}$; при $a > \frac{4}{5}$ уравнение имеет два корня.

Пусть уравнение имеет два корня, то есть $a > \frac{4}{5}$. Тогда оба корня меньше 3, поскольку при $x \geq 3$ значения функции $3a - ax$ неположительны, а значения функции $\frac{5}{x+2}$ положительны. По теореме Виета сумма корней равна 1, а произведение равно $\frac{5}{a} - 6$. Значит, больший корень всегда принадлежит промежутку $[0; 3]$, а меньший принадлежит этому промежутку тогда и только тогда, когда $\frac{5}{a} - 6 \geq 0$, то есть $a \leq \frac{5}{6}$.

Таким образом, уравнение $a|x-3| = \frac{5}{x+2}$ имеет следующее количество корней на промежутке $[0; +\infty)$:

- нет корней при $a \leq 0$;
- один корень при $0 < a < \frac{4}{5}$;
- два корня при $a = \frac{4}{5}$ и $a > \frac{5}{6}$;
- три корня при $\frac{4}{5} < a \leq \frac{5}{6}$.

Ответ: $a = \frac{4}{5}$, $a > \frac{5}{6}$.

3. Найдите все значения a , при каждом из которых наименьшее значение функции

$$f(x) = 4x^2 - 4ax + a^2 + 2a + 2$$

на множестве $|x| \geq 1$ не меньше 6.

Решение.

Графиком функции $f(x) = (2x - a)^2 + 2a + 2$ является парабола, ветви которой направлены вверх, а вершина имеет координаты $\left(\frac{a}{2}; 2a + 2\right)$. Значит, минимум функции $f(x)$ на всей числовой оси достигается при $x = \frac{a}{2}$.

На множестве $|x| \geq 1$ эта функция достигает наименьшего значения либо в точке $x = \frac{a}{2}$, если эта точка принадлежит множеству, либо в одной из граничных точек $x = \pm 1$.

Если наименьшее значение функции не меньше 6, то и всякое значение функции не меньше 6. В частности,

$$\begin{aligned} f(1) &\geq 6; & a^2 - 2a + 6 &\geq 6; & a(a - 2) &\geq 0, \\ f(-1) &\geq 6; & a^2 + 6a + 6 &\geq 6; & a(a + 6) &\geq 0, \end{aligned}$$

откуда получаем систему неравенств

$$\begin{cases} a(a - 2) \geq 0, \\ a(a + 6) \geq 0, \end{cases}$$

решениями которой являются $a \leq -6$; $a = 0$; $a \geq 2$.

При $a \leq -6$ имеем: $\frac{a}{2} \leq -3$, значит, наименьшее значение функции достигается в точке $x = \frac{a}{2}$ и $f\left(\frac{a}{2}\right) = 2a + 2 \leq -10$, что не удовлетворяет условию задачи.

При $a = 0$ имеем: $\frac{a}{2} = 0$, значит, наименьшее значение функции достигается в одной из граничных точек $x = \pm 1$, в которых значение функции не меньше 6.

При $a \geq 2$ имеем: $\frac{a}{2} \geq 1$, значит, наименьшее значение функции достигается в точке $x = \frac{a}{2}$ и $f\left(\frac{a}{2}\right) = 2a + 2 \geq 6$, что удовлетворяет условию задачи.

Ответ: $a = 0, a \geq 2$.

4. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $|2x^2 - 3x - 2| = a - 2x^2 - 8x$ либо не имеет решений, либо имеет единственное решение.

Решение.

Рассмотрим функцию

$$f(x) = 2x^2 + 8x + |2x^2 - 3x - 2|.$$

При $2x^2 - 3x - 2 \geq 0$:

$$x \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty) \text{ и } f(x) = 4\left(x + \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{57}{16}.$$

При $2x^2 - 3x - 2 < 0$:

$$x \in \left(-\frac{1}{2}; 2\right) \text{ и } f(x) = 11x + 2.$$

Функция $y = 11x + 2$ возрастает на всей числовой оси. Функция $y = 4\left(x + \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{57}{16}$ убывает при $x < -\frac{5}{8}$ и возрастает при $x > -\frac{5}{8}$. Таким образом, функция $f(x)$ убывает при $x < -\frac{5}{8}$ и возрастает при $x > -\frac{5}{8}$. Наименьшее значение этой функции равно $-\frac{57}{16}$ и достигается при $x = -\frac{5}{8}$.

Значит, уравнение $f(x) = a$ не имеет решений при $a < -\frac{57}{16}$, имеет единственное решение при $a = -\frac{57}{16}$ и имеет два решения при $a > -\frac{57}{16}$.

Условие выполняется при $a \leq -\frac{57}{16}$.

Ответ: $a \leq -\frac{57}{16}$.

5. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$\sqrt{x^4 + (a - 5)^4} = |x + a - 5| + |x - a + 5|$$

имеет единственное решение.

Решение.

Заметим, что если число x_0 является решением уравнения, то и число $-x_0$ также является решением этого уравнения. Значит, если уравнение имеет единственное решение, то это решение $x = 0$.

При $x = 0$ уравнение принимает вид

$$\sqrt{(a - 5)^4} = 2|a - 5|; \quad (a - 5)^2 = 2|a - 5|; \quad |a - 5| \cdot (|a - 5| - 2) = 0,$$

откуда $a = 3$, $a = 5$, $a = 7$.

При $a = 3$ и $a = 7$ исходное уравнение принимает вид $\sqrt{x^4 + 16} = |x - 2| + |x + 2|$. При $x < -2$ правая часть уравнения равна $-2x < x^2 < \sqrt{x^4 + 16}$. При $-2 \leq x \leq 2$ правая часть уравнения равна 4, а левая часть уравнения не меньше 4, причем равенство достигается только при $x = 0$. При $x > 2$ правая часть уравнения равна $2x < x^2 < \sqrt{x^4 + 16}$. Значит, исходное уравнение имеет единственное решение $x = 0$.

При $a = 5$ исходное уравнение принимает вид $\sqrt{x^4} = 2|x|$. Числа -2 , 0 и 2 являются корнями этого уравнения.

Таким образом, исходное уравнение имеет единственное решение при $a = 3$ и $a = 7$.

Ответ: $a = 3$, $a = 7$.

6. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 + (2 - a)^2 = |x - 2 + a| + |x - a + 2|$$

имеет единственный корень.

Решение.

Если x_0 является корнем исходного уравнения, то и $-x_0$ является его корнем. Значит, исходное уравнение имеет единственный корень, только если $x_0 = -x_0$, то есть $x_0 = 0$. Подставим значение $x = 0$ в исходное уравнение:

$$(2 - a)^2 = 2|2 - a|; \quad |2 - a| \cdot (|2 - a| - 2) = 0,$$

откуда либо $|2 - a| = 0$; $a = 2$, либо $|2 - a| = 2$; $a = 0$ или $a = 4$.

При $a = 2$ исходное уравнение принимает вид: $x^2 = 2|x|$. Корнями этого уравнения являются числа -2 ; 0 и 2 , то есть исходное уравнение имеет более одного корня.

При $a = 0$ и при $a = 4$ уравнение принимает вид: $x^2 + 4 = |x - 2| + |x + 2|$.

При $x < -2$ это уравнение сводится к уравнению $x^2 + 2x + 4 = 0$, которое не имеет корней.

При $-2 \leq x \leq 2$ получаем уравнение $x^2 = 0$, которое имеет единственный корень.

При $x > 2$ получаем уравнение $x^2 = 0$, которое не имеет корней.

При $a = 0$ и при $a = 4$ исходное уравнение имеет единственный корень.

Ответ: $a = 0$, $a = 4$.

7. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$|(x - 1)^2 - 2^{1-a}| + |x - 1| + (1 - x)^2 + 2^{a-1} = 4 + 4^a$$

имеет единственное решение. Найдите это решение для каждого полученного значения a .

Решение.

Если x_0 является решением исходного уравнения, то $(2 - x_0)$ также является его решением. Значит, исходное уравнение имеет нечётное число корней, только если $x_0 = 2 - x_0$, то есть $x_0 = 1$. Подставим значение $x = 1$ в уравнение:

$$2^{1-a} + 2^{a-1} = 4 + 4^a; \quad \frac{2}{2^a} + \frac{2^a}{2} = 4 + 4^a; \quad \frac{1}{2^{a+1}} = 1,$$

откуда $a = -1$.

При $a = -1$ исходное уравнение примет вид

$$|(x-1)^2 - 4| + |x-1| = 4 - (1-x)^2.$$

Отсюда следует, что $4 - (1-x)^2 \geq 0$, а значит, $|(x-1)^2 - 4| = 4 - (1-x)^2$. Исходное уравнение принимает вид $|x-1| = 0$, и оно имеет единственное решение $x = 1$, удовлетворяющее условию $4 - (1-x)^2 \geq 0$. Следовательно, $a = -1$ удовлетворяет условию задачи.

Ответ: $a = -1, x = 1$.

8. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(\log_5(x+3) - \log_5(x-3))^2 - 7(\log_5(x+3) - \log_5(x-3)) - 4a^2 - 6a + 10 = 0$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Пусть $t = \log_5(x+3) - \log_5(x-3)$, тогда уравнение запишется в виде $t^2 - 7t - (4a^2 + 6a - 10) = 0$, откуда $t = 2a + 5$ или $t = 2 - 2a$. Значит, решения исходного уравнения — это решения уравнений $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2a + 5$ или $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2 - 2a$.

Исследуем, сколько решений имеет уравнение $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = b$ в зависимости от b . При $x > 3$ левая часть определена и принимает вид $\log_5\left(\frac{x+3}{x-3}\right) = \log_5\left(1 + \frac{6}{x-3}\right)$. При $x > 3$ выражение $1 + \frac{6}{x-3}$ принимает по одному разу все значения из промежутка $(1; +\infty)$. Таким образом, уравнение $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = b$ имеет одно решение при $b > 0$ и не имеет решений при $b \leq 0$.

Уравнения $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2a + 5$ и $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2 - 2a$ могут иметь общие решения при $2a + 5 = 2 - 2a$, то есть при $a = -\frac{3}{4}$. При $a = -\frac{3}{4}$ оба уравнения принимают вид $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = \frac{7}{2}$ и имеют одно решение.

При других значениях a исходное уравнение имеет два решения, если оба уравнения $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2a + 5$ и $\log_5(x+3) - \log_5(x-3) = 2 - 2a$ имеют по одному решению. Получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} 2a + 5 > 0, \\ 2 - 2a > 0, \end{cases}$$

то есть $-\frac{5}{2} < a < 1$.

Ответ: $-\frac{5}{2} < a < 1$.

9. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(\log_2(x+a) - \log_2(x-a))^2 - 3a(\log_2(x+a) - \log_2(x-a)) + 2a^2 - a - 1 = 0$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Пусть $t = \log_2(x+a) - \log_2(x-a)$, тогда уравнение запишется в виде

$$t^2 - 3at + 2a^2 - a - 1 = 0,$$

откуда $t = a - 1$ или $t = 2a + 1$. Значит, решения исходного уравнения — это объединение решений уравнений $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = a - 1$ и $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = 2a + 1$.

Исследуем, сколько решений имеет уравнение $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = b$ в зависимости от a и b . При $a \neq 0$ и $x > a$ и $x > -a$, то есть при $x > |a|$, левая часть определена и принимает вид $\log_2\left(\frac{x+a}{x-a}\right) = \log_2\left(1 + \frac{2a}{x-a}\right)$. При $x > |a|$ выражение $1 + \frac{2a}{x-a}$ принимает по одному разу все значения из промежутка $(1; +\infty)$ для $a > 0$ и принимает по одному разу все значения из промежутка $(0; 1)$ для $a < 0$. Значит, при $x > |a|$ выражение $\log_2\left(1 + \frac{2a}{x-a}\right)$ принимает по одному разу все значения из промежутка $(0; +\infty)$ при $a > 0$ и принимает по одному разу все значения из промежутка $(-\infty; 0)$ при $a < 0$. Таким образом, уравнение

$$\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = b$$

имеет одно решение при $ab > 0$ и не имеет решений при $a \neq 0$ и $ab \leq 0$. При $a = 0$ и $x > 0$ уравнение принимает вид $0 = b$ и либо имеет бесконечно много решений, либо не имеет решений.

Уравнения $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = a-1$ и $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = 2a+1$ могут иметь общие решения при $a-1 = 2a+1$, то есть при $a = -2$. При $a = -2$ оба уравнения принимают вид $\log_2(x-2) - \log_2(x+2) = -3$ и имеют одно решение.

При других значениях a исходное уравнение имеет два решения, если оба уравнения $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = a-1$ и $\log_2(x+a) - \log_2(x-a) = 2a+1$ имеют по одному решению. Получаем систему неравенств:

$$\begin{cases} (a-1)a > 0, \\ (2a+1)a > 0, \end{cases}$$

то есть $a < -\frac{1}{2}$; $a > 1$.

Ответ: $a < -\frac{1}{2}$, $a > 1$.

10. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(|x+1| + |x-a|)^2 - 2(|x+1| + |x-a|) + 4a(1-a) = 0$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Пусть $t = |x+1| + |x-a|$, тогда уравнение запишется в виде $t^2 - 2t + 4a(1-a) = 0$, откуда $t = 2a$ или $t = 2 - 2a$. Значит, решения исходного уравнения — это решения уравнений $|x+1| + |x-a| = 2a$ или $|x+1| + |x-a| = 2 - 2a$.

Исследуем, сколько решений имеет уравнение $|x+1| + |x-a| = b$ в зависимости от a и b . Рассмотрим функцию $f(x) = |x+1| + |x-a|$. При $a \neq -1$ графиком этой функции является ломаная, состоящая из трёх звеньев, угловые коэффициенты которых равны -2 , 0 и 2 . Минимальное значение достигается на отрезке с концами -1 и a и равно $|a+1|$. Таким образом, уравнение $|x+1| + |x-a| = b$ имеет два решения при $b > |a+1|$, бесконечно много решений при $b = |a+1|$ и не имеет решений при $b < |a+1|$. В случае $a = -1$ уравнение $2|x+1| = b$ имеет два решения при $b > 0$, одно решение при $b = 0$ и не имеет решений при $b < 0$.

Уравнения $|x+1| + |x-a| = 2a$ и $|x+1| + |x-a| = 2 - 2a$ могут иметь общие решения при $2a = 2 - 2a$, то есть при $a = \frac{1}{2}$. При $a = \frac{1}{2}$ оба уравнения принимают вид $|x+1| + \left|x - \frac{1}{2}\right| = 1$ и не имеют решений.

При других значениях a исходное уравнение имеет ровно два решения, если одно из уравнений $|x+1| + |x-a| = 2a$ и $|x+1| + |x-a| = 2 - 2a$ не имеет решений, а другое имеет два решения. Эти условия равносильны неравенству $(2a - |a+1|)(2 - 2a - |a+1|) < 0$. При $a \leq -1$ неравенство принимает вид $(3a+1)(3-a) < 0$, которое выполняется при любом

$a \leq -1$. При $a > -1$ неравенство принимает вид $(a - 1)(1 - 3a) < 0$, откуда с учётом условия $a > -1$ получаем: $-1 < a < \frac{1}{3}$; $a > 1$.

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два решения при $a < \frac{1}{3}$; $a > 1$.

Ответ: $a < \frac{1}{3}$, $a > 1$.

11. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$((a - 1)x^2 + 3x)^2 - 2((a - 1)x^2 + 3x) + 1 - a^2 = 0$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Пусть $t = (a - 1)x^2 + 3x$, тогда уравнение запишется в виде $t^2 - 2t + 1 - a^2 = 0$, откуда $t = a + 1$ или $t = 1 - a$. Значит, решения исходного уравнения – это решения уравнений $(a - 1)x^2 + 3x = a + 1$ или $(a - 1)x^2 + 3x = 1 - a$.

Исследуем, сколько решений имеет уравнение $(a - 1)x^2 + 3x = b$ в зависимости от a и b . При $a \neq 1$ уравнение принимает вид $(a - 1)x^2 + 3x - b = 0$. Это квадратное уравнение, дискриминант которого равен $9 + 4(a - 1)b$. Таким образом, уравнение $(a - 1)x^2 + 3x = b$ имеет два решения при $(a - 1)b > -\frac{9}{4}$, одно решение при $(a - 1)b = -\frac{9}{4}$ и не имеет решений при $(a - 1)b < -\frac{9}{4}$. При $a = 1$ уравнение принимает вид $3x = b$ и имеет одно решение.

Уравнения $(a - 1)x^2 + 3x = a + 1$ и $(a - 1)x^2 + 3x = 1 - a$ могут иметь общие решения при $a + 1 = 1 - a$, то есть при $a = 0$. При $a = 0$ оба уравнения принимают вид $-x^2 + 3x = 1$ и имеют два решения.

При других значениях a исходное уравнение имеет ровно два решения, если либо оба уравнения $(a - 1)x^2 + 3x = a + 1$ и $(a - 1)x^2 + 3x = 1 - a$ имеют по одному решению, либо одно из них не имеет решений, а другое имеет два решения. При $a = 1$ каждое из этих уравнений имеет единственное решение и эти решения различны. При других значениях a выполнено неравенство $a^2 - 1 > -\frac{9}{4}$, поэтому уравнение $(a - 1)x^2 + 3x = a + 1$ имеет два решения. Уравнение

$(a - 1)x^2 + 3x = 1 - a$ не имеет решений при $(a - 1)^2 > \frac{9}{4}$, то есть при $a < -\frac{1}{2}$ и при $a > \frac{5}{2}$.

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два решения при $a < -\frac{1}{2}$; $a = 0$; $a = 1$; $a > \frac{5}{2}$.

Ответ: $a < -\frac{1}{2}$, $a = 0$, $a = 1$, $a > \frac{5}{2}$.

12. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$ax + \sqrt{-7 - 8x - x^2} = 2a + 3$$

имеет единственный корень.

Решение.


Запишем уравнение в виде

$$\sqrt{-7 - 8x - x^2} = -ax + 2a + 3.$$

Рассмотрим две функции:

$$f(x) = \sqrt{-7 - 8x - x^2} \text{ и } g(x) = -ax + 2a + 3.$$

Графиком функции $f(x) = \sqrt{3^2 - (x + 4)^2}$ является полуокружность радиуса 3 с центром в точке $(-4; 0)$, лежащая в верхней полуплоскости (см. рисунок). При каждом



значении a графиком функции $g(x)$ является прямая с угловым коэффициентом $-a$, проходящая через точку $M(2; 3)$.

Уравнение имеет единственный корень, если графики функций $f(x)$ и $g(x)$ имеют единственную общую точку: либо прямая касается полуокружности, либо пересекает её в единственной точке.

Касательная MC , проведённая из точки M к полуокружности, имеет угловой коэффициент, равный нулю, то есть при $a = 0$ исходное уравнение имеет единственный корень. При $-a < 0$ прямая не имеет общих точек с полуокружностью.

Прямая MA , заданная уравнением $y = -ax + 2a + 3$, проходит через точки $M(2; 3)$ и $A(-7; 0)$, следовательно, её угловой коэффициент $-a = \frac{1}{3}$. При $0 < -a < \frac{1}{3}$ прямая, заданная уравнением $y = -ax + 2a + 3$, имеет две общие точки с полуокружностью. Прямая MB , заданная уравнением $y = -ax + 2a + 3$, проходит через точки $M(2; 3)$ и $B(-1; 0)$, следовательно, её угловой коэффициент $-a = 1$. При $\frac{1}{3} < -a \leq 1$ прямая, заданная уравнением $y = -ax + 2a + 3$, имеет угловой коэффициент больше, чем у прямой MA , и не больше, чем у прямой MB , и пересекает полуокружность в единственной точке. Получаем, что при $-1 \leq a < -\frac{1}{3}$ исходное уравнение имеет единственный корень. При $-a > 1$ прямая не имеет общих точек с полуокружностью.

Ответ: $-1 \leq a < -\frac{1}{3}$, $a = 0$.

13. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{\sin 2x - 2a}{\cos 4x + 2}$$

содержит число 1.

Решение.

Пусть $z = \sin 2x$, тогда $-1 \leq z \leq 1$ и требуется найти все значения параметра a , при каждом из которых множество значений функции $y = \frac{z - 2a}{3 - 2z^2}$, $-1 \leq z \leq 1$, содержит число 1.

Число 1 принадлежит множеству значений функции $y = \frac{z - 2a}{3 - 2z^2}$, $-1 \leq z \leq 1$, если и только если уравнение $1 = \frac{z - 2a}{3 - 2z^2}$ имеет хотя бы одно решение на отрезке $-1 \leq z \leq 1$. Заметим, что при $-1 \leq z \leq 1$ знаменатель не обращается в ноль. Поэтому уравнение $1 = \frac{z - 2a}{3 - 2z^2}$ приводится к виду

$$3 - 2z^2 = z - 2a; \quad 2z^2 + z - 2a - 3 = 0.$$

Рассмотрим квадратичную функцию $f(z) = 2z^2 + z - (2a + 3)$. Уравнение $f(z) = 0$ имеет хотя бы одно решение на промежутке $[-1; 1]$ тогда и только тогда, когда дискриминант уравнения $f(z) = 0$ и значение функции $f(z)$ на конце отрезка $[-1; 1]$ неотрицательны.

$$\begin{cases} f(1) \geq 0 \\ f(-1) \geq 0, \\ 1 + 8(2a + 3) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} [-2a - 2 \geq 0 \\ -2a \geq 0, \\ 16a + 25 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a \leq 0, \\ a \geq -\frac{25}{16}, \end{cases}$$

то есть $-\frac{25}{16} \leq a \leq 0$.

Ответ: $-\frac{25}{16} \leq a \leq 0$.

14. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{a + 3x - ax}{x^2 + 2ax + a^2 + 1}$$

содержит отрезок $[0; 1]$.

Решение.

Запишем уравнение, задающее функцию, в виде $y = \frac{a + (3-a)x}{(x+a)^2 + 1}$. Область определения функции есть всё множество действительных чисел, и на нём эта функция непрерывна. Следовательно, если при некоторых значениях a существуют такие числа x_0 и x_1 , что выполняются равенства $0 = \frac{a + (3-a)x_0}{(x_0+a)^2 + 1}$ и $1 = \frac{a + (3-a)x_1}{(x_1+a)^2 + 1}$, то весь отрезок $[0; 1]$ будет принадлежать множеству значений данной функции. С другой стороны, понятно, что существование таких x_0 и x_1 необходимо.

Рассмотрим уравнение $0 = \frac{a + (3-a)x}{(x+a)^2 + 1}$; $(a-3)x = a$.

Оно имеет решение при любом $a \neq 3$.

Рассмотрим уравнение $1 = \frac{a + (3-a)x}{(x+a)^2 + 1}$; $x^2 + 3(a-1)x + a^2 - a + 1 = 0$.

Это уравнение имеет решение тогда и только тогда, когда его дискриминант неотрицателен:

$$9(a-1)^2 - 4(a^2 - a + 1) \geq 0; \quad 5a^2 - 14a + 5 \geq 0;$$

$$\left(a - \frac{7-2\sqrt{6}}{5}\right) \left(a - \frac{7+2\sqrt{6}}{5}\right) \geq 0,$$

откуда $a \leq \frac{7-2\sqrt{6}}{5}$ или $a \geq \frac{7+2\sqrt{6}}{5}$.

Таким образом, поскольку $\frac{7+2\sqrt{6}}{5} < 3$, условию задачи удовлетворяют значения $a \in \left(-\infty; \frac{7-2\sqrt{6}}{5}\right] \cup \left[\frac{7+2\sqrt{6}}{5}; 3\right) \cup (3; +\infty)$.

Ответ: $a \leq \frac{7-2\sqrt{6}}{5}$, $\frac{7+2\sqrt{6}}{5} \leq a < 3$, $a > 3$.

15. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{\sqrt{a} - 2\sin x + 1}{\cos^2 x + a + 2\sqrt{a} + 1}$$

содержит отрезок $[1; 2]$.

Решение.

Пусть $z = \sin x$, а $f(z) = \frac{\sqrt{a} - 2z + 1}{1 - z^2 + (\sqrt{a} + 1)^2}$.

Поскольку $|z| \leq 1$ и $1 + (1 + \sqrt{a})^2 \geq 2$, то для любого $a \geq 0$ функция $f(z)$ определена на всём отрезке $[-1; 1]$ и непрерывна на нём. Следовательно, если при некоторых значениях $a \geq 0$ на отрезке $[-1; 1]$ существуют такие числа z_1 и z_2 , что выполняются равенства $f(z_1) = 1$ и $f(z_2) = 2$, то весь отрезок $[1; 2]$ будет принадлежать множеству значений данной функции. С другой стороны, понятно, что существование таких z_1 и z_2 необходимо.

Рассмотрим уравнение $\frac{\sqrt{a} - 2z + 1}{1 - z^2 + (\sqrt{a} + 1)^2} = 1$. С учётом того, что $|z| \leq 1$, оно эквивалентно уравнению $z^2 - 2z - (a + \sqrt{a} + 1) = 0$. Дискриминант этого уравнения

$$D = 4 + 4(a + \sqrt{a} + 1) \geq 0$$

при всех значениях $a \geq 0$. Значит, оно имеет хотя бы одно решение на отрезке $[-1; 1]$ тогда и только тогда, когда значение функции $\varphi(z) = z^2 - 2z - (a + \sqrt{a} + 1)$ хотя бы на одном из концов отрезка $[-1; 1]$ неотрицательно:

$$\begin{cases} 3 - (a + \sqrt{a} + 1) \geq 0 \\ -1 - (a + \sqrt{a} + 1) \geq 0; \end{cases} \begin{cases} a + \sqrt{a} - 2 \geq 0 \\ a + \sqrt{a} + 2 \leq 0; \end{cases} \begin{cases} (\sqrt{a} + 2)(\sqrt{a} - 1) \leq 0 \\ a + \sqrt{a} + 2 \leq 0; \end{cases} \quad -2 \leq \sqrt{a} \leq 1,$$

откуда $0 \leq a \leq 1$.

Рассмотрим уравнение $\frac{\sqrt{a} - 2z + 1}{1 - z^2 + (\sqrt{a} + 1)^2} = 2$. С учётом того, что $|z| \leq 1$, оно эквивалентно уравнению $2z^2 - 2z - (2a + 3\sqrt{a} + 3) = 0$. Дискриминант этого уравнения

$$D = 4 + 8(2a + 3\sqrt{a} + 3) \geq 0$$

при всех значениях $a \geq 0$. Значит, оно имеет хотя бы одно решение $[-1; 1]$ на отрезке тогда и только тогда, когда значение функции $\varphi(z) = 2z^2 - 2z - (2a + 3\sqrt{a} + 3)$ хотя бы на одном из концов отрезка $[-1; 1]$ неотрицательно:

$$\begin{cases} 4 - (2a + 3\sqrt{a} + 3) \geq 0 \\ -(2a + 3\sqrt{a} + 3) \geq 0; \end{cases} \begin{cases} 2a + 3\sqrt{a} - 1 \leq 0 \\ 2a + 3\sqrt{a} + 3 \leq 0; \end{cases} \\ \left(\sqrt{a} + \frac{3 + \sqrt{17}}{4}\right) \left(\sqrt{a} - \frac{\sqrt{17} - 3}{4}\right) \leq 0; \quad -\frac{\sqrt{17} + 3}{4} \leq \sqrt{a} \leq \frac{\sqrt{17} - 3}{4},$$

откуда $0 \leq a \leq \frac{13 - 3\sqrt{17}}{8}$.

Поскольку $\frac{13 - 3\sqrt{17}}{8} < 1$, получим все значения параметра a , при каждом из которых множество значений функции $y = \frac{\sqrt{a} - 2\sin x + 1}{\cos^2 x + a + 2\sqrt{a} + 1}$ содержит отрезок $[1; 2]$: $0 \leq a \leq \frac{13 - 3\sqrt{17}}{8}$.

Ответ: $0 \leq a \leq \frac{13 - 3\sqrt{17}}{8}$.

16. Найдите все значения a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{a - (a^2 - 2a - 3)\sin x + 4}{\cos^2 x + a^2 + 1} < 1$$

содержит отрезок $\left[0; \frac{5\pi}{6}\right]$.

Решение.

Условие задачи выполнено тогда и только тогда, когда для любого $x \in \left[0; \frac{5\pi}{6}\right]$ данное неравенство верно.

Пусть $z = \sin x$, тогда $0 \leq z \leq 1$ исходное неравенство принимает вид

$$\frac{a - (a^2 - 2a - 3)z + 4}{a^2 + 2 - z^2} < 1; \quad \frac{z^2 - (a^2 - 2a - 3)z + 2 + a - a^2}{a^2 + 2 - z^2} < 0.$$

При $0 \leq z \leq 1$ имеем: $a^2 + 2 - z^2 > 0$, поэтому исходное неравенство эквивалентно неравенству $z^2 - (a^2 - 2a - 3)z + 2 + a - a^2 < 0$. Таким образом, необходимо найти все значения параметра a , при каждом из которых неравенство $z^2 - (a^2 - 2a - 3)z + 2 + a - a^2 < 0$ справедливо для всех z , принадлежащих отрезку $[0; 1]$.

Рассмотрим функцию $\varphi(z) = z^2 - (a^2 - 2a - 3)z + 2 + a - a^2$. Её графиком является парабола, ветви которой направлены вверх. Для того, чтобы при всех z , принадлежащих отрезку $[0; 1]$, выполнялось неравенство $\varphi(z) < 0$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась система неравенств

$$\begin{cases} \varphi(0) < 0, & \begin{cases} 2 + a - a^2 < 0, \\ \varphi(1) < 0; & \begin{cases} 1 - (a^2 - 2a - 3) + 2 + a - a^2 < 0; \\ (a + 1)(a - 2) > 0, \\ \left(a - \frac{3 - \sqrt{57}}{4}\right)\left(a - \frac{3 + \sqrt{57}}{4}\right) > 0, \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

откуда $a < \frac{3 - \sqrt{57}}{4}$ или $a > \frac{3 + \sqrt{57}}{4}$.

Ответ: $a < \frac{3 - \sqrt{57}}{4}$, $a > \frac{3 + \sqrt{57}}{4}$.

17. Найдите все неотрицательные значения a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{a + x^2 - 4\log_{0,5}(a^2 - 2a + 4)}{3\sqrt{7x^4 + x^2} + a + 4 + \log_{0,5}^2(a^2 - 2a + 4)} \geq 1$$

состоит из одной точки, и найдите это решение.

Решение.

Если неравенство выполняется в точке x_0 , то оно выполнено и в точке $-x_0$. Следовательно, чтобы неравенство выполнялось только в одной точке, необходимо, чтобы оно выполнялось только при $x = 0$.

Таким образом, должно быть выполнено неравенство

$$\frac{a - 4\log_{0,5}(a^2 - 2a + 4)}{a + 4 + \log_{0,5}^2(a^2 - 2a + 4)} \geq 1.$$

Поскольку $a \geq 0$, знаменатель дроби положителен, а значит, неравенство эквивалентно следующему неравенству:

$$a + 4 + \log_{0,5}^2(a^2 - 2a + 4) \leq a - 4\log_{0,5}(a^2 - 2a + 4), \quad (\log_{0,5}(a^2 - 2a + 4) + 2)^2 \leq 0, \\ \log_{0,5}(a^2 - 2a + 4) + 2 = 0, \quad a^2 - 2a + 4 = 4,$$

откуда $a = 0$ или $a = 2$.

При $a = 0$ или $a = 2$ имеем: $\log_{0,5}(a^2 - 2a + 4) = -2$.

При $a = 0$ неравенство принимает вид

$$1 \leq \frac{x^2 + 8}{3\sqrt{7x^4 + x^2} + 8}; \quad 3\sqrt{7x^4 + x^2} \leq x^2; \quad 63x^4 + 9x^2 \leq x^4; \quad (62x^2 + 9)x^2 \leq 0,$$

откуда $x = 0$.

При $a = 2$ неравенство принимает вид

$$1 \leq \frac{x^2 + 10}{3\sqrt{7x^4 + x^2} + 10}; \quad 3\sqrt{7x^4 + x^2} \leq x^2; \quad 63x^4 + 9x^2 \leq x^4; \quad (62x^2 + 9)x^2 \leq 0,$$

откуда $x = 0$.

Таким образом, условию задачи удовлетворяют $a = 0$ и $a = 2$.

Ответ: $a = 0$, $x = 0$ или $a = 2$, $x = 0$.

18. Найдите все значения a , для каждого из которых уравнение

$$|3\sin^2 2x - a| + |3\cos 4x - 2a - 3| = a + 6$$

имеет хотя бы одно решение.

Решение.

Пусть $y = 3\sin^2 2x$, тогда $0 \leq y \leq 3$ и уравнение принимает вид

$$|y - a| + 2|y + a| = a + 6.$$

Таким образом, необходимо найти все значения параметра a , при которых последнее уравнение имеет хотя бы одно решение на отрезке $[0; 3]$.

При $a = 0$ уравнение принимает вид $3|y| = 6$ и имеет решение $y = 2$ на отрезке $[0; 3]$.

Рассмотрим функцию $f(y) = |y - a| + 2|y + a| - a - 6$.

Если $a < 0$, то при $y \leq -a$ эта функция убывает, а при $y \geq -a$ она возрастает. Значит, функция достигает наименьшего значения в точке $-a$. Если $0 \leq -a \leq 3$, т. е. $-3 \leq a \leq 0$, то для того, чтобы уравнение имело хотя бы одно решение на отрезке $[0; 3]$, необходимо, чтобы $f(-a) \leq a$ и достаточно, чтобы хотя бы на одном из концов отрезка $[0; 3]$ функция $f(x)$ принимала неотрицательное значение:

$$\begin{cases} -3 \leq a < 0, \\ f(-a) \leq 0, \\ \begin{cases} f(0) \geq 0 \\ f(3) \geq 0; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} -3 \leq a < 0, \\ -3a - 6 \leq 0, \\ \begin{cases} 3|a| - a - 6 \geq 0 \\ |3 - a| + 2|3 + a| \geq a + 6; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3 \leq a < 0, \\ a \geq -2, \\ \begin{cases} a \leq -\frac{3}{2} \\ (3 - a) + 2(3 + a) \geq a + 6; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} -3 \leq a < 0, \\ a \geq -2, \\ \begin{cases} a \leq -\frac{3}{2} \\ 3 \geq 0, \end{cases} \end{cases}$$

откуда $-2 \leq a < 0$.

Если $-a \geq 3$, т. е. $a \leq -3$, то функция $f(x)$ убывает на всем отрезке $[0; 3]$, а значит, чтобы уравнение имело на нём решение, необходимо и достаточно, чтобы $f(0) \geq 0$ и $f(3) \leq 0$:

$$\begin{cases} a \leq -3, \\ f(0) \geq 0 \\ f(3) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a \leq -3, \\ 3|a| \geq a + 6, \\ |3 - a| + 2|3 + a| \leq a + 6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq -3, \\ a \leq -1,5, \\ 3 - a - 6 - 2a \leq a + 6, \end{cases} \quad \begin{cases} a \leq -3, \\ a \leq -1,5, \\ a \geq -\frac{9}{2}, \end{cases} \text{ нет решений.}$$

Если $a > 0$, то при $y \geq -a$ функция $f(y)$ возрастает. Значит, эта функция возрастает на всём промежутке $[0; 3]$. Следовательно, чтобы уравнение $f(y) = 0$ имело хотя бы одно решение на отрезке $[0; 3]$, необходимо, чтобы $f(0) \leq 0$ и $f(3) \geq 0$:

$$\begin{cases} a > 0, \\ f(0) \leq 0, \\ f(3) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a > 0, \\ 3|a| - a - 6 \leq 0, \\ |3 - a| + 2|3 + a| \geq a + 6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a > 0, \\ a \leq 3, \\ |3 - a| + 2(3 + a) \geq a + 6; \end{cases} \quad \begin{cases} a > 0, \\ a \leq 3, \\ |3 - a| \geq -a, \end{cases}$$

откуда $0 < a \leq 3$.

Таким образом, уравнение $|3\sin^2 2x - a| + |3\cos 4x - 2a - 3| = a + 6$ имеет хотя бы одно решение при $-2 \leq a \leq 3$.

Ответ: $-2 \leq a \leq 3$.

19. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 = 5xy, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Преобразуем систему уравнений:

$$\begin{cases} (x - 2y)(y - 2x) = 0, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} x = 2y, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4 \end{cases} \\ \begin{cases} y = 2x, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4. \end{cases} \end{cases}$$

Заметим, что вторая система в совокупности получается из первой заменой x на y , а y на x . Значит, если первая система имеет решение $(a; b)$, то решением второй будет $(b; a)$. Следовательно, исходная система уравнений имеет ровно два решения тогда и только тогда, когда система

$$\begin{cases} x = 2y, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4 \end{cases}$$

имеет ровно одно нетривиальное решение.

$$\begin{cases} x = 2y, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y, \\ (2y - a)^2 + (y - a)^2 = 5a^4; \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = 2y, \\ 5y^2 - 6ay = 5a^4 - 2a^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y, \\ \left(y - \frac{3a}{5}\right)^2 = \frac{a^2(5a - 1)(5a + 1)}{25}. \end{cases}$$

Последняя система имеет ровно одно решение тогда и только тогда, когда $\frac{a^2(5a - 1)(5a + 1)}{25} = 0$, то есть при $a = 0$, $a = \frac{1}{5}$ и $a = -\frac{1}{5}$.

При $a = 0$ получаем, что последняя система имеет тривиальное решение.

При $a = \frac{1}{5}$ получаем, что последняя система имеет решение $\left(\frac{6}{25}; \frac{3}{25}\right)$, а значит, исходная система имеет ровно два решения.

При $a = -\frac{1}{5}$ получаем, что последняя система имеет решение $\left(-\frac{6}{25}; -\frac{3}{25}\right)$, а значит, исходная система имеет ровно два решения.

Таким образом, исходная система имеет ровно два решения только при $a = \frac{1}{5}$ или $a = -\frac{1}{5}$.

Ответ: $a = \frac{1}{5}$; $a = -\frac{1}{5}$.

20. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 3x - y - 6)\sqrt{x+2}}{\sqrt{6-x}} = 0, \\ x + y - a = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Запишем первое уравнение в виде

$$\frac{(y-3)(y+2-x)\sqrt{x+2}}{\sqrt{6-x}} = 0.$$


При $x < -2$ и $x \geq 6$ левая часть не имеет смысла. При $-2 \leq x < 6$ уравнение задает прямые $y = 3$, $y = x - 2$, $x = -2$ (см. рисунок).

При каждом значении a уравнение $x + y - a = 0$ задает прямую, параллельную прямой $x + y = 0$ или совпадающую с ней. При $-2 \leq x < 6$ такая прямая пересекает прямую $y = 3$ при $1 \leq a < 9$, пересекает прямую $y = x - 2$ при $-6 \leq x < 10$, пересекает прямую $x = -2$ при любом значении a . При этом прямые $x + y - a = 0$ проходят через точки пересечения прямых $x = -2$, $y = 3$ и $y = x - 2$ при $a = -6$, $a = 1$ и $a = 8$.

Число решений исходной системы равно числу точек пересечения прямых $y = 3$, $y = x - 2$, $x = -2$ с прямой $x + y - a = 0$ при условии $-2 \leq x < 6$.

Таким образом, исходная система имеет ровно два решения при $-6 < a \leq 1$; $a = 8$; $9 \leq a < 10$.

Ответ: $-6 < a \leq 1$; $a = 8$; $9 \leq a < 10$.



21. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 2x - 2y - 2 = |x^2 + y^2 - 1|, \\ y = a(x - 1) \end{cases}$$

имеет более двух решений.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.

Рассмотрим два случая:

1) Если $x^2 + y^2 \geq 1$, то получаем уравнение

$$2x - 2y - 2 = x^2 + y^2 - 1;$$

$$x^2 - 2x + y^2 + 2y + 1 = 0;$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 1.$$

Полученное уравнение задает окружность с центром в точке $O_1(1; -1)$ и радиусом 1.


2) Если $x^2 + y^2 \leq 1$, то получаем уравнение

$$2x - 2y - 2 = 1 - x^2 - y^2; \quad x^2 + 2x + y^2 - 2y - 3 = 0;$$

$$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 5.$$

Полученное уравнение задает окружность с центром в точке $O_2(-1; 1)$ и радиусом $\sqrt{5}$.

Полученные окружности пересекаются в двух точках $A(1; 0)$ и $B(0; -1)$, лежащих на окружности $x^2 + y^2 = 1$, поэтому в первом случае получаем дугу ω_1 с концами в точках A и B , во втором — дугу ω_2 с концами в тех же точках (см. рисунок).



Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задает прямую m , которая проходит через точку A и угловой коэффициент которой равен a .

При $a = 1$ прямая m проходит через точки A и B , то есть исходная система имеет два решения.

При $a = 2$ прямая m перпендикулярна прямой O_2A , угловой коэффициент которой равен $-\frac{1}{2}$, значит, прямая m касается дуги ω_2 в точке A и пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых — точка A), то есть исходная система имеет два решения.

При $1 < a < 2$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в точке A и еще в одной точке, отличной от точки B , то есть исходная система имеет три решения.

При $0 \leq a < 1$ прямая m не пересекает дуги ω_1 и ω_2 в точках, отличных от точки A , то есть исходная система имеет одно решение.

При $a < 0$ или $a > 2$ прямая m пересекает дугу ω_1 в двух точках и не пересекает дугу ω_2 в точках, отличных от точки A , то есть исходная система имеет два решения.

Значит, исходная система имеет более двух решений при $1 < a < 2$.

Ответ: $1 < a < 2$.

22. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 - 8x + y^2 + 4y + 15 = 4|2x - y - 10|, \\ x + 2y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.

Рассмотрим два случая:

1) Если $2x - y - 10 \geq 0$, то получаем уравнение

$$\begin{aligned} x^2 - 8x + y^2 + 4y + 15 &= 8x - 4y - 40; \\ x^2 - 16x + y^2 + 8y + 55 &= 0; \\ (x - 8)^2 + (y + 4)^2 &= 25. \end{aligned}$$

Полученное уравнение задает окружность с центром в точке $O_1(8; -4)$ и радиусом 5.

2) Если $2x - y - 10 \leq 0$, то получаем уравнение

$$\begin{aligned} x^2 - 8x + y^2 + 4y + 15 &= 4y - 8x + 40; \\ x^2 + y^2 &= 25. \end{aligned}$$

Полученное уравнение задает окружность с центром в точке $O_2(0; 0)$ и радиусом 5.

Полученные окружности пересекаются в двух точках $A(5; 0)$ и $B(3; -4)$, лежащих на прямой $2x - y - 10 = 0$, поэтому в первом случае получаем дугу ω_1 с концами в точках A и B , во втором — дугу ω_2 с концами в тех же точках (см. рисунок).


Заметим, что точка $C(\sqrt{5}; 2\sqrt{5})$ лежит на дуге ω_2 и прямая O_2C перпендикулярна прямой O_1O_2 .

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задает прямую m , параллельную прямой O_1O_2 или совпадающую с ней.

При $a = 5$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в точке A и еще в одной точке, отличной от точки A , то есть исходная система имеет три решения.

Аналогично, при $a = -5$ прямая m проходит через точку B и исходная система имеет три решения.

При $a = 5\sqrt{5}$ прямая m проходит через точку C , значит, прямая m касается дуг ω_1 и ω_2 , то есть исходная система имеет два решения.



Аналогично, при $a = -5\sqrt{5}$ прямая m касается дуг ω_2 и ω_1 , то есть исходная система имеет два решения.

При $-5\sqrt{5} < a < -5$ или $5 < a < 5\sqrt{5}$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в двух точках, отличных от точек A и B , то есть исходная система имеет четыре решения.

При $-5 < a < 5$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_2 и ω_1 в точке, отличной от точек A и B , то есть исходная система имеет два решения.

При $a < -5\sqrt{5}$ или $a > 5\sqrt{5}$ прямая m не пересекает дуги ω_2 и ω_1 , то есть исходная система не имеет решений.

Значит, исходная система имеет более двух решений при $-5\sqrt{5} < a \leq -5$ или $5 \leq a < 5\sqrt{5}$.

Ответ: $-5\sqrt{5} < a \leq -5$; $5 \leq a < 5\sqrt{5}$.

23. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + |x^2 - 2x| = y^2 + |y^2 - 2y|, \\ x + y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.

Рассмотрим четыре случая:

1) Если $x^2 - 2x \leq 0$ и $y^2 - 2y \leq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 - x^2 + 2x = y^2 - y^2 + 2y; \quad x = y.$$

Полученное уравнение задает прямую $y = x$.

2) Если $x^2 - 2x \leq 0$ и $y^2 - 2y \geq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 - x^2 + 2x = y^2 + y^2 - 2y; \quad x = y^2 - y.$$

Полученное уравнение задает параболу $y = x^2 - x$.

3) Если $x^2 - 2x \geq 0$ и $y^2 - 2y \leq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 + x^2 - 2x = y^2 - y^2 + 2y; \quad y = x^2 - x.$$

Полученное уравнение задает параболу $y = x^2 - x$.

4) Если $x^2 - 2x \geq 0$ и $y^2 - 2y \geq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 + x^2 - 2x = y^2 + y^2 - 2y; \quad x^2 - y^2 - x + y = 0; \\ (x - y)(x + y - 1) = 0.$$


Полученное уравнение задает пару прямых $y = x$ и $x + y = 1$.

Точки $A(-1; 2)$, $B(2; -1)$ и $C(0; 0)$ являются точками пересечения полученных парабол с полученными прямыми и лежат на прямых $y = 2$, $x = 2$ или $x = 0$ и $y = 0$ соответственно, поэтому искомое множество состоит из прямой l , задаваемой уравнением $y = x$, лучей l_1 и l_2 прямой $x + y = 1$ с концами в точках A и B соответственно, дуги ω_1 параболы $y = x^2 - x$ с концами в точках A и C и дуги ω_2 параболы $x = y^2 - y$ с концами в точках B и C (см. рисунок).

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задает прямую m , параллельную прямой AB или совпадающую с ней.

Заметим, что при $a = 0$ прямая m касается парабол $y = x^2 - x$ и $x = y^2 - y$ в точке C .

При $a = 1$ прямая m содержит лучи l_1 и l_2 , то есть исходная система имеет бесконечное число решений.



При $a = 0$ прямая m касается дуг ω_1 и ω_2 в точке C , пересекает прямую l в точке C и не имеет общих точек с лучами l_1 и l_2 , то есть исходная система имеет одно решение.

При $0 < a < 1$ прямая m не имеет общих точек с лучами l_1 и l_2 , пересекает прямую l в точке, отличной от точки C , пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в одной точке, отличной от точки C , то есть исходная система имеет три решения.

При $a < 0$ или $a > 1$ прямая m пересекает прямую l в одной точке и не имеет общих точек с дугами ω_1 и ω_2 и лучами l_1 и l_2 , то есть исходная система имеет одно решение.

Значит, исходная система имеет более двух решений при $0 < a \leq 1$.

Ответ: $0 < a \leq 1$.

24. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 - x - 2 = |x^2 - x - 2|, \\ x - y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.

Рассмотрим два случая:

1) Если $x^2 - x - 2 \leq 0$, то получаем уравнение

$$y^2 - x - 2 = x + 2 - x^2; \quad y^2 + x^2 - 2x - 4 = 0; \\ (x - 1)^2 + y^2 = 5.$$

Полученное уравнение задает окружность с центром в точке $(1; 0)$ и радиусом $\sqrt{5}$.

2) Если $x^2 - x - 2 \geq 0$, то получаем уравнение

$$y^2 - x - 2 = x^2 - x - 2; \quad y^2 - x^2 = 0; \\ (y - x)(y + x) = 0.$$

Полученное уравнение задает пару прямых $y = x$ и $y = -x$.

Полученная окружность пересекает полученные прямые в точках $A(-1; 1)$, $B(2; 2)$, $C(2; -2)$ и $D(-1; -1)$, поэтому в первом случае получаем две дуги ω_1 и ω_2 окружности $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ с концами в точках A и B , C и D соответственно, во втором — четыре луча l_A , l_B , l_C и l_D с концами в точках A , B , C и D соответственно.

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задает прямую m , параллельную прямой BD или совпадающую с ней.


Заметим, что прямая m касается окружности $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ при $a = 1 - \sqrt{10}$ и $a = 1 + \sqrt{10}$.

При $a = 0$ прямая m содержит лучи l_B и l_D , то есть исходная система имеет бесконечное число решений.

При $a = -2$ прямая m пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых — точка A), пересекает луч l_A в точке A и не имеет общих точек с дугой ω_2 и лучами l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет два решения.

При $a = 4$ прямая m пересекает дугу ω_2 и луч l_C в точке C и не имеет общих точек с дугой ω_1 и лучами l_A , l_B и l_D , то есть исходная система имеет одно решение.

При $a = 1 - \sqrt{10}$ прямая m касается дуги ω_1 , пересекает луч l_A в точке, отличной от точки A , и не имеет общих точек с дугой ω_2 и лучами l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет два решения.



При $a < 1 - \sqrt{10}$ прямая m пересекает луч l_A в одной точке и не имеет общих точек с дугами ω_1 и ω_2 и лучами l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет одно решение.

При $1 - \sqrt{10} < a < -2$ прямая m пересекает дугу ω_1 в двух точках, отличных от точки A , пересекает луч l_A в точке, отличной от точки A , и не имеет общих точек с дугой ω_2 и лучами l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет три решения.

При $-2 < a < 0$ прямая m пересекает дугу ω_1 в одной точке и не имеет общих точек с дугой ω_2 и лучами l_A , l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет одно решение.

При $0 < a < 4$ прямая m пересекает дугу ω_2 в одной точке и не имеет общих точек с дугой ω_1 и лучами l_A , l_B , l_C и l_D , то есть исходная система имеет одно решение.

При $a > 4$ прямая m пересекает луч l_C в точке, отличной от точки C , и не имеет общих точек с дугами ω_1 и ω_2 и лучами l_A , l_B и l_D , то есть исходная система имеет одно решение.

Значит, исходная система имеет более двух решений при $1 - \sqrt{10} < a < -2$ или $a = 0$.

Ответ: $1 - \sqrt{10} < a < -2$; $a = 0$.

Задания для самостоятельного решения

1. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\left| \frac{5}{x} - 3 \right| = ax - 2$$

на промежутке $(0; +\infty)$ имеет ровно два корня.

2. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$a|x - 3| = \frac{5}{x + 2}$$

на промежутке $[0; +\infty)$ имеет более двух корней.

3. Найдите все значения a , при каждом из которых наименьшее значение функции

$$f(x) = \frac{9}{4}x^2 - 3ax + a^2 + 3a + 3$$

на множестве $|x| \geq 2$ не меньше 12.

4. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$|3x^2 - 5x + 2| = a - 3x^2 + 2x$$

либо не имеет решений, либо имеет единственное решение.

5. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$2\sqrt{x^4 + (a - 2)^4} = |x + a - 2| + |x - a + 2|$$

имеет единственное решение.

6. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 - |x - 5 + a| = |x - a + 5| - (5 - a)^2$$

имеет единственный корень.

7. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$|(x+1)^2 - 2^{-a-1}| + |x+1| + (1+x)^2 + 2^{a+1} = 0,25 + 4^a$$

имеет единственное решение. Найдите это решение для каждого полученного значения a .

8. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(\log_6(x+4) - \log_6(x-4))^2 - 10(\log_6(x+4) - \log_6(x-4)) - 4a^2 + 4a + 24 = 0$$

имеет ровно два решения.

9. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(\log_7(x+a) - \log_7(x-a))^2 - 3a(\log_7(x+a) - \log_7(x-a)) + 2a^2 + 3a - 9 = 0$$

имеет ровно два решения.

10. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(|x-9| - |x-a|)^2 - 9a(|x-9| - |x-a|) + 8a^2 + 28a - 16 = 0$$

имеет ровно два решения.

11. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(ax^2 - 2x)^2 + (a^2 - a + 2)(ax^2 - 2x) - a^2(a - 2) = 0$$

имеет ровно два решения.

12. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$10a + \sqrt{-35 + 12x - x^2} = ax + 1$$

имеет единственный корень.

13. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{\cos x - a}{\cos 2x - 4}$$
 содержит число -2 .

14. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{5a + 150x - 10ax}{100x^2 + 20ax + a^2 + 25}$$
 содержит отрезок $[0; 1]$.

15. Найдите все значения a , при каждом из которых множество значений функции

$$y = \frac{\sqrt{a-1} - 2\sin 2x + 1}{\cos^2 2x + a + 2\sqrt{a-1}}$$
 содержит отрезок $[1; 2]$.

16. Найдите все значения a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{a - (a^2 - 2a)\cos 2x + 2}{3 - \cos 4x + a^2} < 1$$
 содержит отрезок $\left[-2\pi; -\frac{7\pi}{6}\right]$.

17. Найдите все отрицательные значения a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{x^2 - 2x + 1 - a^3 - 10\log_{0,5}(a^2 + 10a + 32)}{11\sqrt{23(1-x)^4 + 7x^2 - 14x + 7 - a^3 + 25 + \log_{0,5}^2(a^2 + 10a + 32)}} \geq 1$$

состоит из одной точки, и найдите это решение.

18. Найдите все значения a , для каждого из которых уравнение

$$|2\cos^2 x - a| + 3|\cos 2x + a + 1| = a + 9$$

имеет хотя бы одно решение.

19. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 + 10xy = 0, \\ (x - a)^2 + (y - a)^2 = 10a^4 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

20. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy - 3x + 3y)\sqrt{3-x}}{\sqrt{x+4}} = 0, \\ x + 2y = a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

21. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 20x + y^2 - 20y + 75 = |x^2 + y^2 - 25|, \\ x - y = a \end{cases}$$

имеет более одного решения.

22. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x - 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

23. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x^2 - 1| + 2x - x^2 = |y^2 - 1| + 2y - y^2, \\ x + y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

24. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 - 6y + |y^2 - 6y - 7| = 7, \\ a = 3y + x \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

4. СТЕРЕОМЕТРИЯ

4.1. Параллелепипеды

1. В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 11, а боковое ребро $AA_1 = 7$. Точка K принадлежит ребру $B_1 C_1$ и делит его в отношении 8:3, считая от вершины B_1 .

а) Докажите, что сечение этой призмы плоскостью, проходящей через точки B, D и K , — равнобедренная трапеция.

б) Найдите площадь этого сечения.

Решение.

а) Пусть L — точка, в которой плоскость сечения пересекает ребро $C_1 D_1$. Отрезок KL параллелен диагонали BD . Искомое сечение — трапеция $BDLK$ (рис. 1).

Плоскость сечения пересекает нижнее основание по прямой BD , параллельной $B_1 D_1$, значит, KL параллельно $B_1 D_1$.

Треугольники $LC_1 K$ и $D_1 C_1 B$ подобны, следовательно,

$$C_1 L : C_1 D_1 = C_1 K : C_1 B_1 = KL : B_1 D_1 = 3 : 11.$$

$$\text{Значит, } BD = B_1 D_1 = 11\sqrt{2}, \quad KL = 3\sqrt{2}.$$

В равных прямоугольных треугольниках $DD_1 L$ и $BB_1 K$ имеем

$$BK = DL = \sqrt{DD_1^2 + D_1 L^2} = \sqrt{113},$$

значит, трапеция $BDLK$ равнобедренная.

б) Пусть LH — высота трапеции $BDLK$, проведённая к основанию BD (рис. 2), тогда:

$$DH = \frac{BD - LK}{2} = 4\sqrt{2}; \quad LH = \sqrt{DL^2 - DH^2} = 9;$$

$$S_{BDLK} = \frac{BD + LK}{2} \cdot LH = 63\sqrt{2}.$$

Ответ: б) $63\sqrt{2}$.




Рис. 1




Рис. 2

2. Точка M — середина ребра $C_1 D_1 = 2$ куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямыми AM и BA_1 .

Решение.


Пусть N — середина ребра CC_1 . Поскольку MN — средняя линия треугольника $D_1 C C_1$, $MN \parallel CD_1 \parallel BA_1$, то есть угол $\angle AMN$ искомый.

$$AM = \sqrt{AA_1^2 + A_1 D_1^2 + D_1 M^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3,$$

аналогично, $AN = 3$, то есть, треугольник AMN равнобедренный с основанием $MN = \frac{CD_1}{2} = \sqrt{2}$.


$$\text{Тогда } \cos \angle AMN = \frac{MN}{2AM} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

Ответ: $\arccos \frac{\sqrt{2}}{6}$.



3. В основании прямого параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ высотой 1 лежит ромб $ABCD$, у которого $AB = 2$ и $\angle A = 30^\circ$. Проведена плоскость, содержащая ребро AB и составляющая с плоскостью основания параллелепипеда угол 60° .
Найдите площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью.

Решение.




Проведём через точку D сечение $DD_1 H_1 H$ параллелепипеда, перпендикулярное AB . В плоскости этого сечения будет располагаться линейный угол двугранного угла между плоскостью сечения и плоскостью основания. Поскольку $DH = 2 \sin 30^\circ = 1 = DD_1$, сечение будет квадратом, а значит, наша плоскость пройдёт через точку M , лежащую на стороне $D_1 H_1$, поскольку $\angle MHD = 60^\circ > 45^\circ$. Искомое сечение будет параллелограммом со стороной AB и высотой MH к ней.

Из треугольника MNH_1 получаем, что $MH = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Площадь параллелограмма $S = MH \cdot AB = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Ответ: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.



4. В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ стороны основания равны 1, а боковые рёбра равны 4. На ребре AA_1 отмечена точка E так, что $AE:EA_1 = 3:1$. Найдите угол между плоскостями ABC и BED_1 .

Решение.

Пусть прямая $D_1 E$ пересекает прямую AD в точке K . Плоскости ABC и BED_1 пересекаются по прямой KB .

Из точки E опустим перпендикуляр EH на прямую KB , тогда отрезок AH (проекция EH) перпендикулярен прямой KB . Угол AHE является линейным углом двугранного угла, образованного плоскостями ABC и BED_1 .

Поскольку $AE:EA_1 = 3:1$, получаем:


$$AE = \frac{3AA_1}{4} = 3; \quad EA_1 = AA_1 - AE = 1.$$

Из подобия треугольников $A_1 D_1 E$ и AKE находим:

$$AK = \frac{AE}{EA_1} \cdot A_1 D_1 = 3.$$

В прямоугольном треугольнике AKB с прямым углом A : $AB = 1$; $AK = 3$;
 $BK = \sqrt{AB^2 + AK^2} = \sqrt{10}$, откуда высота

$$AH = \frac{AK \cdot AB}{BK} = \frac{3\sqrt{10}}{10}.$$



Из прямоугольного треугольника AHE с прямым углом A получаем:

$$\operatorname{tg} \angle AHE = \frac{AE}{AH} = \sqrt{10}.$$

Ответ: $\operatorname{arctg} \sqrt{10}$.

5. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB = 2$, $AD = AA_1 = 1$. Найдите угол между прямой $A_1 B_1$ и плоскостью $AB_1 D_1$.


Решение.

Пусть точка E — середина отрезка AD_1 . Прямые $A_1 E$ и $B_1 E$ являются медианами равнобедренных треугольников, перпендикулярны прямой AD_1 , значит, прямая AD_1 перпендикулярна плоскости $A_1 E B_1$. Плоскости $AB_1 D_1$ и $A_1 E B_1$ перпендикулярны, значит, искомый угол равен углу $A_1 B_1 E$. В прямоугольном треугольнике $A_1 B_1 E$

$$A_1 E = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad A_1 B_1 = 2.$$

Следовательно, $\operatorname{tg} \angle A_1 B_1 E = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{4}$.



6. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра $AB = 4$, $AD = 3$, $AA_1 = 7$. Точка O принадлежит ребру BB_1 и делит его в отношении 3:4, считая от вершины B . Найдите площадь сечения этого параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A , O и C_1 .

Решение.

Пусть точка P — такая точка на ребре DD_1 , что $AP \parallel OC_1$. Тогда сечение параллелепипеда плоскостью AOC_1 — четырёхугольник APC_1O . Поскольку противоположные грани параллелепипеда параллельны, $PC_1 \parallel AO$, следовательно, APC_1O — параллелограмм (рис. 1).

Треугольники ADP и $C_1 B_1 O$ равны, следовательно,

$$DP = B_1 O = \frac{4}{7} BB_1 = 4;$$

$$BO = BB_1 - B_1 O = 3.$$

$$AP = \sqrt{AD^2 + DP^2} = 5;$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2} = 5,$$

значит, AOC_1P — ромб со стороной 5 и диагональю

$AC_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{74}$ (рис. 2). Тогда диагональ

$$OP = 2 \sqrt{AO^2 - \left(\frac{AC_1}{2}\right)^2} = \sqrt{26};$$

$$S_{AOC_1P} = \frac{AC_1 \cdot OP}{2} = \sqrt{481}.$$

Ответ: $\sqrt{481}$.




Рис. 1




Рис. 2

Задания для самостоятельного решения

1. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра $AB = 5$, $AD = 4$, $AA_1 = 9$. Точка O принадлежит ребру BB_1 и делит его в отношении $4:5$, считая от вершины B .
 - а) Докажите, что сечение этого параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A , O и C_1 , — равнобедренная трапеция.
 - б) Найдите площадь этого сечения.
2. Точка M — середина ребра $BB_1 = 3$ куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямыми $D_1 M$ и DC_1 .
3. В основании прямого параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ высотой 1 лежит ромб $ABCD$, у которого $AB = 4$ и $\angle A = 60^\circ$. Через ребро AB проведена плоскость, составляющая с плоскостью основания параллелепипеда угол 30° . Найдите площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью.
4. В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ стороны основания равны 1, а боковые рёбра равны 5. На ребре AA_1 отмечена точка E так, что $AE:EA_1 = 1:4$. Найдите угол между плоскостями ABC и BED_1 .
5. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра $AB = 3$, $AD = AA_1 = 2$. Найдите угол между прямой $A_1 B_1$ и плоскостью $AB_1 D_1$.
6. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра $AB = 5$, $AD = 3$, $AA_1 = 8$. Точка R принадлежит ребру AA_1 и делит его в отношении $3:5$, считая от вершины A . Найдите площадь сечения этого параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки B , R и D_1 .

4.2. Призмы

1. Дана правильная треугольная призма $ABCA_1 B_1 C_1$, стороны основания которой равны $2\sqrt{7}$. Сечение, содержащее боковое ребро AA_1 и проходящее через середину M ребра $B_1 C_1$, является квадратом. Найдите расстояние между прямыми $A_1 B$ и AM .



Решение.

Пусть данное сечение призмы — квадрат $AA_1 ML$. Тогда его диагонали перпендикулярны: $AM \perp A_1 L$, а по теореме о трёх перпендикулярах $AM \perp BC$. Следовательно, $AM \perp A_1 BC$. Отсюда следует, что искомым расстоянием между прямыми $A_1 B$ и AM является длина перпендикуляра OP , опущенного из точки O пересечения диагоналей квадрата $AA_1 ML$ на прямую $A_1 B$, так как $OP \perp A_1 B$ и $OP \perp AM$.

Сторона квадрата $AA_1 ML$ равна высоте треугольника ABC , то есть $AL = \sqrt{21}$, а его диагональ $A_1 L = \sqrt{42}$. В равнобедренном треугольнике $A_1 BC$ основание $BC = 2\sqrt{7}$, боковая сторона $A_1 B = 7$. Отсюда, используя подобие треугольников $A_1 OP$ и $A_1 BL$, найдём

$$OP = \frac{A_1 O \cdot LB}{A_1 B} = \frac{A_1 L \cdot BC}{4A_1 B} = \frac{\sqrt{42} \cdot 2\sqrt{7}}{4 \cdot 7} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Ответ: $\frac{\sqrt{6}}{2}$.



2. В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит треугольник ABC , у которого $AC = BC = 18$ и $AB = 12$. Высота призмы $AA_1 = 7$. Точка K – середина ребра B_1C_1 . Найдите площадь сечения призмы плоскостью ACK .

Решение.

Плоскость сечения пересекает основания по параллельным прямым, поэтому она пересекает верхнее основание $A_1B_1C_1$ по прямой, параллельной AC . Эта прямая будет параллельна и A_1C_1 , то есть будет проходить через середину M ребра A_1B_1 . Искомое сечение – трапеция $ACKM$.

В трапеции $ACKM$ основания $AC = 18$ и $KM = \frac{A_1C_1}{2} = 9$. Опустим из точки M перпендикуляр MN на плоскость ABC . Получим, что N – середина AB . Проведём из точки N перпендикуляр NH на AC . По теореме о трёх перпендикулярах MN будет высотой трапеции $ACKM$. Теперь найдём NH , вычислив площадь треугольника ACN двумя способами:


$$2S_{ACN} = AN \cdot CN = AC \cdot NH,$$

$$\text{откуда } NH = \frac{AN \cdot CN}{AC} = \frac{6 \cdot \sqrt{324 - 36}}{18} = 4\sqrt{2}.$$

Из треугольника MNH найдём $MN = \sqrt{32 + 49} = 9$.

Площадь трапеции $ACKM$ равна $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot (18 + 9) = \frac{243}{2}$.

Ответ: 121,5.



3. У правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна $AB = 6$, боковое ребро $AA_1 = 8$. Найдите синус угла между прямой BC_1 и плоскостью B_1CA_1 .

Решение.

Пусть M – середина BC , а M_1 – середина B_1C_1 .

Синус искомого угла α равен $\frac{h}{BC_1}$, где h – расстояние от точки C_1 до плоскости B_1CA_1 . Поскольку


$BC_1 = \sqrt{BC^2 + CC_1^2} = 10$, задача сводится к отысканию h . Заметим, что, поскольку $B_1C_1 \parallel B_1CA_1$, расстояние от M_1 до данной плоскости также равно h . В

плоскости AMM_1 , перпендикулярной плоскости B_1CA_1 , это расстояние равно высоте M_1H треугольника AMM_1 . Вычислим его катет $A_1M_1 = 3\sqrt{3}$ и гипотенузу $A_1M = \sqrt{64 + 27} = \sqrt{91}$. А теперь, вычисляя двумя способами площадь, запишем

$2S_{A_1MM_1} = 8 \cdot 3\sqrt{3} = h \cdot \sqrt{91}$, откуда $h = \frac{24\sqrt{3}}{\sqrt{91}}$. Из

формулы $\sin \alpha = \frac{h}{BC_1}$ получаем, что $\sin \alpha = \frac{12\sqrt{3}}{5\sqrt{91}}$.

Ответ: $\frac{12\sqrt{273}}{455}$.



4. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ стороны основания равны 1, боковые рёбра равны 3, точка D — середина ребра CC_1 . Найдите угол между плоскостями ABC и ADB_1 .

Решение.

Прямая B_1D пересекает прямую BC в точке K . Плоскости ABC и ADB_1 пересекаются по прямой AK .

Из точки D опустим перпендикуляр DH на прямую AK , тогда отрезок CH (проекция DH) перпендикулярен прямой AK . Угол CHD является линейным углом двугранного угла, образованного плоскостями ABC и ADB_1 .

Точка D — середина ребра CC_1 , поэтому $CD = DC_1 = \frac{3}{2}$.

Из равенства треугольников B_1C_1D и KCD получаем:

$$CK = B_1C_1 = 1.$$


В равнобедренном треугольнике ACK угол C равен 120° , $AC = CK = 1$, высота CH является биссектрисой, откуда

$$CH = AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Из прямоугольного треугольника CDH с прямым углом C получаем:

$$\operatorname{tg} \angle CHD = \frac{CD}{CH} = 3.$$

Ответ: $\operatorname{arctg} 3$.




5. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ все рёбра равны 1. Найдите расстояние от точки B до плоскости FB_1C_1 .

Решение.

Прямые BB_1 и FB перпендикулярны прямой EF . Плоскость FB_1C_1 , содержащая прямую EF , перпендикулярна плоскости BB_1F , значит, искомое расстояние равно высоте BH прямоугольного треугольника BB_1F , в котором $BB_1 = 1$, $BF = \sqrt{3}$, $B_1F = 2$.

$$BH = \frac{BB_1 \cdot BF}{B_1F} = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Задания для самостоятельного решения

1. Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, стороны основания которой равны 2. Сечение, содержащее боковое ребро AA_1 и проходящее через середину M ребра B_1C_1 , является квадратом. Найдите расстояние между прямыми A_1B и AM .
2. В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит треугольник ABC , у которого $AC = BC = 10$ и $AB = 12$. Высота призмы $AA_1 = 9$. Точка K — середина ребра B_1C_1 . Найдите площадь сечения призмы плоскостью ACK .

- У правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания $AB = 5$, боковое ребро $AA_1 = 12$. Найдите синус угла между прямой BC_1 и плоскостью B_1CA_1 .
- В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ стороны основания равны 3, боковые рёбра равны 4, точка D – середина ребра CC_1 . Найдите угол между плоскостями ABC и ADB_1 .
- В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ все рёбра равны 2. Найдите расстояние от точки B до плоскости FB_1C_1 .

4.3. Треугольные пирамиды

- Высота SO правильной треугольной пирамиды $SABC$ составляет $\frac{5}{7}$ от высоты SM боковой грани SAB . Найдите угол между плоскостью основания пирамиды и её боковым ребром.

Решение.

Пусть $SO = 5x$ и $SM = 7x$. Тогда


$$OM = x\sqrt{49 - 25} = x\sqrt{24} = 2x\sqrt{6},$$

а $OC = 2 \cdot OM = 4x\sqrt{6}$. Из треугольника COS находим

$$\operatorname{tg} \angle SCO = \frac{OS}{OC} = \frac{5x}{4x\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{24}.$$

Тогда искомым углом равен $\operatorname{arctg} \frac{5\sqrt{6}}{24}$.

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{5\sqrt{6}}{24}$.



- В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC боковые рёбра равны 5, а стороны основания равны 6. Найдите расстояние от вершины A до плоскости SBC .

Решение.

Пусть SO – высота пирамиды, M – середина BC . Тогда

$$AO = \frac{AB}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}, \quad OM = \frac{AO}{2} = \sqrt{3};$$

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{25 - 12} = \sqrt{13};$$


$$SM = \sqrt{SO^2 + OM^2} = \sqrt{13 + 3} = 4.$$

Расстояние от A до плоскости SBC равно высоте AH треугольника SAM .

Подсчитав площадь этого треугольника двумя способами, получаем

$$\frac{AM \cdot SO}{2} = \frac{SM \cdot AH}{2}, \quad \text{откуда} \quad AH = \frac{AM \cdot SO}{SM} = \frac{3\sqrt{39}}{4}.$$


Ответ: $\frac{3\sqrt{39}}{4}$.



3. Косинус угла между боковой гранью и основанием правильной треугольной пирамиды равен $\frac{\sqrt{3}}{4}$. Найдите угол между двумя боковыми гранями пирамиды с общим боковым ребром.

Решение.

Пусть $SABC$ — данная пирамида, SH — высота, M — середина ребра BC . Тогда косинус угла наклона боковой грани к основанию равен $\cos \angle HMS = \frac{HM}{MS} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Не ограничивая общности, можно считать, что $HM = \sqrt{3}$ и $SM = 4$. Тогда $AM = 3 \cdot HM = 3\sqrt{3}$ и $BM = CM = \frac{AM}{\sqrt{3}} = 3$.



По теореме Пифагора в треугольниках SHM и SHA имеем:

$$SH = \sqrt{SM^2 - MH^2} = \sqrt{13}; \quad SA = \sqrt{AH^2 + SH^2} = 5.$$

Заметим, что искомый угол равен 2φ , где φ — угол между плоскостями ASB и ASM . Найдём этот угол. Для этого проведём высоту ME в треугольнике ASM . Вычислим площадь треугольника ASM двумя способами:

$$2S_{ASM} = SH \cdot AM = AS \cdot ME,$$

$$\text{откуда } ME = \frac{SH \cdot AM}{SA} = \frac{\sqrt{13} \cdot 3\sqrt{3}}{5} = \frac{3\sqrt{39}}{5}.$$

По теореме о трёх перпендикулярах $AS \perp BE$, так что $\angle BEM = \varphi$ и

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{BM}{ME} = \frac{3 \cdot 5}{3\sqrt{39}} = \frac{5}{\sqrt{39}}.$$

$$\text{Ответ: } 2 \arctg \frac{5\sqrt{39}}{39}.$$

4. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды $SABC$ равно 6, а косинус угла ASB при вершине боковой грани равен $\frac{1}{9}$. Точка M — середина ребра SC . Найдите косинус угла между прямыми BM и SA .

Решение.

Пусть N — середина AC . Поскольку $MN \parallel SA$ по теореме о средней линии треугольника, искомый угол — угол BMN .

По теореме о средней линии треугольника

$$MN = \frac{SA}{2} = 3.$$

В треугольнике BSM по теореме косинусов получаем:

$$BM = \sqrt{36 + 9 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{9}} = \sqrt{41}.$$

В треугольнике BSC по теореме косинусов получаем:



$$BC = \sqrt{36 + 36 - 2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{1}{9}} = \sqrt{64} = 8.$$

Треугольник ABC равносторонний, значит, медиана $BN = 4\sqrt{3}$.

В треугольнике BMN по теореме косинусов получаем:

$$\cos \angle NMB = \frac{9 + 41 - 48}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{41}} = \frac{1}{3\sqrt{41}}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\sqrt{41}}{123}.$$



5. В правильной треугольной пирамиде $MABC$ с основанием ABC стороны основания равны 6, а боковые рёбра равны 10. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $AD = AE = LM = 4$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки E , D и L .

Решение.

Пусть O — центр основания пирамиды. В треугольнике ABC имеем:

$$AE:EB = AD:DC = 2:1,$$

значит, $DE = \frac{2}{3}BC = 4$, отрезок DE делит медиану, проведённую из вершины A , в отношении 2:1, то есть содержит точку O . Кроме того, O — середина DE .

Рассмотрим прямоугольный треугольник AMO . В нём $AO = 2\sqrt{3}$. Опустим из точки L перпендикуляр LK на сторону AO . Тогда


$$AK = \frac{3}{5}AO = \frac{6\sqrt{3}}{5}, \quad KO = \frac{2}{5}AO = \frac{4\sqrt{3}}{5}.$$

Значит,

$$LK = \sqrt{LA^2 - AK^2} = \frac{6\sqrt{22}}{5}; \quad LO = \sqrt{LK^2 + KO^2} = \frac{2\sqrt{210}}{5}.$$

Равнобедренный треугольник DLE — искомое сечение, а LO — его высота. Площадь искомого сечения равна $\frac{1}{2}LO \cdot DE = \frac{4\sqrt{210}}{5}$.

Ответ: $\frac{4\sqrt{210}}{5}$.



6. В правильной треугольной пирамиде $MABC$ с основанием ABC стороны основания равны 6, а боковые рёбра равны 5. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $AD = AE = AL = 4$. Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через точки E , D и L .

Решение.

Пусть O — центр основания пирамиды. В треугольнике ABC имеем $AE:EB = AD:DC = 2:1$, значит, отрезок DE делит медиану, проведённую из вершины A , в отношении 2:1, то есть содержит точку O . Кроме того, AO и DE перпендикулярны.

Прямая DE перпендикулярна MO и AO , поэтому искомый угол между плоскостями равен углу AOL . Рассмотрим прямоугольный треугольник AMO . В нём $AO = 2\sqrt{3}$. Опустим из точки L перпендикуляр LK на сторону AO . Тогда


$$OK = \frac{1}{5}AO = \frac{2\sqrt{3}}{5},$$

$$LK = \frac{4}{5}MO = \frac{4}{5}\sqrt{MA^2 - AO^2} = \frac{4\sqrt{13}}{5}.$$

Значит,

$$\operatorname{tg} \angle AOL = \frac{LK}{OK} = \frac{2\sqrt{39}}{3}.$$

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{2\sqrt{39}}{3}$.



7. В треугольной пирамиде $MABC$ основанием является правильный треугольник ABC , ребро MB перпендикулярно плоскости основания, стороны основания равны 3, а ребро MA равно 5. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $AD = AE = ML = 2$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки E, D и L .

Решение.

Пусть N — середина BC , K — основание перпендикуляра, опущенного из L на плоскость основания, P — основание перпендикуляра, опущенного из K на DE . Отрезок LK параллелен MB , поэтому точка K лежит на ребре AB и делит его в отношении 3:2,

$$LK = \frac{3}{5}MB = \frac{3}{5}\sqrt{MA^2 - AB^2} = \frac{12}{5}.$$

В треугольнике ABC имеем:

$$AE:EB = AD:DC = 2:1,$$


откуда $DE = \frac{2}{3}BC = 2$ и прямые DE и BC параллельны. Значит, треугольники ABN и KEP подобны и

$$KP = \frac{KE}{AB} \cdot AN = \frac{1}{15} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{\sqrt{3}}{10}.$$

Прямая DE перпендикулярна KP и LK , поэтому эта прямая перпендикулярна плоскости KPL , следовательно, LP — высота треугольника DLE , являющегося искомым сечением. Площадь искомого сечения равна

$$\frac{1}{2}LP \cdot DE = \frac{1}{2}\sqrt{LK^2 + KP^2} \cdot DE = \frac{\sqrt{579}}{10}.$$

Ответ: $\frac{\sqrt{579}}{10}$.



8. В треугольной пирамиде $MABC$ основанием является правильный треугольник ABC , ребро MB перпендикулярно плоскости основания, стороны основания равны 3, а ребро MA равно $\sqrt{13}$. На ребре AC находится точка D , а на ребре AB находится точка E . Известно, что $AD = 2$, $BE = 1$. Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через точки E, D и середину ребра MA .

Решение.

Пусть L — середина AM , K — середина AB , N — середина BC , P — основание перпендикуляра, опущенного из K на DE . Отрезок LK — средняя линия треугольника ABM , поэтому LK перпендикулярен плоскости ABC и

$$LK = \frac{1}{2}MB = \frac{1}{2}\sqrt{MA^2 - AB^2} = 1.$$

В треугольнике ABC имеем:

$$AE:EB = AD:DC = 2:1,$$


значит, прямые DE и BC параллельны. Следовательно, треугольники ABN и KEP подобны и

$$KP = \frac{KE}{AB} \cdot AN = \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Прямая DE перпендикулярна KP и LK , поэтому искомым углом между плоскостями равен углу KPL . В прямоугольном треугольнике KPL имеем:

$$\operatorname{tg} \angle KPL = \frac{KL}{LP} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{4\sqrt{3}}{3}$.



Задания для самостоятельного решения

1. Высота SO правильной треугольной пирамиды $SABC$ составляет $\frac{4}{5}$ от высоты SM боковой грани SAB . Найдите угол между плоскостью основания пирамиды и её боковым ребром.
2. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC боковые рёбра равны 3, а стороны основания равны 2. Найдите расстояние от вершины A до плоскости SBC .
3. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды $SABC$ равно 10, а косинус угла ASB при вершине боковой грани равен $\frac{17}{25}$. Точка M — середина ребра SC . Найдите косинус угла между прямыми BM и SA .
4. Косинус угла между боковой гранью и основанием правильной треугольной пирамиды равен $\frac{1}{2\sqrt{6}}$. Найдите угол между двумя боковыми гранями пирамиды.
5. В правильной треугольной пирамиде $MABC$ с основанием ABC стороны основания равны 6, а боковые рёбра равны 8. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $CD = BE = LA = 2$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки E , D и L .
6. В правильной треугольной пирамиде $MABC$ с основанием ABC стороны основания равны 6, а боковые рёбра равны 8. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $CD = BE = AL = 2$. Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через точки E , D и L .
7. В треугольной пирамиде $MABC$ основанием является правильный треугольник ABC , ребро MB перпендикулярно плоскости основания, стороны основания равны 6, а ребро MA равно $6\sqrt{2}$. На ребре AC находится точка D , а на ребре AB находится точка E . Известно, что $AD = 4$, $BE = 2$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки E , D и середину ребра MA .
8. В треугольной пирамиде $MABC$ основанием является правильный треугольник ABC , ребро MB перпендикулярно плоскости основания, стороны основания равны 3, а ребро MA равно 5. На ребре AC находится точка D , на ребре AB находится точка E , а на ребре AM — точка L . Известно, что $AD = AL = 2$ и $BE = 1$. Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через точки E , D и L .

4.4. Четырёхугольные пирамиды

1. В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ угол наклона бокового ребра к основанию $ABCD$ равен 30° . Найдите угол между соседними боковыми гранями пирамиды.

Решение.

Пусть SO — высота пирамиды $SABCD$.

Не ограничивая общности, можно считать, что $SO = 1$.

Тогда $\angle SBO = 30^\circ$, поэтому $SB = 2$ и $BO = \sqrt{3}$. Очевидно, что требуемый угол вдвое больше угла φ между SAB и SBO .

Пусть OH — высота в треугольнике SOB . Тогда по теореме о трёх перпендикулярах $AH \perp SB$, и $\angle AHO = \varphi$.

Вычисляя площадь треугольника SOB двумя способами, получим


$$2S_{SOB} = SO \cdot OB = OH \cdot SB,$$

$$\text{откуда } OH = \frac{SO \cdot OB}{SB} = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Тогда } \operatorname{tg} \varphi = \frac{AO}{OH} = \frac{BO}{OH} = \sqrt{3} : \frac{\sqrt{3}}{2} = 2.$$

Получаем, что искомый угол равен $2 \operatorname{arctg} 2$.

Ответ: $2 \operatorname{arctg} 2$.



2. У правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ сторона основания $AB = 4$, а боковое ребро $SA = 5$. На ребре AB отмечена точка K так, что сечение SKC пирамиды является равнобедренным треугольником ($SK = KC$). Найдите периметр этого сечения.

Решение.

Пусть SM — высота в грани SAB , тогда

$$\cos \angle SBK = \frac{MB}{SB} = \frac{2}{5}.$$

Пусть $BK = x$. Тогда в треугольнике BKS по теореме косинусов получаем:

$$SK^2 = BK^2 + BS^2 - 2 \cdot BK \cdot BS \cdot \cos \angle SBK = x^2 + 25 - 4x.$$

В треугольнике BKC по теореме Пифагора имеем:


$$CK^2 = BK^2 + BC^2 = x^2 + 16.$$

Из условия $SK = KC$ находим, что $x = \frac{9}{4}$. Тогда

$$SK = CK = \sqrt{x^2 + 16} = \frac{\sqrt{337}}{4},$$

а периметр сечения равен $5 + 2 \cdot \frac{\sqrt{337}}{4} = 5 + \frac{\sqrt{337}}{2}$.

Ответ: $5 + \frac{\sqrt{337}}{2}$.



3. В основании четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит квадрат со стороной 2, а боковое ребро SA , равное 4, перпендикулярно плоскости основания. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, перпендикулярной ребру SC и проходящей через точку A .


Решение.

Опустим перпендикуляр AH к прямой SC . В треугольнике SAC имеем:

$$SA = 4; \quad AC = 2\sqrt{2}, \quad SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = 2\sqrt{6};$$

$$SH = \frac{SA^2}{SC} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}; \quad AH = \sqrt{SA^2 - SH^2} = \frac{4}{\sqrt{3}}.$$

В точке H построим два перпендикуляра HM и HK к ребру SC , причём точка M лежит на прямой SB , а точка K — на прямой SD (см. рисунок).



В треугольниках SHK и SDC угол S — общий, $\angle SHK = \angle SDC = 90^\circ$, следовательно, эти прямоугольные треугольники подобны, значит,

$$\frac{SK}{SC} = \frac{SH}{SD}, \text{ откуда}$$

$$SK = \frac{SC \cdot SH}{SD} = \frac{8}{\sqrt{5}} < 2\sqrt{5} = SD,$$

следовательно, точка K лежит на ребре SD .

Аналогично, точка M лежит на ребре SB .

Таким образом, искомое сечение — четырёхугольник $AMHK$.

Из прямоугольного треугольника SHK получаем:

$$HK = \sqrt{SK^2 - SH^2} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{15}}.$$

Аналогично, $MH = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{15}}.$

В прямоугольном треугольнике ASD имеем:

$$\cos \angle ASD = \frac{AS}{SD} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

По теореме косинусов в треугольнике ASK получаем:

$$AK = \sqrt{AS^2 + SK^2 - 2 \cdot AS \cdot SK \cdot \cos \angle ASK} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Аналогично, $AM = \frac{4}{\sqrt{5}}.$

Рассмотрим треугольник AHK . В нём $AH^2 = \frac{16}{3} = \frac{32}{15} + \frac{16}{5} = HK^2 + AK^2$, значит, он прямоугольный, откуда получаем:

$$S_{AHK} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{15}} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{6}}{15}.$$

Аналогично, $S_{AHM} = \frac{8\sqrt{6}}{15}.$

Таким образом, $S_{AMHK} = S_{AHK} + S_{AHM} = \frac{16\sqrt{6}}{15}.$


Ответ: $\frac{16\sqrt{6}}{15}.$

4. В основании четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит квадрат со стороной 2, а боковое ребро SA , равное 3, перпендикулярно плоскости основания. Плоскость, перпендикулярная ребру SC и проходящая через точку A , пересекает прямые SB , SC и SD в точках M , H и K соответственно. Найдите угол MHK .

Решение.

Из условия следует, что отрезок AH перпендикулярен прямой SC . В треугольнике SAC имеем:

$$\begin{aligned} SA &= 3; \quad AC = 2\sqrt{2}; \\ SC &= \sqrt{SA^2 + AC^2} = \sqrt{17}; \\ SH &= \frac{SA^2}{SC} = \frac{9}{\sqrt{17}}; \\ AH &= \sqrt{SA^2 - SH^2} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{17}}. \end{aligned}$$



Также из условия следует, что HM и HK перпендикулярны прямой SC .

Прямоугольные треугольники SHK и SDC подобны, значит, $\frac{SK}{SC} = \frac{SH}{SD}$, откуда

$$SK = \frac{SC \cdot SH}{SD} = \frac{9}{\sqrt{13}} < \sqrt{13} = SD,$$

следовательно, точка K лежит на ребре SD .

Аналогично, точка M лежит на ребре SB .

Таким образом, сечение пирамиды плоскостью, перпендикулярной ребру SC и проходящей через точку A — четырёхугольник $AMHK$.

Из прямоугольного треугольника SHK получаем:

$$HK = \sqrt{SK^2 - SH^2} = \frac{18}{\sqrt{221}}.$$

Аналогично, $MH = \frac{18}{\sqrt{221}}$.

В прямоугольном треугольнике ASD имеем:

$$\cos \angle ASD = \frac{AS}{SD} = \frac{3}{\sqrt{13}}.$$

По теореме косинусов в треугольнике ASK получаем:

$$AK = \sqrt{AS^2 + SK^2 - 2 \cdot AS \cdot SK \cdot \cos \angle ASK} = \frac{6}{\sqrt{13}}.$$

Аналогично, $AM = \frac{6}{\sqrt{13}}$.

Получаем, что $\angle MHK = 2\angle AHK$.

Рассмотрим треугольник AHK . В нём $AH^2 = \frac{72}{17} = \frac{324}{221} + \frac{36}{13} = HK^2 + AK^2$, значит, он прямоугольный, откуда:

$$\sin \angle AHK = \frac{6}{\sqrt{13}} : \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{17}} = \sqrt{\frac{17}{26}}.$$

Ответ: $2 \arcsin \sqrt{\frac{17}{26}}$.

5. В правильной четырёхугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 6, а боковые рёбра равны 12. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точку C и середину ребра MA параллельно прямой BD .

Решение.

Пусть точка E — середина ребра MA . Отрезок CE пересекает плоскость MBD в точке P . В треугольнике MAC точка P является точкой пересечения медиан, следовательно, $MP:PO = 2:1$, где O — центр основания пирамиды. Отрезок FG параллелен BD и проходит через точку P (точка F принадлежит ребру MB , G — ребру MD), откуда

$$MF:FB = MG:GD = MP:PO = 2:1;$$


$$FG = \frac{2}{3}BD = \frac{2\sqrt{2} \cdot AB}{3} = 4\sqrt{2}.$$

Четырёхугольник $CFEG$ — искомое сечение. Отрезок CE — медиана треугольника MAC , значит,

$$CE = \frac{\sqrt{2AC^2 + 2MC^2 - MA^2}}{2} = \frac{\sqrt{4AB^2 + MC^2}}{2} = 6\sqrt{2}.$$

Поскольку прямая AC перпендикулярна плоскости MBD , диагонали CE и FG четырёхугольника $CFEG$ перпендикулярны, следовательно, $S_{CFEG} = \frac{CE \cdot FG}{2} = 24$.

Ответ: 24.



6. В правильной четырёхугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 18, а боковые рёбра равны 15. Точка R принадлежит ребру MB , причём $MR:RB = 2:1$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки C и R параллельно прямой BD .

Решение.

Отрезок QR параллелен BD (точка Q принадлежит ребру MD). Пусть QR пересекает MO в точке P (O — центр основания пирамиды), причём $MP:PO = MR:RB = 2:1$, тогда точка P является точкой пересечения медиан треугольника MAC . Прямая CP пересекает ребро MA в точке E — середине MA . Четырёхугольник $CQER$ — искомое сечение.

Отрезок CE — медиана треугольника MAC , значит,


$$CE = \frac{\sqrt{2AC^2 + 2MC^2 - 2MA^2}}{2} = \frac{\sqrt{4AB^2 + MC^2}}{2} = \frac{39}{2},$$

$$RQ = \frac{2}{3}BD = 12\sqrt{2}.$$

Поскольку прямая AC перпендикулярна плоскости MBD , диагонали CE и QR четырёхугольника $CQER$ перпендикулярны, следовательно,

$$S_{CQER} = \frac{CE \cdot QR}{2} = 117\sqrt{2}.$$

Ответ: $117\sqrt{2}$.



Задания для самостоятельного решения

1. В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ угол наклона бокового ребра к основанию равен 60° . Найдите угол между соседними боковыми гранями пирамиды.
2. У правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ сторона основания $AB = 6$, а боковое ребро $SA = 8$. На ребре AB отмечена точка K так, что сечение SKC пирамиды является равнобедренным треугольником ($SK = KC$). Найдите периметр этого сечения.
3. В основании четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит квадрат со стороной 1, а боковое ребро SA , равное 3, перпендикулярно плоскости основания. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, перпендикулярной ребру SC и проходящей через точку A .
4. В основании четырёхугольной пирамиды лежит квадрат со стороной 3, а боковое ребро SA , равное 4, перпендикулярно плоскости основания. Плоскость, перпендикулярная ребру SC и проходящая через точку A , пересекает прямые SB , SC и SD в точках M , H и K соответственно. Найдите угол MHK .
5. В правильной четырёхугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 4, а боковые рёбра равны 8. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точку B и середину ребра MD параллельно прямой AC .
6. В правильной четырёхугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 12, а боковые рёбра равны 24. Точка G принадлежит ребру MA , причём $MG:GA = 2:1$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки B и G параллельно прямой AC .

4.5. Тела вращения

1. Правильная четырёхугольная пирамида $SABCD$, каждое ребро которой равно 2, расположена внутри цилиндра таким образом, что стороны AB и CD основания являются образующими цилиндра, а вершина S — серединой образующей PQ . Найдите объём цилиндра.

Решение.

Так как $AB = 2$ — образующая цилиндра, для вычисления объёма осталось найти его радиус. Пусть точки P , B и C лежат на окружности одного и того же основания, тогда искомый радиус — это радиус описанной окружности треугольника PBC .

В прямоугольном треугольнике SPC имеем:

$$PC = \sqrt{SC^2 - SP^2} = \sqrt{3}.$$

Аналогично, $PB = \sqrt{3}$.

Треугольник PBC равнобедренный. Пусть PM — его высота, тогда


$$PM = \sqrt{PC^2 - CM^2} = \sqrt{2},$$

а площадь этого треугольника равна

$$S_{PBC} = PM \cdot MC = \sqrt{2}.$$

Вспользуемся формулой радиуса описанной окружности треугольника:

$$R = \frac{PB \cdot PC \cdot BC}{4S_{PBC}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2}{4\sqrt{2}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}.$$



По формуле объёма цилиндра получаем:

$$V = 2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{3}{2\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{9\pi}{4}.$$

Ответ: $\frac{9\pi}{4}$.

2. Отрезок $AB = 24$ — диаметр верхнего основания цилиндра, а C — точка на окружности нижнего основания. Найдите угол между плоскостью ABC и плоскостью основания цилиндра, если $AC = 10$ и $BC = 22$.

Решение.

Пусть $CH = h$ — образующая цилиндра.

Так как AB диаметр, угол AHB прямой. По теореме Пифагора в треугольнике AHB получим: $AB^2 = 576 = AH^2 + HB^2$.

Из треугольников AHC и BHC имеем:

$$AH^2 = 10^2 - h^2; \quad BH^2 = 22^2 - h^2.$$

С учётом предыдущего равенства получаем уравнение:

$$576 = 484 - h^2 + 100 - h^2,$$

откуда $h = 2$.

Пусть HE — высота прямоугольного треугольника AHB . По теореме о трёх перпендикулярах $CE \perp AB$ и поэтому угол CEH искомый. Вычисляя двумя способами площадь треугольника AHB , находим:

$$HE = \frac{AH \cdot BH}{AB} = \frac{\sqrt{480} \cdot \sqrt{96}}{24} = 4\sqrt{5}.$$

Из прямоугольного треугольника CEH получаем:

$$\operatorname{tg} \angle CEH = \frac{CH}{HE} = \frac{2}{4\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}.$$

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}}{10}$.

3. Высота конуса равна 6, а радиус его основания равен 7. Плоскость проходит через вершину конуса и пересекает его основание, образуя с плоскостью основания угол $\arcsin \frac{2}{3}$. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.

Решение.

Пусть S — вершина конуса, SAB — искомое сечение. Треугольник SAB равнобедренный, так как $SA = SB$ — образующие конуса. Пусть M — середина AB , тогда по условию $\sin \angle SMO = \frac{2}{3}$, а $OS = 6$.

Из прямоугольного треугольника SMO находим:



$$SM = 6 : \frac{2}{3} = 9; \quad OM = \sqrt{81 - 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Из прямоугольного треугольника MAO получаем:

$$AM = \sqrt{49 - 45} = 2,$$

откуда $S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot SM = 18$.

Ответ: 18.



4. Высота конуса равна 1, а радиус его основания равен 7. Плоскость проходит через вершину конуса таким образом, что сечение конуса этой плоскостью является прямоугольным треугольником. Найдите синус угла, который эта плоскость образует с плоскостью основания.

Решение.

Пусть S — вершина конуса, SAB — указанное сечение. Треугольник SAB равнобедренный, так как $SA = SB$ — образующие конуса. По условию он также прямоугольный, поэтому $\angle ASB = 90^\circ$.

Пусть M — середина AB и O — центр основания конуса. Обозначим $OM = x$ и


$$AM = BM = SM = y.$$

Применяя теорему Пифагора к треугольникам SOM и AOM , запишем: $y^2 - x^2 = 1$ и $y^2 + x^2 = 49$. Сложив уравнения, найдём $y = 5$ (искать x не обязательно).

Из прямоугольного треугольника SOM находим:

$$\sin \angle SMO = \frac{SO}{SM} = 0,2.$$

Ответ: 0,2.



5. Радиус основания конуса с вершиной P равен 6, а длина его образующей равна 9. На окружности основания конуса выбраны точки A и B , делящие окружность на две дуги, длины которых относятся как 1:3. Найдите площадь сечения конуса плоскостью ABP .

Решение.

Пусть O — центр основания конуса, M — середина хорды AB . Дуга AB составляет четверть окружности основания, поэтому $\angle AOB = 90^\circ$. Треугольник равнобедренный, следовательно,

$$AB = 2AM = 2AO \cdot \sin \frac{\angle AOB}{2} = 6\sqrt{2}.$$


Равнобедренный треугольник APB — искомое сечение. Отрезок PM — его высота,

$$PM = \sqrt{AP^2 - AM^2} = 3\sqrt{7}.$$

Площадь искомого сечения равна

$$\frac{1}{2}PM \cdot AB = 9\sqrt{14}.$$

Ответ: $9\sqrt{14}$.



6. Две параллельные плоскости, расстояние между которыми равно 6, пересекают шар таким образом, что центр шара лежит между плоскостями. Площади сечений шара этими плоскостями равны 25π и 49π . Найдите радиус шара.


Решение.

Пусть O — центр шара, O_1 и O_2 — центры первого и второго сечений. Тогда OO_1 и OO_2 — перпендикуляры к плоскостям сечений, а так как плоскости параллельны, то O лежит на отрезке $O_1O_2 = 6$.

Пусть $OO_1 = x$, тогда $OO_2 = 6 - x$. Выберем на окружностях сечений точки A (на окружности первого сечения) и B (на окружности второго сечения). Радиусы сечений можно вычислить, зная их площади: они равны 5 и 7 соответственно.

Применяя теорему Пифагора к треугольникам OO_1A и OO_2B , запишем:

$$OA^2 = 25 + x^2; \quad OB^2 = 49 + (6 - x)^2.$$



Но $OA = OB$ как радиусы шара, поэтому $25 + x^2 = 49 + (6 - x)^2$, откуда $x = 5$. Из треугольника OO_1A находим радиус шара:

$$OA = \sqrt{25 + x^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$$

Ответ: $5\sqrt{2}$.

7. Диаметр шара перпендикулярен некоторой плоскости и делится ею в отношении 2:3. Площадь сечения шара указанной плоскостью равна 54π . Найдите радиус шара.

Решение.

Пусть AB — данный диаметр, O — центр шара, O_1 — центр круга, являющегося сечением, причём $O_1A < O_1B$.

Площадь данного сечения шара равна 54π , значит, радиус круга $3\sqrt{6}$.

Пусть $OO_1 = x$, тогда из условия следует, что $AO_1 = 4x$, $BO_1 = 6x$.


Пусть N — точка на границе круга, тогда из треугольника O_1ON находим по теореме Пифагора:

$$ON^2 = OO_1^2 + NO_1^2; \quad (3\sqrt{6})^2 + x^2 = 25x^2;$$

откуда $x = \frac{3}{2}$.

$$\text{Радиус шара равен } R = \frac{AO_1 + BO_1}{2} = 5x = 7,5.$$

Ответ: 7,5.



Задания для самостоятельного решения

1. Правильная четырёхугольная пирамида $SABCD$, стороны основания которой равны 2, а боковые рёбра равны 3, расположена внутри цилиндра таким образом, что стороны AB и CD основания являются образующими цилиндра, а вершина S — серединой образующей PQ . Найдите объём цилиндра.
2. Отрезок $AB = 8$ — диаметр верхнего основания цилиндра, а C — точка на окружности нижнего основания. Найдите угол между плоскостью ABC и плоскостью основания цилиндра, если $AC = 9$ и $BC = 11$.
3. Высота конуса равна 5, а радиус его основания равен 4. Плоскость проходит через вершину конуса и пересекает его основание, образуя с плоскостью основания угол $\arcsin \frac{5}{6}$. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.
4. Высота конуса равна 1, а радиус его основания равен 3. Плоскость проходит через вершину конуса таким образом, что сечение конуса этой плоскостью является прямоугольным треугольником. Найдите синус угла, который эта плоскость образует с плоскостью основания.
5. Радиус основания конуса с вершиной P равен 6, а длина его образующей равна 9. На окружности основания конуса выбраны точки A и B , делящие окружность на две дуги, длины которых относятся как 1:5. Найдите площадь сечения конуса плоскостью ABP .
6. Две параллельные плоскости, расстояние между которыми равно 7, пересекают шар таким образом, что центр шара лежит между плоскостями. Площади сечений шара этими плоскостями равны 18π и 25π . Найдите радиус шара.
7. Диаметр шара перпендикулярен некоторой плоскости и делится ею в отношении 1:6. Площадь сечения шара указанной плоскостью равна 150π . Найдите радиус шара.

5. ПЛАНИМЕТРИЯ

5.1. Планиметрические задачи (одна конфигурация с окружностью)

1. В треугольник ABC вписана окружность радиуса R , касающаяся стороны AC в точке D , причём $AD = R$.
- Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
 - Вписанная окружность касается сторон AB и BC в точках E и F . Найдите площадь треугольника BEF , если известно, что $R = 5$ и $CD = 15$.

Решение.

а) Пусть O — центр вписанной окружности треугольника ABC (см. рисунок).

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе, значит, AO — биссектриса угла BAC . Треугольник AOD прямоугольный и равнобедренный, поэтому $\angle AOD = 45^\circ$. Следовательно, $\angle BAC = 90^\circ$.

б) Пусть $BF = x$. По теореме о равенстве отрезков касательных, проведённых к окружности из одной точки, $AE = AD = 5$, $CF = CD = 15$ и $BE = BF = x$. По теореме Пифагора

$$BC^2 = AC^2 + AB^2;$$

или $(15 + x)^2 = 20^2 + (5 + x)^2$. Из этого уравнения находим, что $x = 10$. Тогда

$$BC = 25, \quad \sin \angle ABC = \frac{AC}{BC} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}.$$

Следовательно,

$$S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2} BE \cdot BF \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \frac{4}{5} = 40.$$

Ответ: 40.

2. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH . Из точки H на катеты опустили перпендикуляры HK и HE .
- Докажите, что точки A, B, K и E лежат на одной окружности.
 - Найдите радиус этой окружности, если $AB = 12$, $CH = 5$.

Решение.

а) Пусть точка E лежит на катете BC , а точка K — на катете AC (см. рисунок). Проведём отрезок KE и заметим, что он является гипотенузой прямоугольного треугольника KCE , подобного треугольнику BCA .

Рассмотрим углы четырёхугольника $ABEK$. Пусть $\angle ABE = \alpha$, тогда

$$\angle BEK = \angle BEN + \angle HEK = 90^\circ + \alpha,$$

а $\angle KAB = 90^\circ - \alpha$.



Значит,

$$\angle BEK + \angle KAB = 90^\circ + \alpha + 90^\circ - \alpha = 180^\circ.$$

Сумма двух противоположных углов в четырёхугольнике 180° , следовательно, четырёхугольник вписан в окружность.

б) Радиус окружности, проходящей через точки A, B и E , по теореме синусов равен

$$\frac{AB}{2 \sin \angle BEA} = \frac{AE}{2 \sin \angle ABC}.$$



Четырёхугольник $СКНЕ$ является прямоугольником, значит, треугольники $НЕС$ и $КСЕ$ равны. Из подобия треугольников $ВСА$ и $КСЕ$ получаем, что $\frac{CE}{CH} = \frac{AC}{AB}$, откуда $CE = \frac{CH \cdot AC}{AB}$.

Тогда

$$AE = \sqrt{CE^2 + AC^2} = AC \cdot \sqrt{\frac{CH^2 + AB^2}{AB^2}} = \frac{AC}{AB} \cdot \sqrt{CH^2 + AB^2}.$$

Поэтому $\sin \angle AEC = \frac{AC}{AE} = \frac{AB}{\sqrt{CH^2 + AB^2}}$.

Следовательно, искомый радиус равен

$$AB : \frac{2AB}{\sqrt{CH^2 + AB^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{CH^2 + AB^2} = \frac{13}{2}.$$

Ответ: 6,5.

3. Биссектриса угла ADC параллелограмма $ABCD$ пересекает прямую AB в точке E . В треугольнике ADE вписана окружность, касающаяся стороны AE в точке K и стороны AD в точке T .
- Докажите, что прямые KT и DE параллельны.
 - Найдите угол BAD , если известно, что $AD = 6$ и $KT = 3$.

Решение.

а) Прямые AE и CD параллельны (см. рисунок), а DE — биссектриса угла ADC , поэтому $\angle AED = \angle CDE = \angle ADE$. Значит, треугольник ADE равнобедренный, $AD = AE$. Отрезки AK и AT касательных, проведённых к окружности из точки A , равны, значит, треугольник ATK также равнобедренный.

Угол при вершине A у треугольников ATK и ADE общий, поэтому они подобны, а значит, $\angle ATK = \angle ADE$. Следовательно, $KT \parallel DE$.

б) Пусть окружность касается основания DE равнобедренного треугольника ADE в точке M . Тогда M — середина DE . Пусть $DM = x$. Тогда $DT = DM = x$, $AT = AD - DT = 6 - x$. Треугольник ATK подобен треугольнику ADE , поэтому

$$\frac{AT}{AD} = \frac{TK}{DE}, \quad \frac{6-x}{6} = \frac{3}{2x},$$

откуда $x = 3$.

Получаем, что $DE = 2x = 6$, значит, треугольник ADE равносторонний. Следовательно, $\angle BAD = 60^\circ$.



Ответ: 60° .

4. Сторона CD прямоугольника $ABCD$ касается некоторой окружности в точке M . Продолжение стороны AD пересекает окружность в точках P и Q , причём точка P лежит между точками D и Q . Прямая BC касается окружности, а точка Q лежит на прямой BM .
- Докажите, что $\angle DMP = \angle CBM$.
 - Известно, что $CM = 5$ и $CD = 8$. Найдите сторону AD .

Решение.

а) Поскольку DMP — угол между касательной MD и хордой MP , а MQP — угол, вписанный в окружность, то $\angle DMP = \angle MQP = \angle MQD$.

Поскольку $\angle MQD = \angle CBM$ как накрест лежащие углы при пересечении двух параллельных прямых третьей, получаем, что $\angle DMP = \angle CBM$.



б) Пусть окружность с центром O касается прямой BC в точке E (см. рисунок), а H — основание перпендикуляра, опущенного из точки O на PQ . Тогда H — середина хорды PQ . Так как $CEOM$ — квадрат, $OE = CM$. Из прямоугольного треугольника OHQ находим, что

$$HQ = \sqrt{OQ^2 - OH^2} = \sqrt{OE^2 - DM^2} = \sqrt{5^2 - (8 - 5)^2} = \sqrt{25 - 9} = 4.$$

Поскольку $OE \perp PQ$, точки O, E и H лежат на одной прямой, $CDHE$ — прямоугольник, а так как $CE = CM = 5$, получаем:

$$DQ = DH + HQ = CE + HQ = CM + HQ = 5 + 4 = 9.$$

Треугольник BCM подобен треугольнику QDM с коэффициентом $\frac{CM}{DM} = \frac{5}{3}$, следовательно,

$$AD = BC = \frac{5}{3}DQ = \frac{5}{3} \cdot 9 = 15.$$

Ответ: 15.

5. В параллелограмм вписана окружность.

а) Докажите, что этот параллелограмм — ромб.

б) Эта окружность, касающаяся стороны ромба, делит её на отрезки, равные 4 и 1. Найдите площадь четырёхугольника с вершинами в точках касания окружности со сторонами ромба.

Решение.

а) Пусть $ABCD$ — данный параллелограмм.

Если в четырёхугольник можно вписать окружность, то суммы его противоположных сторон равны, поэтому $AB + CD = AD + BC$, а т. к. противоположные стороны параллелограмма попарно равны, то $2AB = 2BC$, или $AB = BC$. Значит, все стороны четырёхугольника $ABCD$ равны. Следовательно, это ромб.

б) Пусть K, L, M и N — точки касания окружности радиуса R со сторонами соответственно AB, BC, CD и AD ромба (см. рисунок), O — точка пересечения диагоналей ромба, $AK = 4, BK = 1$. Диагонали ромба перпендикулярны, значит, $\angle AOB = 90^\circ$.

Отрезок $OK = R$ — высота прямоугольного треугольника AOB , проведённая из вершины прямого угла, поэтому

$$R^2 = AK \cdot BK = 4 \cdot 1 = 4,$$

откуда $R = 2$.


Пусть $\angle BAD = \alpha$. Поскольку $AK > KB$, $\alpha < 90^\circ$. Пусть BH — высота ромба, опущенная на сторону AD . Тогда

$$KM = LN = BH = 2R = 4; \quad \sin \alpha = \sin \angle BAD = \sin \angle BAH = \frac{BH}{AB} = \frac{4}{5}.$$

Угол между диагоналями KM и LN четырёхугольника $KLMN$ равен углу BAD (углы соответственно перпендикулярными сторонами). По формуле площади четырёхугольника получаем:

$$S_{KLMN} = \frac{1}{2}KM \cdot LN \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{4}{5} = \frac{32}{5} = 6,4.$$

Ответ: 6,4.



6. Около остроугольного треугольника ABC описана окружность с центром O . На продолжении отрезка AO за точку O отмечена точка K так, что $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$.

а) Докажите, что четырёхугольник $OBKC$ вписанный.

б) Найдите радиус окружности, описанной около четырёхугольника $OBKC$, если $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$, а $BC = 48$.

Решение.

а) Пусть $\angle BAC = \alpha$, тогда $\angle OKC = \angle AKC = 90^\circ - \alpha$ и $\angle BOC = 2\angle BAC = 2\alpha$. Треугольник BOC равнобедренный, следовательно,

$$\angle OBC = \angle OCB = \frac{180^\circ - 2\alpha}{2} = 90^\circ - \alpha; \quad \angle OBC = \angle OKC.$$

Получаем, что точки O, B, K и C лежат на одной окружности. Следовательно, четырёхугольник вписанный.


б) По условию $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$, поэтому $\sin \angle BAC = \frac{4}{5}$. Радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен

$$OC = \frac{BC}{2 \sin \angle BAC} = \frac{48}{2 \cdot \frac{4}{5}} = 30.$$

Пусть R — радиус окружности, описанной около четырёхугольника $OBKC$. В треугольнике OCK имеем:

$$R = \frac{OC}{2 \sin \angle OKC} = \frac{OC}{2 \sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{OC}{2 \cos \alpha} = \frac{30}{2 \cdot \frac{3}{5}} = 25.$$

Ответ: 25.



7. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .

а) Докажите, что $\angle BB_1C_1 = \angle BAN$.

б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC , до стороны BC , если $B_1C_1 = 10\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 60^\circ$.

Решение.

а) В четырёхугольнике AC_1HB_1 углы C_1 и B_1 — прямые, следовательно, около этого четырёхугольника можно описать окружность, причём AH — её диаметр. Вписанные углы HB_1C_1 и HAC_1 опираются на одну дугу, следовательно, они равны, а значит, $\angle BB_1C_1 = \angle BAN$.

б) В прямоугольном треугольнике BB_1A имеем:

$$AB_1 = AB \cdot \cos \angle BAB_1 = AB \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} AB.$$


В прямоугольном треугольнике CC_1A имеем:

$$AC_1 = AC \cdot \cos \angle CAC_1 = AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} AC.$$

Получаем, что $\frac{AB}{AB_1} = \frac{AC}{AC_1}$.

Треугольники ABC и AB_1C_1 имеют общий угол A и $\frac{AB}{AB_1} = \frac{AC}{AC_1}$, следовательно, они подобны. Тогда $\frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{AC_1} = 2$. Значит,

$$BC = 2B_1C_1 = 20\sqrt{3}.$$



Пусть O — центр окружности, описанной около треугольника ABC , M — середина стороны BC . Тогда расстояние от точки O до стороны BC равно длине отрезка OM . Треугольник BOC — равнобедренный, следовательно,

$$\angle COM = \frac{1}{2} \angle BOC = \angle BAC = 60^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике OMC имеем:

$$OM = MC \cdot \operatorname{ctg} \angle MOC = \frac{BC}{2} \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{20\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 10.$$

Ответ: 10.

8. Одна окружность вписана в прямоугольную трапецию, а вторая касается большей боковой стороны и продолжений оснований.

а) Докажите, что расстояние между центрами окружностей равно большей боковой стороне трапеции.

б) Найдите расстояние от вершины одного из прямых углов трапеции до центра второй окружности, если точка касания первой окружности с большей боковой стороной трапеции делит её на отрезки, равные 2 и 8.

Решение.

а) Пусть O — центр окружности, вписанной в прямоугольную трапецию $ABCD$ с основаниями AD и BC , O_1 — центр окружности, касающейся большей боковой стороны и продолжений оснований трапеции (рис. 1).

Точка O лежит на биссектрисах углов BCD и ADC , следовательно,

$$\angle COD = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle BCD - \frac{1}{2} \angle ADC = 90^\circ.$$

Точка O_1 лежит на биссектрисе угла, смежного с углом BCD , значит, $\angle OCO_1 = 90^\circ$. Аналогично, углы CO_1D и ODO_1 — прямые.

Значит, OCO_1D — прямоугольник, поэтому

$$CD = OO_1.$$

б) Пусть окружность, вписанная в трапецию $ABCD$, касается стороны AD в точке P , а стороны CD — в точке M , вторая окружность касается прямой AD в точке Q (рис. 2).

Радиусы окружностей OP и O_1Q равны половине расстояния между параллельными прямыми AD и BC . Получаем, что OO_1QP — прямоугольник, следовательно, $OO_1 = PQ$.

В прямоугольном треугольнике COD имеем:

$$OM = \sqrt{CM \cdot MD} = 4.$$

$$AQ = AP + PQ = OP + OO_1 = OM + CD = 14.$$

В прямоугольном треугольнике AQO_1 имеем:

$$AO_1 = \sqrt{AQ^2 + QO_1^2} = 2\sqrt{53}.$$

Расстояние от вершины прямого угла трапеции до центра второй окружности равно

$$BO_1 = AO_1 = 2\sqrt{53}.$$

Ответ: б) $2\sqrt{53}$.




Рис. 1




Рис. 2

Задания для самостоятельного решения

1. В треугольник ABC вписана окружность радиуса R , касающаяся стороны AC в точке D , причём $AD = R$.
 - а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
 - б) Вписанная окружность касается сторон AB и BC в точках E и F . Найдите площадь треугольника BEF , если известно, что $R = 2$ и $CD = 10$.
2. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH . Из точки H на катеты опустили перпендикуляры HK и HE .
 - а) Докажите, что точки A, B, K и E лежат на одной окружности.
 - б) Найдите радиус этой окружности, если $AB = 24$, $CH = 7$.
3. Биссектриса угла ADC параллелограмма $ABCD$ пересекает прямую AB в точке E . В треугольнике ADE вписана окружность, касающаяся стороны AE в точке K и стороны AD в точке T .
 - а) Докажите, что прямые KT и DE параллельны.
 - б) Найдите угол BAD , если известно, что сторона $AD = 8$ и $KT = 4$.
4. Сторона CD прямоугольника $ABCD$ касается некоторой окружности в точке M . Продолжение стороны AD последовательно пересекает окружность в точках P и Q , прямая BC касается окружности, а точка Q лежит на прямой BM .
 - а) Докажите, что $\angle DMP = \angle CBM$.
 - б) Известно, что $CM = 13$ и $CD = 18$. Найдите сторону AD .
5. В параллелограмм вписана окружность.
 - а) Докажите, что этот параллелограмм — ромб.
 - б) Эта окружность, касающаяся стороны ромба, делит её на отрезки, равные 5 и 1. Найдите площадь четырёхугольника с вершинами в точках касания окружности со сторонами ромба.
6. Около остроугольного треугольника ABC описана окружность с центром O . На продолжении отрезка AO за точку O отмечена точка K так, что $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$.
 - а) Докажите, что четырёхугольник $OBKC$ вписанный.
 - б) Найдите радиус окружности, описанной около четырёхугольника $OBKC$, если $\cos \angle BAC = \frac{4}{5}$, а $BC = 96$.
7. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .
 - а) Докажите, что $\angle BB_1C_1 = \angle BAH$.
 - б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC , до стороны BC , если $B_1C_1 = 9\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 30^\circ$.
8. Одна окружность вписана в прямоугольную трапецию, а вторая касается большей боковой стороны и продолжений оснований.
 - а) Докажите, что расстояние между центрами окружностей равно большей боковой стороне трапеции.
 - б) Найдите расстояние от вершины одного из прямых углов трапеции до центра второй окружности, если точка касания первой окружности с большей боковой стороной трапеции делит её на отрезки, равные 4 и 36.

5.2. Планиметрические задачи (одна конфигурация без окружности)

1. На диагонали параллелограмма взяли точку, отличную от её середины. Из неё на все стороны параллелограмма (или их продолжения) опустили перпендикуляры.

а) Докажите, что четырёхугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией.

б) Найдите площадь полученной трапеции, если площадь параллелограмма равна 16, а один из его углов равен 60° .

Решение.

а) Возьмём на диагонали AC параллелограмма $ABCD$ точку O , отличную от её середины, и проведём через неё перпендикуляры NL и KM к сторонам параллелограмма (см. рисунок). Прямоугольные треугольники CKO и AMO подобны. Точно так же подобны треугольники CNO и ALO , откуда

$$OK:OM = OC:OA = ON:OL.$$

Отсюда следует подобие треугольников ONK и OLM . Тогда накрест лежащие углы OML и OKN равны, а поэтому прямые NK и ML параллельны. Следовательно, четырёхугольник $KLMN$ — параллелограмм или трапеция.

Докажем, что это трапеция. Если $KLMN$ — параллелограмм, то $ON = OL$. В этом случае $OC = OA$, то есть O — середина AC . Противоречие. Значит, $KLMN$ — трапеция.

б) Пусть S — площадь параллелограмма, а его острый угол — α . Угол между диагоналями NL и KM трапеции $KLMN$ равен углу между перпендикулярными им прямыми BC и CD , то есть этот угол равен α . Поэтому площадь трапеции равна:

$$\frac{1}{2} \cdot NL \cdot KM \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{S}{AD} \cdot \frac{S}{AB} \cdot \sin \alpha = \frac{S \cdot AD \cdot AB \cdot \sin^2 \alpha}{2 \cdot AD \cdot AB} = \frac{S \sin^2 \alpha}{2}.$$

Подставляя $\alpha = 60^\circ$ и $S = 16$, получаем, что площадь трапеции равна

$$\frac{16 \sin^2 60^\circ}{2} = \frac{16 \cdot 3}{8} = 6.$$

Ответ: 6.

2. Дан четырёхугольник $ABCD$.

а) Докажите, что отрезки LN и KM , соединяющие середины его противоположных сторон, делят друг друга пополам.

б) Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$, если $LM = 3\sqrt{3}$, $KM = 6\sqrt{3}$, $\angle KML = 60^\circ$.

Решение.



а) Пусть K, L, M и N — середины сторон соответственно AB, BC, CD и AD четырёхугольника $ABCD$ (см. рисунок). Тогда KL и MN — средние линии треугольников ABC и ADC соответственно. Значит, $KL = \frac{1}{2}AC = MN$ и $KL \parallel AC \parallel MN$, поэтому $KLMN$ — параллелограмм. Его диагонали KM и LN делят друг друга пополам.

б) В треугольнике KLM имеем:

$$KL^2 = KM^2 + ML^2 - 2KM \cdot ML \cdot \cos 60^\circ = 81.$$

Получаем, что $KM^2 = KL^2 + LM^2$, поэтому треугольник KLM прямоугольный с прямым углом при вершине L . Значит, $KLMN$ — прямоугольник, поэтому

$$S_{KLMN} = KL \cdot LM = 9 \cdot 3\sqrt{3} = 27\sqrt{3}.$$



Пусть искомая площадь четырёхугольника $ABCD$ равна S . Поскольку KL — средняя линия треугольника ABC , то $S_{\Delta KBL} = \frac{1}{4}S_{\Delta ABC}$. Аналогично $S_{\Delta MDN} = \frac{1}{4}S_{\Delta ADC}$. Значит,

$$S_{\Delta KBL} + S_{\Delta MDN} = \frac{1}{4}S_{\Delta ABC} + \frac{1}{4}S_{\Delta ADC} = \frac{1}{4}(S_{\Delta ABC} + S_{\Delta ADC}) = \frac{1}{4}S.$$

Аналогично $S_{\Delta CML} + S_{\Delta AKN} = \frac{1}{4}S$. Поэтому

$$S_{KLMN} = S - \frac{1}{4}S - \frac{1}{4}S = \frac{1}{2}S.$$

Следовательно, $S = 2S_{KLMN} = 2 \cdot 27\sqrt{3} = 54\sqrt{3}$.

Ответ: $54\sqrt{3}$.

3. На отрезке BD взята точка C . Биссектриса BL равнобедренного треугольника ABC с основанием BC является боковой стороной равнобедренного треугольника BLD с основанием BD .

а) Докажите, что треугольник DCL равнобедренный.

б) Известно, что $\cos \angle ABC = \frac{1}{3}$. В каком отношении прямая DL делит сторону AB ?

Решение.

а) Пусть $\angle ABL = \angle CBL = \alpha$. Тогда

$$\angle ACB = \angle ABC = 2\alpha; \quad \angle BDL = \angle DBL = \alpha.$$

Угол ACB — внешний угол треугольника DCL , значит,

$$\angle DLC = \angle ACB - \angle CDL = 2\alpha - \alpha = \alpha.$$

Получаем, что $\angle DLC = \angle CDL$, следовательно, треугольник DCL равнобедренный.

б) Пусть AH — высота равнобедренного треугольника ABC (см. рисунок). Тогда H — середина BC . Биссектриса треугольника делит его сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам, поэтому $\frac{CL}{AL} = \frac{BC}{AB}$.

Из прямоугольного треугольника ABH имеем:

$$\frac{BH}{AB} = \cos \angle ABC = \cos 2\alpha = \frac{1}{3},$$

значит, $\frac{CL}{AL} = \frac{BC}{AB} = \frac{2BH}{AB} = \frac{2}{3}$, откуда $AL = \frac{3}{5}AC = \frac{3}{5}AB$.

Пусть прямая DL пересекает сторону AB в точке M . Тогда


$$\angle AML = 180^\circ - \angle MAL - \angle ALM = 180^\circ - (180^\circ - 4\alpha) - \alpha = 3\alpha.$$

Применив теорему синусов к треугольнику AML , получим, что $\frac{AM}{\sin \alpha} = \frac{AL}{\sin 3\alpha}$, откуда

$$\begin{aligned} AM &= \frac{AL \sin \alpha}{\sin 3\alpha} = \frac{AL \sin \alpha}{\sin(\alpha + 2\alpha)} = \frac{AL \sin \alpha}{\sin \alpha \cos 2\alpha + \cos \alpha \sin 2\alpha} = \\ &= \frac{AL \sin \alpha}{\sin \alpha (\cos 2\alpha + 2\cos^2 \alpha)} = \frac{AL}{\cos 2\alpha + 1 + \cos 2\alpha} = \frac{AL}{2\cos 2\alpha + 1} = \\ &= \frac{3}{5}AL = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}AB = \frac{9}{25}AB. \end{aligned}$$

Значит, $MB = AB - AM = \frac{16}{25}AB$. Следовательно, $\frac{AM}{MB} = \frac{9}{16}$.

Ответ: 9:16.



4. На сторонах AD и BC параллелограмма $ABCD$ взяты соответственно точки M и N , причём M — середина AD , а $BN:NC = 1:3$.

а) Докажите, что прямые AN и AC делят отрезок BM на три равные части.

б) Найдите площадь четырёхугольника, вершины которого находятся в точках C , N и точках пересечения прямой BM с прямыми AN и AC , если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

Решение.

а) Обозначим точки пересечения прямой BM с прямыми AN и AC буквами P и R соответственно.

Пусть O — точка пересечения диагоналей параллелограмма (см. рисунок). Тогда AO и BM — медианы треугольника ABD , значит, $MR = \frac{1}{3}BM$.

Треугольники BPN и MPA подобны. Следовательно, находим, что

$$\frac{BP}{PM} = \frac{BN}{AM} = \frac{1}{2}.$$

Значит, $BP = \frac{1}{3}BM$.

Получаем, что $BP = PR = RM$.

б) Пусть площадь параллелограмма равна S . Из подобия треугольников MRA и BRC с коэффициентом $\frac{1}{2}$ следует, что высота треугольника BRC , проведённая к стороне BC , составляет $\frac{2}{3}$ высоты параллелограмма, проведённой к той же стороне. Следовательно, площадь треугольника BRC равна

$$S_{BRC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot S = \frac{S}{3}.$$

Аналогично найдём площадь треугольника BNP . Его высота, проведённая к BN , составляет $\frac{1}{3}$ высоты параллелограмма, проведённой к стороне BC , а сама сторона BN в четыре раза меньше стороны параллелограмма BC .

Поэтому

$$S_{BNP} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} S = \frac{1}{24} S.$$

Следовательно, площадь четырёхугольника $PRCN$ равна

$$S_{BRC} - S_{BNP} = \frac{1}{3} S - \frac{1}{24} S = \frac{7}{24} S = \frac{7}{24} \cdot 48 = 14.$$

Ответ: 14.

5. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .

а) Докажите, что $\angle ANB_1 = \angle ACB$.

б) Найдите BC , если $AH = 8\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 60^\circ$.



Решение.

а) В четырёхугольнике AC_1NB_1 углы C_1 и B_1 — прямые, следовательно, около этого четырёхугольника можно описать окружность, причём AH — её диаметр. Вписанные углы AC_1B_1 и AHB_1 опираются на одну дугу, следовательно, $\angle ANB_1 = \angle AC_1B_1$.

Углы BC_1C и BB_1C прямые, значит, точки B , C , B_1 и C_1 лежат на окружности с диаметром BC . Следовательно,

$$\angle AC_1B_1 = 180^\circ - \angle BC_1B_1 = \angle BCB_1.$$

Получаем, что $\angle ACB = \angle ANB_1$.



б) В треугольнике AB_1C_1 диаметр описанной окружности $AH = 8\sqrt{3}$, откуда

$$B_1C_1 = AH \cdot \sin \angle BAC = AH \cdot \sin 60^\circ = 12.$$

В прямоугольном треугольнике BB_1A имеем:

$$AB_1 = AB \cdot \cos \angle BAB_1 = AB \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}AB.$$

В прямоугольном треугольнике CC_1A имеем:

$$AC_1 = AC \cdot \cos \angle CAC_1 = AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}AC.$$

Получаем, что $\frac{AB}{AB_1} = \frac{AC}{AC_1}$.

Треугольники ABC и AB_1C_1 имеют общий угол A и $\frac{AB}{AB_1} = \frac{AC}{AC_1}$, следовательно, они подобны. Тогда $\frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{AC_1} = 2$. Значит,

$$BC = 2B_1C_1 = 24.$$

Ответ: 24.

6. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту BH . Из точки H на стороны AB и BC опустили перпендикуляры HK и HM соответственно.

а) Докажите, что треугольник MBK подобен треугольнику ABC .

б) Найдите отношение площади треугольника MBK к площади четырёхугольника $AKMC$, если $BH = 3$, а радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен 4.

Решение.

а) В четырёхугольнике $KBMH$ углы K и M — прямые, следовательно, около этого четырёхугольника можно описать окружность, причём BH — её диаметр. Вписанные углы BKM и BHM опираются на одну дугу, следовательно,

$$\angle BKM = \angle BHM = 90^\circ - \angle HBM = \angle BCA.$$

Треугольники MBK и ABC имеют общий угол B и $\angle BKM = \angle BCA$. Значит, эти треугольники подобны.


б) Радиус окружности, описанной около треугольника MBK , равен $\frac{1}{2}BH = \frac{3}{2}$. Радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен 4. Значит, треугольники MBK и ABC подобны с коэффициентом подобия $\frac{3}{8}$. Получаем, что

$$\frac{S_{MBK}}{S_{ABC}} = \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}.$$

Следовательно, искомое отношение равно

$$\frac{S_{MBK}}{S_{AKMC}} = \frac{S_{MBK}}{S_{ABC} - S_{MBK}} = \frac{\frac{S_{MBK}}{S_{ABC}}}{1 - \frac{S_{MBK}}{S_{ABC}}} = \frac{\frac{9}{64}}{1 - \frac{9}{64}} = \frac{9}{55}.$$

Ответ: $\frac{9}{55}$.



Задания для самостоятельного решения

1. На диагонали параллелограмма взяли точку, отличную от её середины. Из неё на все стороны параллелограмма (или их продолжения) опустили перпендикуляры.
 - а) Докажите, что четырёхугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией.
 - б) Найдите площадь полученной трапеции, если площадь параллелограмма равна 24, а один из его углов равен 45° .
2. Дан четырёхугольник $ABCD$.
 - а) Докажите, что отрезки LN и KM , соединяющие середины его противоположных сторон, делят друг друга пополам.
 - б) Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$, если $KL = 6$, $KM = 4\sqrt{3}$, $\angle MKL = 30^\circ$.
3. На отрезке BD взята точка C . Биссектриса BL равнобедренного треугольника ABC с основанием BC является боковой стороной равнобедренного треугольника BLD с основанием BD .
 - а) Докажите, что треугольник DCL равнобедренный.
 - б) Известно, что $\cos \angle ABC = \frac{2}{3}$. В каком отношении прямая DL делит сторону AB ?
4. Точка M — середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Из вершины A проведены два луча, которые разбивают отрезок BM на три равные части.
 - а) Докажите, что один из лучей содержит диагональ параллелограмма.
 - б) Найдите площадь четырёхугольника, ограниченного двумя проведёнными лучами и прямыми BD и BC , если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 40.
5. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .
 - а) Докажите, что $\angle AHB_1 = \angle ACB$.
 - б) Найдите BC , если $AH = 10\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 30^\circ$.
6. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту BH . Из точки H на стороны AB и BC опустили перпендикуляры NK и NM соответственно.
 - а) Докажите, что треугольник MBK подобен треугольнику ABC .
 - б) Найдите отношение площади треугольника MBK к площади четырёхугольника $AKMC$, если $BH = 2$, а радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен 3.

5.3. Планиметрические задачи (две конфигурации)

1. В треугольнике ABC известны стороны: $AB = 7$, $BC = 9$, $AC = 10$. Окружность, проходящая через точки A и C , пересекает прямые AB и BC соответственно в точках K и L , отличных от вершин треугольника. Отрезок KL касается окружности, вписанной в треугольник ABC . Найдите длину отрезка KL .

Решение.

Обе точки K и L не могут лежать вне треугольника, поскольку в этом случае отрезок KL не может касаться вписанной окружности. Значит, по крайней мере одна из этих точек лежит на стороне треугольника.

Пусть обе точки K и L лежат на сторонах треугольника (рис. 1). Четырёхугольник $AKLC$ — вписанный, следовательно,

$$\angle KAC = 180^\circ - \angle KLC = \angle BLK.$$

Значит, треугольник ABC подобен треугольнику LBK , так как угол ABC — общий. Пусть коэффициент подобия равен k , тогда $BL = kAB$, $BK = kBC$, $KL = kAC$. Суммы противоположных сторон описанного четырёхугольника $AKLC$ равны:

$$AK + LC = KL + AC;$$

$$AB(1 - k) + BC(1 - k) = AC(1 + k);$$

$$k = \frac{AB + BC - AC}{AC + AB + BC}.$$

Подставляя известные значения сторон, находим $k = \frac{7 + 9 - 10}{7 + 9 + 10} = \frac{3}{13}$. Следовательно, $KL = \frac{3}{13}AC = \frac{30}{13}$.

Пусть точка K лежит на продолжении стороны AB (рис. 2). Углы AKL и ACL равны, поскольку опираются на одну дугу. Значит, треугольник ABC подобен треугольнику LBK , так как угол ABC — общий. Более того, они описаны около одной и той же окружности. Следовательно, коэффициент подобия равен 1, то есть треугольники LBK и ABC равны, поэтому $KL = AC = 10$. Заметим, что $BK = BC > AB$ и точка K действительно лежит на продолжении стороны AB .

Если точка L лежит на продолжении стороны BC , то $BL > BC$, но аналогично предыдущему случаю получаем $BL = AB < BC$. Значит, этот случай не достигается.

Ответ: $\frac{30}{13}$ или 10.

2. Дан треугольник со сторонами 26, 26 и 20. Внутри него расположены две равные касающиеся окружности, каждая из которых касается двух сторон треугольника. Найдите радиусы окружностей.

Решение.

Рассмотрим равнобедренный треугольник ABC , в котором $AB = AC = 26$, $BC = 20$. Пусть AH — высота треугольника ABC . Тогда H — середина BC .

Обозначим $\angle ABC = \angle ACB = \alpha$. Тогда

$$\cos \alpha = \frac{BH}{AB} = \frac{5}{13}, \quad \sin \alpha = \frac{12}{13}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}.$$




Рис. 1




Рис. 2

Предположим, что окружность радиуса r с центром O_1 вписана в угол ACB и касается основания BC в точке N , а окружность того же радиуса с центром O_2 вписана в угол ABC , касается основания BC в точке M , а первой окружности — в точке D (рис. 1).

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе, поэтому

$$\angle O_2BM = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2}{3}.$$

Из прямоугольного треугольника $BM O_2$ находим:

$$BM = O_2M \cdot \operatorname{ctg} \angle MBO_2 = r \cdot \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2}r.$$

$$\text{Аналогично, } CN = BM = \frac{3}{2}r.$$

Линия центров касающихся окружностей проходит через точку их касания, поэтому $O_1O_2 = 2r$, значит, $MN = O_1O_2 = 2r$, поскольку O_1O_2MN — прямоугольник. Следовательно,

$$20 = BC = BM + MN + CN = \frac{3}{2}r + 2r + \frac{3}{2}r = 5r,$$

откуда находим $r = 4$.

Пусть теперь окружность радиуса r с центром O_1 вписана в угол BAC и касается боковой стороны AB в точке P , вторая окружность радиуса r с центром O_2 вписана в угол ABC , касается боковой стороны AB в точке Q , а также касается первой окружности (рис. 2).

Из прямоугольных треугольников $AP O_1$ и $BQ O_2$ находим:

$$AP = O_1P \cdot \operatorname{ctg} \angle PAO_1 = r \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}r,$$

$$BQ = O_2Q \cdot \operatorname{ctg} \angle QBO_2 = r \cdot \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2}r.$$

Следовательно, аналогично предыдущему случаю,

$$26 = AB = AP + PQ + QB = AP + O_1O_2 + QB = \frac{12}{5}r + 2r + \frac{3}{2}r = \frac{59}{10}r,$$

откуда находим $r = \frac{260}{59}$.

В случае, когда окружности вписаны в углы BAC и ACB , получим тот же результат.

Ответ: 4 или $\frac{260}{59}$.

3. Боковые стороны KL и MN трапеции $KLMN$ равны 8 и 17 соответственно. Отрезок, соединяющий середины диагоналей, равен 7,5, средняя линия трапеции равна 17,5. Прямые KL и MN пересекаются в точке A . Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ALM .

Решение.

В любой трапеции отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, равен полуразности оснований трапеции, а средняя линия — полусумме оснований трапеции. В нашем случае полуразность оснований равна 7,5, а полусумма оснований равна 17,5, поэтому основания трапеции равны 10 и 25.




Рис. 1




Рис. 2

Предположим, что $LM = 25$, $KN = 10$ (рис. 1). Стороны LM и KN треугольников ALM и AKN параллельны, поэтому эти треугольники подобны с коэффициентом $k = \frac{2}{5}$. Значит,

$$AL = \frac{KL}{1-k} = \frac{40}{3}, \quad AM = \frac{MN}{1-k} = \frac{85}{3}.$$

Заметим, что $AL^2 + LM^2 = AM^2$, поэтому треугольник ALM — прямоугольный с гипотенузой AM . Радиус его вписанной окружности равен:

$$r = \frac{AL + LM - AM}{2} = 5.$$

Пусть теперь $KN = 25$, $LM = 10$ (рис. 2). Аналогично предыдущему случаю можно показать, что радиус вписанной окружности треугольника AKN равен 5. Треугольники AKN и ALM подобны с коэффициентом $k = \frac{2}{5}$. Значит, радиус вписанной окружности треугольника ALM равен $r = 5k = 2$.

Ответ: 2 или 5.




Рис. 1




Рис. 2

4. На прямой, содержащей биссектрису AD прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C , взята точка E , удалённая от вершины A на расстояние, равное $\sqrt{26}$. Найдите площадь треугольника BCE , если $BC = 5$, $AC = 12$.

Решение.

По теореме Пифагора $AB = 13$.

Пусть точка E лежит на луче AD . Биссектриса AD длиннее катета AC , $AE < AC$, поэтому AD длиннее AE и точка E лежит внутри треугольника ABC (рис. 1).

Опустим из точки E перпендикуляр EF на прямую AC и рассмотрим подобные прямоугольные треугольники AFE и ACD . Точка D делит BC на отрезки, пропорциональные AB и AC . Поэтому

$$DC = \frac{AC \cdot BC}{AC + AB} = \frac{12}{5};$$

$$AD = \sqrt{AC^2 + DC^2} = \frac{12}{5} \sqrt{26}.$$

Из подобия треугольников AFE и ACD находим:

$$AF = \frac{AE}{AD} \cdot AC = 5.$$

Следовательно, $CF = AC - AF = 7$. Тогда

$$S_{BCE} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot CF = 17,5.$$

Пусть теперь точка A лежит между E и D (рис. 2). В этом случае

$$CF = AC + AF = 17.$$

Тогда $S_{BCE} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot CF = 42,5$.

Ответ: 17,5 или 42,5.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

5. Окружности радиусов 2 и 3 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются в точке A . Прямая, проходящая через точку A , вторично пересекает меньшую окружность в точке B , а большую — в точке C . Найдите площадь треугольника BCO_2 , если $\angle ABO_1 = 30^\circ$.

Решение.

Точки O_1 , O_2 и A лежат на одной прямой. Поскольку треугольники BO_1A и CO_2A равнобедренные,

$$\angle ABO_1 = \angle BAO_1 = \angle CAO_2 = \angle ACO_2 = 30^\circ,$$

откуда $AB = 2O_1A \cdot \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$, $AC = 2O_2A \cdot \cos 30^\circ = 3\sqrt{3}$.

Возможны два случая. Первый случай: окружности касаются внутренним образом (рис. 1), тогда точка B лежит между точками A и C , откуда $BC = AC - AB = \sqrt{3}$.

$$S_{BCO_2} = \frac{BC \cdot CO_2 \cdot \sin \angle BCO_2}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Второй случай: окружности касаются внешним образом (рис. 2), тогда точка A лежит между точками B и C , $BC = AC + AB = 5\sqrt{3}$.

$$S_{BCO_2} = \frac{BC \cdot CO_2 \cdot \sin \angle BCO_2}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}.$$

Ответ: $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ или $\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

6. Окружности радиусов 4 и 13 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются в точке L . Прямая, проходящая через точку L , вторично пересекает меньшую окружность в точке K , а большую — в точке M . Найдите площадь треугольника KMO_1 , если $\angle LMO_2 = 22,5^\circ$.

Решение.

Точки O_1 , O_2 и L лежат на одной прямой. Поскольку треугольники KO_1L и MO_2L равнобедренные,

$$\angle LKO_1 = \angle KLO_1 = \angle MLO_2 = \angle LMO_2 = 22,5^\circ,$$

откуда

$$KL = 2O_1L \cdot \cos 22,5^\circ = 8 \cdot \cos 22,5^\circ,$$

$$LM = 2O_2L \cdot \cos 22,5^\circ = 26 \cdot \cos 22,5^\circ.$$

Возможны два случая. Первый случай: окружности касаются внутренним образом (рис. 1), тогда точка K лежит между точками L и M , откуда $MK = LM - KL = 18 \cdot \cos 22,5^\circ$.

$$\begin{aligned} S_{KMO_1} &= \frac{MK \cdot KO_1 \cdot \sin \angle MKO_1}{2} = \frac{MK \cdot KO_1 \cdot \sin \angle LKO_1}{2} = \\ &= 36 \cdot \cos 22,5^\circ \cdot \sin 22,5^\circ = 9\sqrt{2}. \end{aligned}$$




Рис. 1

Второй случай: окружности касаются внешним образом (рис. 2), тогда точка L лежит между точками K и M , $MK = LM + KL = 34 \cdot \cos 22,5^\circ$.

$$S_{KMO_1} = \frac{MK \cdot KO_1 \cdot \sin \angle MKO_1}{2} = 68 \cdot \cos 22,5^\circ \cdot \sin 22,5^\circ = 17\sqrt{2}.$$

Ответ: $9\sqrt{2}$ или $17\sqrt{2}$.




Рис. 2

7. Окружности радиусов 13 и 20 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются внешним образом в точке C , AO_1 и BO_2 — параллельные радиусы этих окружностей, причём $\angle AO_1O_2 = 60^\circ$. Найдите AB .

Решение.

Точки O_1 , O_2 и C лежат на одной прямой.

Возможны два случая. Первый случай: точки A и B лежат по одну сторону от прямой O_1O_2 (рис. 1). Отрезок AM параллелен отрезку O_1O_2 (точка M принадлежит радиусу BO_2), следовательно, O_1O_2MA — параллелограмм:

$$AM = O_1O_2 = 33, \quad O_1A = O_2M = 13, \\ \angle O_2MA = \angle AO_1O_2 = 60^\circ.$$

В треугольнике AMB имеем $MB = 7$, $AM = 33$, $\angle AMB = 120^\circ$, откуда

$$AB = \sqrt{AM^2 + MB^2 - 2 \cdot AM \cdot MB \cdot \cos \angle AMB} = 37.$$

Второй случай: точки A и B лежат по разные стороны от прямой O_1O_2 (рис. 2). Отрезок AM параллелен отрезку O_1O_2 (точка M лежит на продолжении радиуса BO_2 за точку O_2), следовательно, O_1O_2MA — параллелограмм:

$$AM = O_1O_2 = 33, \quad O_1A = O_2M = 13, \\ \angle O_2MA = \angle AO_1O_2 = 60^\circ.$$

В треугольнике AMB имеем $MB = 33$, $AM = 33$, $\angle AMB = 60^\circ$, значит, треугольник AMB — правильный, откуда $AB = 33$.

Ответ: 33 или 37.




Рис. 1




Рис. 2

8. Окружности радиусов 13 и 20 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются внутренним образом в точке K , MO_1 и NO_2 — параллельные радиусы этих окружностей, причём $\angle MO_1O_2 = 120^\circ$. Найдите MN .

Решение.

Точки O_1 , O_2 и K лежат на одной прямой.

Возможны два случая. Первый случай: точки M и N лежат по одну сторону от прямой O_1O_2 (рис. 1). Отрезок ML параллелен отрезку O_1O_2 (точка L принадлежит радиусу NO_2), следовательно, O_1O_2LM — параллелограмм:

$$ML = O_1O_2 = 7, \quad O_1M = O_2L = 13, \\ \angle O_2LM = \angle MO_1O_2 = 120^\circ.$$

В треугольнике LMN имеем $LM = 7$, $LN = 7$, $\angle MLN = 60^\circ$, значит, треугольник LMN — правильный, откуда $MN = 7$.




Рис. 1

Второй случай: точки M и N лежат по разные стороны от прямой O_1O_2 (рис. 2). Отрезок ML параллелен отрезку O_1O_2 (точка L лежит на продолжении радиуса NO_2 за точку O_2), следовательно, O_1O_2LM — параллелограмм:

$$ML = O_1O_2 = 7, \quad O_1M = O_2L = 13, \\ \angle O_2LM = \angle MO_1O_2 = 120^\circ.$$

В треугольнике LMN имеем $LM = 7$, $LN = 33$, $\angle MLN = 120^\circ$, откуда

$$MN = \sqrt{LM^2 + LN^2 - 2 \cdot LM \cdot LN \cdot \cos \angle MLN} = 37.$$

Ответ: 7 или 37.




Рис. 2

Задания для самостоятельного решения

1. В треугольнике ABC известны стороны: $AB = 6$, $BC = 7$, $AC = 9$. Окружность, проходящая через точки A и C , пересекает прямые BA и BC соответственно в точках K и L , отличных от вершин треугольника. Отрезок KL касается окружности, вписанной в треугольник ABC . Найдите длину отрезка KL .
2. Дан треугольник со сторонами 20, 20 и 24. Внутри него расположены две равные касающиеся окружности, каждая из которых касается двух сторон треугольника. Найдите радиусы окружностей.
3. Боковые стороны KL и MN трапеции $KLMN$ равны 7 и 25 соответственно. Отрезок, соединяющий середины диагоналей, равен 12, средняя линия трапеции равна 18. Прямые KL и MN пересекаются в точке A . Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ALM .
4. На прямой, содержащей биссектрису AD прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C , взята точка E , удалённая от вершины A на расстояние, равное $\sqrt{17}$. Найдите площадь треугольника BCE , если $BC = 8$, $AC = 15$.
5. Окружности радиусов 5 и 8 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются в точке A . Прямая, проходящая через точку A , вторично пересекает меньшую окружность в точке B , а большую — в точке C . Найдите площадь треугольника BCO_2 , если $\angle ABO_1 = 15^\circ$.
6. Окружности радиусов 9 и 15 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются в точке L . Прямая, проходящая через точку L , вторично пересекает меньшую окружность в точке K , а большую — в точке M . Найдите площадь треугольника KMO_1 , если $\angle LMO_2 = 15^\circ$.
7. Окружности радиусов 13 и 35 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются внешним образом в точке C , AO_1 и BO_2 — параллельные радиусы этих окружностей, причём $\angle AO_1O_2 = 60^\circ$. Найдите AB .
8. Окружности радиусов 1 и 15 с центрами O_1 и O_2 соответственно касаются внутренним образом в точке K , MO_1 и NO_2 — параллельные радиусы этих окружностей, причём $\angle MO_1O_2 = 120^\circ$. Найдите MN .

6. АРИФМЕТИКА И АЛГЕБРА

1. В числе 86957205 вычеркнули три цифры так, что получившееся число делится на 60.

а) Приведите пример какого-нибудь одного получившегося числа.

б) Укажите все возможные получившиеся числа и докажите, что других таких чисел нет.

Решение.

а) Например, 69720.

б) Получившееся число должно делиться на 10. Значит, оно должно заканчиваться на 0, поэтому необходимо вычеркнуть последнюю цифру 5. Заметим, что нельзя вычеркнуть цифру 2, поскольку если её вычеркнуть, то получившееся число будет заканчиваться на 70 или 50 и не будет делиться на 4. Таким образом, число будет заканчиваться на 20, а из оставшихся цифр надо вычеркнуть две так, чтобы получившееся число делилось на 3. Остаток от деления суммы цифр числа 8695720 на 3 равен 1. Значит, надо вычеркнуть две цифры, сумма которых даёт остаток 1 при делении на 3. Такие пары это 8 и 5, 6 и 7, 9 и 7. В результате получаются числа 69720, 89520 и 86520.

Ответ: б) 69720, 89520 и 86520.

2. Трёхзначное число, большее 500, при делении на 6 и на 5 даёт равные ненулевые остатки, а его средняя цифра является средним арифметическим крайних цифр.

а) Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.

б) Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.

Решение.

а) Например, 543.

б) При делении на 6 и 5 число даёт равные ненулевые остатки. Значит, эти остатки могут быть равны только 1, 2, 3 или 4, а число имеет вид $30k + r$, где r — остаток от деления на 30, равный 1, 2, 3 или 4. Заметим, что либо три цифры числа имеют одинаковый остаток при делении на 3, либо остатки от деления цифр на 3 попарно различны, поскольку средняя цифра является средним арифметическим крайних. Значит, число делится на 3, и его последняя цифра равна 3.

Заметим, что первая цифра должна быть нечётной, поскольку её сумма с 3 равна удвоенной средней цифре. Зная первую цифру, мы можем найти среднюю. Получается пять вариантов: 123, 333, 543, 753, 963. Числа 123 и 333 меньше 500, а остальные числа удовлетворяют условиям задачи.

Ответ: б) 543, 753 и 963.

3. Трёхзначное число, большее 800, делится на каждую свою цифру. Все цифры этого числа различны и не равны нулю.

а) Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.

б) Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.

Решение.

а) Например, 824.

б) Первая цифра числа равна 8 или 9. Значит, число должно делиться на 8, если первая цифра равна 8, и должно делиться на 9, если первая цифра равна 9. Такие числа, не содержащие нулей и повторяющихся цифр, следующие: 816, 824, 832, 856, 864, 872, 896, 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972 и 981. При этом числа 856 и 954 не делятся на 5, числа 872, 927 и 972 не делятся на 7, числа 918 и 981 не делятся на 8, числа 896 и 963 не делятся на 6, число 832 не делится на 3, а число 945 не делится на 4.

Таким образом, условию задачи удовлетворяют только числа 816, 824, 864 и 936.

Ответ: б) 816, 824, 864 и 936.

4. Пятизначное число делится на 15, а любые две соседние цифры этого числа отличаются на 2.
- Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
 - Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.

Решение.

- Например, 42 420.
- Число делится на 5, поэтому его последняя цифра это 0 или 5. Далее мы разберём возможности остальных цифр этого числа.
Если последняя цифра — 0, то предпоследняя цифра — 2. В этом случае третья цифра либо 0, либо 4. В случае, если третья цифра — 0, то вторая цифра — 2, а первая — 4. Но число 42 020 не делится на 3. Значит, третья цифра — 4. Тогда вторая цифра — 2 или 6. Среди чисел 42 420, 46 420 и 86 420 только 42 420 делится на 3.

Если последняя цифра — 5, то число может быть равно 13 135, 53 135, 13 535, 53 535, 57 535, 97 535, 13 575, 53 575, 57 575, 97 575, 57 975 или 97 975. Среди этих чисел только 53 535, 13 575, 97 575 и 57 975 делятся на 3 и удовлетворяют условиям задачи.

Ответ: б) 42 420, 53 535, 13 575, 97 575 и 57 975.

5. Сумма цифр чётного пятизначного числа равна их произведению.

- Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
- Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.

Решение.

- Например, 51 112.
- Обозначим цифры числа через a, b, c, d и e . Можно считать, что $a \leq b \leq c \leq d \leq e$. Тогда получаем $abcde = a + b + c + d + e$. Значит, произведение $abcd$ не превосходит 5. Разберём возможные случаи.

Если $abcd = 1$, то $a = b = c = d = 1$. Получаем $e = e + 4$, чего быть не может.

Если $abcd = 2$, то $a = b = c = 1, d = 2$. Получаем $2e = e + 5$. В этом случае $e = 5$. Условию задачи удовлетворяют числа 51 112, 15 112, 11 512 и 11 152.

Если $abcd = 3$, то $a = b = c = 1, d = 3$. Получаем $3e = e + 6$. В этом случае $ee = 3$. Но из этих цифр нельзя составить чётное число.

Если $abcd = 4$, то либо $a = b = c = 1, d = 4$, либо $a = b = 1, c = d = 2$. В первом случае получаем $4e = e + 7$, откуда $e = \frac{7}{3}$. Во втором случае получаем $4e = e + 6$, откуда $e = 2$. Условию задачи удовлетворяют числа 11 222, 12 122, 21 122, 12 212, 21 212 и 22 112.

Если $abcd = 5$, то $a = b = c = 1, d = 5$. Получаем $5e = e + 8$, откуда $e = 2$, что противоречит условию $d \leq e$.

Ответ: б) 51 112, 15 112, 11 512, 11 152, 11 222, 12 122, 21 122, 12 212, 21 212 и 22 112.

6. Каждый из группы учащихся сходил в кино или в театр, при этом возможно, что кто-то из них мог сходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не более $\frac{4}{13}$ от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было не более $\frac{2}{5}$ от общего числа учащихся группы, посетивших кино.

а) Могло ли быть в группе 10 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?

б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?

в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительных условий пунктов а и б?

Решение.

а) Если группа состоит из 4 мальчиков, посетивших только театр, 6 мальчиков, посетивших только кино, и 10 девочек, сходивших и в театр, и в кино, то условие задачи выполнено. Значит, в группе из 20 учащихся могло быть 10 мальчиков.

б) Предположим, что мальчиков было 11 или больше. Тогда девочек было 9 или меньше. Театр посетило не более 4 мальчиков, поскольку если бы их было 5 или больше, то доля мальчиков в театре была бы не меньше $\frac{5}{5+9} = \frac{5}{14}$, что больше $\frac{4}{13}$. Аналогично, кино посетило не более 6 мальчиков, поскольку $\frac{7}{7+9} = \frac{7}{16} > \frac{2}{5}$, но тогда хотя бы один мальчик не посетил ни театра, ни кино, что противоречит условию.

В предыдущем пункте было показано, что в группе из 20 учащихся могло быть 10 мальчиков. Значит, наибольшее количество мальчиков в группе — 10.

в) Предположим, что некоторый мальчик ходил и в театр, и в кино. Если бы вместо него в группе присутствовало два мальчика, один из которых посетил только театр, а другой — только кино, то доля мальчиков и в театре, и в кино осталась бы прежней, а общая доля девочек стала бы меньше. Значит, для оценки наименьшей доли девочек в группе можно считать, что каждый мальчик ходил или только в театр, или только в кино.

Пусть в группе m_1 мальчиков, посетивших театр, m_2 мальчиков, посетивших кино, и d девочек. Оценим долю девочек в этой группе. Будем считать, что все девочки ходили и в театр, и в кино, поскольку их доля в группе от этого не изменится, а доля в театре и в кино не уменьшится.

По условию $\frac{m_1}{m_1+d} \leq \frac{4}{13}$, $\frac{m_2}{m_2+d} \leq \frac{2}{5}$, значит, $\frac{m_1}{d} \leq \frac{4}{9}$, $\frac{m_2}{d} \leq \frac{2}{3}$. Тогда $\frac{m_1+m_2}{d} \leq \frac{10}{9}$, поэтому доля девочек в группе:

$$\frac{d}{m_1+m_2+d} = \frac{1}{\frac{m_1+m_2}{d}+1} \geq \frac{1}{\frac{10}{9}+1} = \frac{9}{19}.$$

Если группа состоит из 4 мальчиков, посетивших только театр, 6 мальчиков, посетивших только кино, и 9 девочек, ходивших и в театр, и в кино, то условие задачи выполнено, а доля девочек в группе равна $\frac{9}{19}$.

Ответ: а) да; б) 10; в) $\frac{9}{19}$.

7. Моток верёвки режут без остатка на куски длиной не меньше 115 см, но не больше 120 см. (назовём такие куски стандартными).

а) Некоторый моток верёвки разрезали на 23 стандартных куска, среди которых есть куски разной длины. На какое наибольшее число одинаковых стандартных кусков можно было бы разрезать тот же моток верёвки?

б) Найдите такое наименьшее число l , что любой моток верёвки, длина которого больше l см, можно разрезать на стандартные куски.

Решение.

Решение каждого пункта состоит из двух частей: оценка и пример.

Рассмотрим моток верёвки длиной x см. Условие того, что его можно разрезать на n стандартных кусков, записывается в виде $115n \leq x \leq 120n$ или $115 \leq \frac{x}{n} \leq 120$.

а) В данном случае имеем $115 \cdot 23 < x < 120 \cdot 23$ (неравенства строгие, поскольку среди кусков есть неравные). Пусть эту верёвку можно разрезать на n стандартных кусков, тогда $115 < \frac{x}{n} \leq 120$. При $n \geq 24$ получаем $\frac{x}{n} \leq \frac{x}{24} < \frac{120 \cdot 23}{24} = 115$, то есть этот моток верёвки нельзя разрезать больше чем на 23 стандартных куска.

При $n = 23$ получаем $115 < \frac{x}{23} < 120$. Значит, эту верёвку можно разрезать на 23 одинаковых стандартных куска, но нельзя разрезать на большее количество стандартных кусков.

б) Отрезки $[115n; 120n]$ и $[115(n+1); 120(n+1)]$, являющиеся решениями неравенств $115n \leq x \leq 120n$ и $115(n+1) \leq x \leq 120(n+1)$, имеют общие точки для всех n , при которых $115(n+1) \leq 120n$, то есть при $n > 23$. Значит, любую верёвку длиной $115 \cdot 23 = 2645$ см или более можно разрезать на стандартные куски.

Докажем, что верёвку, длина которой x см больше $120 \cdot 22 = 2640$ см, но меньше $115 \cdot 23 = 2645$ см, нельзя разрезать на n стандартных кусков ни для какого n . При $n \geq 23$ получаем $x < 115 \cdot 23 \leq 115n$, что противоречит условию $115n \leq x$. При $n \leq 22$ получаем $x > 120 \cdot 22 \geq 120n$, что противоречит условию $x \leq 120n$. Таким образом, искомое число равно 2645.

Ответ: а) 23; б) 2645.

8. Имеется 8 карточек. На них записывают по одному каждое из чисел 1, -2, -3, 4, -5, 7, -8, 9. Карточки переворачивают и перемешивают. На их чистых сторонах заново пишут по одному каждое из чисел 1, -2, -3, 4, -5, 7, -8, 9. После этого числа на каждой карточке складывают, а полученные восемь сумм перемножают.

а) Может ли в результате получиться 0?

б) Может ли в результате получиться 1?

в) Какое наименьшее целое неотрицательное число может в результате получиться?

Решение.

а) Среди восьми данных чисел нет противоположных. Значит, сумма чисел на каждой карточке не равна 0. Поэтому всё произведение не может равняться нулю.

б) Среди восьми данных чисел пять нечётных. Значит, на какой-то карточке попадётся два нечётных числа, и их сумма чётная. Поэтому всё произведение чётно и не может равняться 1.

в) Среди восьми данных чисел пять нечётных. Значит, хотя бы на двух карточках с обеих сторон написаны нечётные числа, и сумма чисел на каждой из этих карточек чётная. Поэтому всё произведение делится на 4.

Наименьшее целое положительное число, делящееся на 4, это 4. Оно получается при следующем наборе пар чисел на карточках: (1; -2), (-2; 1), (-3; 4), (4; -3), (-5; 7), (7; -5), (-8; 9), (9; -8).

Ответ: а) нет; б) нет; в) 4.

9. Максим должен был умножить двузначное число на трёхзначное число (числа с нуля начинаться не могут). Вместо этого он просто приписал трёхзначное число справа к двузначному, получив пятизначное число, которое оказалось в N раз (N — натуральное число) больше правильного результата.

а) Могло ли N равняться 2?

б) Могло ли N равняться 10?

в) Каково наибольшее возможное значение N ?

Решение.

Обозначим двузначное число a , а трёхзначное — b .

а) Для чисел 63 и 504 условие выполняется:

$$63504 = 2 \cdot 63 \cdot 504.$$

б) Пусть $N = 10$. Тогда выполняется равенство $10ab = 1000a + b$, откуда получаем: $1000a = b(10a - 1)$. Числа 1000 и $10a - 1$ не имеют общих делителей, значит, число b должно делиться на 1000, но оно меньше 1000. Полученное противоречие доказывает, что N не может равняться 10.

в) По условию $Nab = 1000a + b$, откуда получаем:

$$N = \frac{1000a + b}{ab} = \frac{1000}{b} + \frac{1}{a} < \frac{1000}{100} + 1 = 11.$$

Поскольку $N \neq 10$ и $N < 11$, получаем, что наибольшее возможное значение N не превосходит 9.

Для чисел 14 и 112 условие выполняется:

$$14112 = 9 \cdot 14 \cdot 112.$$

Таким образом, наибольшее возможное значение N — это 9.

Ответ: а) да; б) нет; в) 9.

10. На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 21 (каждое число поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и меньшего.

а) Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?

б) Могли ли все полученные разности быть не меньше 10?

в) Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k ?

Решение.

а) При любой расстановке разность числа 11 и любого соседнего с ним числа меньше 11. Значит, всегда найдутся хотя бы две разности меньше 11.

б) Например, для расстановки 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, 19, 9, 20, 10, 21, 11 все разности не меньше 10.

в) Оценим значение k . Рассмотрим числа от 1 до 7. Если какие-то два из них стоят рядом или через одно, то найдётся разность меньше 7. Иначе они стоят через два, поскольку всего чисел 21. В этом случае число 8 стоит рядом или через одно с каким-то числом от 2 до 7 и найдётся разность меньше 7.

Таким образом, всегда найдётся разность меньше 7. Все разности могут быть не меньше 6. Например, для расстановки 1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, 7, 14, 21 все разности не меньше 6.

Ответ: а) нет; б) да; в) 6.

11. Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок.

а) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $\frac{1}{30}$?

б) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $\frac{1}{35}$?

в) Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания.

Решение.

Обозначим рейтинг кинофильма, вычисленный по старой системе оценивания, через A , а рейтинг кинофильма, вычисленный по новой системе оценивания, через B .

а) Заметим, что $A = \frac{m}{7}$, $B = \frac{n}{5}$, где m и n — некоторые натуральные числа. Значит, $A - B = \frac{m}{7} - \frac{n}{5} = \frac{5m - 7n}{35}$. Если $A - B = \frac{1}{30}$, то $5m - 7n = \frac{35}{30}$, что невозможно. Таким образом, разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, не может равняться $\frac{1}{30}$.

б) Например, для оценок экспертов 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9 разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равна

$$\frac{0 + 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 9}{7} - \frac{1 + 2 + 4 + 7 + 8}{5} = \frac{31}{7} - \frac{22}{5} = \frac{1}{35}.$$

в) Пусть x — наименьшая из оценок, z — наибольшая, а y — сумма остальных пяти оценок. Тогда

$$\begin{aligned} A - B &= \frac{x + y + z}{7} - \frac{y}{5} = \frac{5x - 2y + 5z}{35} \leq \frac{5x + 5z - 2((x + 1) + (x + 2) + \dots + (x + 5))}{35} = \\ &= \frac{5z - 5x - 30}{35} \leq \frac{5 \cdot 10 - 5 \cdot 0 - 30}{35} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

Для оценок экспертов 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 разность $A - B$ равна $\frac{4}{7}$. Значит, наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равно $\frac{4}{7}$.

Ответ: а) нет; б) да; в) $\frac{4}{7}$.

12. Из 40 последовательных нечётных чисел 1, 3, 5, ..., 79 выбрали 7 различных чисел, которые записали в порядке возрастания. Пусть A — четвёртое по величине среди этих чисел, а B — среднее арифметическое выбранных семи чисел.

а) Может ли $B - A$ равняться $\frac{2}{7}$?

б) Может ли $B - A$ равняться $\frac{3}{7}$?

в) Найдите наибольшее возможное значение $B - A$.

Решение.

а) Например, для чисел 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 разность $B - A$ равна

$$\frac{1+3+5+7+9+11+15}{7} - 7 = \frac{51}{7} - 7 = \frac{2}{7}.$$

б) Пусть выбраны числа a_1, a_2, \dots, a_7 . Тогда

$$B - A = \frac{a_1 + a_2 + a_3 - 6a_4 + a_5 + a_6 + a_7}{7}.$$

Заметим, что числитель этой дроби — чётное число. Значит, $B - A$ не может равняться $\frac{3}{7}$.

в) Представим выбранные числа в виде $A - c_1, A - c_2, A - c_3, A, A + d_1, A + d_2, A + d_3$, где $c_1 > c_2 > c_3 > 0$ и $0 < d_1 < d_2 < d_3$. Заметим, что числа $c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3$ — чётные, поэтому $c_1 + c_2 + c_3 \geq 6 + 4 + 2 = 12$. Поскольку $a_4 \geq 7$ и $a_7 \leq 79$, получаем:

$$d_1 + d_2 + d_3 \leq 68 + 70 + 72 = 210.$$

Значит,

$$B - A = \frac{(d_1 + d_2 + d_3) - (c_1 + c_2 + c_3)}{7} \leq \frac{210 - 12}{7} = \frac{198}{7}.$$

Для чисел 1, 3, 5, 7, 75, 77, 79 разность $B - A$ равна $\frac{198}{7}$. Значит, наибольшее возможное значение $B - A$ равно $\frac{198}{7}$.

Ответ: а) да; б) нет; в) $\frac{198}{7}$.

13. На сайте проводится опрос, кого из футболистов посетители сайта считают лучшим по итогам сезона. Каждый посетитель голосует за одного футболиста. На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округлённая до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

а) Всего проголосовало 13 посетителей сайта. Мог ли рейтинг некоторого футболиста быть равным 29?

б) Пусть посетители сайта отдавали голоса за одного из трёх футболистов. Могла ли сумма рейтингов быть больше 100?

в) На сайте отображалось, что рейтинг некоторого футболиста равен 7. Это число не изменилось и после того, как Вася отдал свой голос за этого футболиста. При каком наименьшем числе отданных за всех футболистов голосов, включая Васин голос, такое возможно?

Решение.

а) Если рейтинг футболиста на сайте равен 29, то доля голосов, отданных за него, находится в границах от 0,285 до 0,295. Поскольку всего проголосовало 13 посетителей сайта, получаем,

что количество голосов, отданных за этого футболиста, не меньше $13 \cdot 0,285 = 3,705$, но меньше $13 \cdot 0,295 = 3,835$. Это противоречит целочисленности количества отданных голосов.

б) Например, если за одного футболиста было отдано три голоса, а за остальных двух по два голоса, то доли голосов, отданных за этих футболистов, равны $\frac{3}{7} = 0,428\dots$ и $\frac{2}{7} = 0,285\dots$ соответственно. Значит, их рейтинги равны 43, 29 и 29 соответственно. Сумма этих чисел превосходит 100.

в) Пусть проголосовало N посетителей сайта, включая Васю, среди которых k предпочли того же футболиста, что и Вася. Условие задачи выполняется тогда и только тогда, когда N и k удовлетворяют системе неравенств

$$\begin{cases} \frac{6,5}{100} \leq \frac{k}{N} < \frac{7,5}{100}, \\ \frac{6,5}{100} \leq \frac{k-1}{N-1} < \frac{7,5}{100}; \end{cases} \begin{cases} 13N \leq 200k < 15N, \\ 13N + 187 \leq 200k < 15N + 185; \end{cases} \quad 13N + 187 \leq 200k < 15N.$$

Значит, $13N + 187 < 15N$; $N \geq 94$.

Пусть $N = 94 + x$, где x — неотрицательное целое число. Тогда

$$1409 + 13x \leq 200k < 1410 + 15x.$$

Имеем $k \geq 8$, поэтому $1600 < 1410 + 15x$; $x \geq 13$; $N = 94 + x \geq 107$.

Для чисел $N = 107$ и $k = 8$ выполнено условие задачи. Значит, наименьшее число, удовлетворяющее условию задачи, — это 107.

Ответ: а) нет; б) да; в) 107.

14. На сайте проводится опрос, кого из 146 футболистов посетители сайта считают лучшим по итогам сезона. Каждый посетитель голосует за одного футболиста. На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округлённая до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

а) Всего проголосовало 13 посетителей сайта, и рейтинг первого футболиста стал равен 31. Увидев это, Вася отдал свой голос за другого футболиста. Чему теперь равен рейтинг первого футболиста?

б) Вася проголосовал за некоторого футболиста. Могла ли после этого сумма рейтингов всех футболистов уменьшиться не менее чем на 30?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма рейтингов всех футболистов?

Решение.

а) Если рейтинг футболиста на сайте равен 31, то доля голосов, отданных за него, находится в границах от 0,305 до 0,315. Поскольку всего проголосовало 13 посетителей сайта, получаем, что количество голосов, отданных за этого футболиста, не меньше $13 \cdot 0,305 = 3,965$, но меньше $13 \cdot 0,315 = 4,095$, то есть равно 4. После того, как Вася проголосовал, доля голосов за первого футболиста стала равна $\frac{4}{14} = 0,285\dots$. Значит, его рейтинг стал равен 29.

б) Пусть за 145 футболистов было отдано по одному голосу, а за оставшегося — 55. В этом случае 145 футболистов имеют рейтинг 1, а последний — 28; сумма рейтингов равна 173. Если Вася отдаст свой голос за последнего футболиста, то его рейтинг останется равным 28, а рейтинги всех остальных футболистов станут равны 0. В этом случае сумма рейтингов станет равна 28, то есть уменьшится на 145.

в) Заметим, что для каждого из 146 футболистов доля отданных за него голосов, выраженная в процентах, отличается от рейтинга не более чем на 0,5. Поэтому сумма рейтингов всех футболистов отличается от 100 не более чем на $0,5 \cdot 146 = 73$. В частности, эта сумма не может превосходить 173.

Пример, приведённый в предыдущем пункте, показывает, что сумма рейтингов может равняться 173. Значит, наибольшее значение суммы рейтингов всех футболистов — это 173.

Ответ: а) 29; б) да; в) 173.

15. Про некоторый набор, состоящий из 11 различных натуральных чисел, известно, что сумма любых двух различных чисел этого набора меньше суммы любых трёх различных чисел этого набора.

а) Может ли одним из этих чисел быть число 3000?

б) Может ли одним из этих чисел быть число 16?

в) Какое наименьшее возможное значение может принимать сумма чисел такого набора?

Решение.

а) Например, набор чисел 3000, 3001, 3002, ..., 3010 содержит число 3000 и удовлетворяет условию задачи.

б) Занумеруем числа в порядке возрастания: a_1, a_2, \dots, a_{11} . Если среди этих чисел есть число 16, то выполнены неравенства $a_1 \leq 16$, $a_2 + 8 \leq a_{10}$, $a_3 + 8 \leq a_{11}$. Складывая эти неравенства, получаем:

$$a_1 + a_2 + 8 + a_3 + 8 \leq 16 + a_{10} + a_{11}; \quad a_1 + a_2 + a_3 \leq a_{10} + a_{11}.$$

Последнее полученное неравенство противоречит условию задачи. Значит, среди чисел нет числа 16.

в) Аналогично предыдущему пункту можно показать, что в наборе нет чисел, меньших 17. Следовательно, 17, 18, ..., 27 — это наименьшие возможные значения первого, второго, ..., одиннадцатого чисел из набора.

Рассмотрим набор 17, 18, ..., 27. Сумма любых трёх чисел этого набора не меньше $17 + 18 + 19 = 54$, а сумма любых двух не превосходит $26 + 27 = 53$. Значит, этот набор удовлетворяет условию и имеет наименьшую сумму чисел среди таких наборов. Эта сумма равна 242.

Ответ: а) да; б) нет; в) 242.

16. Задумано несколько (не обязательно различных) натуральных чисел. Эти числа и все их возможные суммы (по 2, по 3 и т.д.) выписывают на доске в порядке неубывания. Если какое-то число n , выписанное на доске, повторяется несколько раз, то на доске оставляется одно такое число n , а остальные числа, равные n , стираются. Например, если задуманы числа 1, 3, 3, 4, то на доске будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

а) Приведите пример задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 3, 6, 9, 12, 15.

б) Существует ли пример таких задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23?

в) Приведите все примеры задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 47.

Решение.

а) Для задуманных чисел 3, 3, 3, 3, 3 на доске будет записан набор 3, 6, 9, 12, 15.

б) Поскольку задуманные числа натуральные, наименьшее число в наборе — это наименьшее из задуманных чисел, а наибольшее число в наборе — это сумма всех задуманных чисел. Среди чисел записанного набора должна быть сумма всех чисел, кроме наименьшего, то есть $23 - 1 = 22$. Но этого числа нет в наборе, поэтому не существует примера таких задуманных чисел, для которого на доске будет выписан набор из условия.

в) Число 8 — наименьшее число в наборе — является наименьшим из задуманных чисел, а наибольшее число в наборе — это сумма всех задуманных чисел. Поэтому количество задуманных чисел не превосходит целой части числа $\frac{47}{8}$, то есть 5.

Кроме того, числа 9 и 10 меньше, чем сумма двух восьмёрок, поэтому они также являются задуманными. Значит, сумма оставшихся задуманных чисел равна $47 - 8 - 9 - 10 = 20$. Таким образом, так как наименьшее задуманное число равно 8, оставшиеся задуманные числа — это 10 и 10 или 20 (если бы 20 получалось как $8 + 12$ или $9 + 11$, то были бы выписаны числа 12 или 11, но их нет).

Для задуманных чисел 8, 9, 10, 10, 10 и 8, 9, 10, 20 на доске будет записан набор, данный в условии.

Ответ: а) 3, 3, 3, 3, 3; б) нет; в) 8, 9, 10, 10, 10 или 8, 9, 10, 20.

17. Задумано несколько целых чисел. Набор этих чисел и их все возможные суммы (по 2, по 3 и т.д.) выписывают на доску в порядке неубывания. Например, если задуманы числа 2, 3, 5, то на доске будет выписан набор 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10.

а) На доске выписан набор $-9, -6, -4, -3, -1, 2, 5$. Какие числа были задуманы?

б) Для некоторых различных задуманных чисел в наборе, выписанном на доске, число 0 встречается ровно 5 раз. Какое наименьшее количество чисел могло быть задумано?

в) Для некоторых задуманных чисел на доске выписан набор. Всегда ли по этому набору можно однозначно определить задуманные числа?

Решение.

а) Если было задумано 4 числа или более, то на доске должно быть записано не менее 15 чисел. Если было задумано 2 числа или меньше, то на доске должно быть записано не более 3 чисел. Значит, было задумано 3 числа. Если бы было задумано 2 положительных числа, то на доске было бы выписано не менее трёх положительных чисел. Значит, положительное число одно, и это число — наибольшее число в наборе, то есть 5. Наименьшее число в наборе -9 является суммой двух отрицательных задуманных чисел. Из отрицательных выписанных чисел только -6 и -3 дают в сумме -9 . Значит, были задуманы числа $-6, -3$ и 5 .

б) Рассмотрим различные задуманные числа, среди которых нет нуля. Пусть для этих чисел в наборе на доске оказалось ровно k нулей. Если добавить к задуманным числам нуль, то на доске окажется ровно $2k + 1$ нулей: k нулей, получающихся как суммы ненулевых задуманных чисел, k нулей, получающихся как суммы ненулевых задуманных чисел и задуманного нуля, и задуманный нуль. Таким образом, если среди задуманных чисел есть нуль, то в наборе на доске окажется нечётное количество нулей.

Пусть задумано четыре или меньше ненулевых числа. Нуль получается тогда, когда сумма некоторого количества положительных чисел равна по модулю сумме некоторого количества отрицательных чисел. Одно задуманное число даёт одну сумму; два различных задуманных числа одного знака дают три различные суммы; три различных задуманных числа дают семь сумм, среди которых не более двух (задуманное число, наибольшее по модулю, и сумма двух других задуманных чисел) совпадают. Значит, среди сумм положительных и отрицательных чисел совпадают по модулю не более трёх. Таким образом, если было задумано не более четырёх различных ненулевых чисел, то на доске окажется не более трёх нулей.

Аналогично, если было задумано не более трёх различных ненулевых чисел, то на доске окажется не более одного нуля. Значит, если было задумано не более четырёх различных чисел, среди которых есть нуль, то на доске окажется не более трёх нулей.

Если были задуманы числа $-3; 0; 1; 2; 3$, то на доске окажется ровно пять нулей. Значит, наименьшее количество задуманных чисел — 5.

в) Нет, не всегда. Например, для задуманных чисел $-3, 1, 2$ и $-2, -1, 3$ на доске будет выписан один и тот же набор $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

Ответ: а) $-6, -3, 5$; б) 5; в) нет.

18. По кругу в некотором порядке по одному разу написаны числа от 9 до 18. Для каждой из десяти пар соседних чисел нашли их наибольший общий делитель.

а) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители равны 1?

б) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители попарно различны?

в) Какое наибольшее количество попарно различных наибольших общих делителей могло при этом получиться?

Решение.

а) Да, могло. Например, если числа записаны в порядке 9, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 18, 17, 10.

б) Всего по кругу записано 10 чисел. Для каждой пары соседних чисел мы ищем наибольший общий делитель, следовательно, получим 10 наибольших общих делителей. Если они все попарно различны, то хотя бы один из них не меньше 10. Но такого быть не может, так как для данных чисел наибольший из всевозможных наибольших общих делителей есть $\text{НОД}(18, 9) = 9$.

в) Числа 11, 13 и 17 являются простыми, наибольшие общие делители этих чисел со всеми остальными числами равняются 1. Каждое из чисел имеет двух соседей, следовательно, хотя бы два числа из этих трёх будут иметь по крайней мере одного соседа, отличного от этих трёх чисел. Таким образом, хотя бы четыре из всех наибольших общих делителей будут равняться 1, то есть совпадать. Следовательно, не может быть больше, чем семь попарно различных наибольших общих делителей, поскольку всего их десять, причем четыре совпадают. Для расстановки 9, 18, 12, 16, 14, 13, 11, 17, 10, 15 получается ровно 7 попарно различных наибольших общих делителей.

Ответ: а) да; б) нет; в) 7.

19. а) Приведите пример такого натурального числа n , что числа n^2 и $(n + 24)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100.

б) Сколько существует трёхзначных чисел n с указанным в пункте а) свойством?

в) Сколько существует двузначных чисел m , для каждого из которых существует ровно 36 трёхзначных чисел n , таких, что n^2 и $(n + m)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100?

Решение.

а) Например, $n = 13$. Имеем $13^2 = 169$, $(13 + 24)^2 = 37^2 = 1369$. Эти числа дают остаток 69 при делении на 100.

б) Пусть n^2 и $(n + 24)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100. Тогда число $(n + 24)^2 - n^2 = 24(2n + 24) = 48(n + 12)$ должно делиться на 100. Это будет выполнено тогда и только тогда, когда $n + 12$ делится на 25. Значит, все искомые n имеют вид $n = 25p + 13$, где p — натуральное число, и удовлетворяют неравенствам $100 \leq n < 1000$. Решая неравенства относительно p , получаем $4 - \frac{13}{25} \leq p < 40 - \frac{13}{25}$, $p = 4, 5, \dots, 39$ — ровно 36 различных решений, каждому из которых соответствует единственное искомое число n .

в) Пусть n^2 и $(n + m)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100. Тогда число $(n + m)^2 - n^2 = m(2n + m)$ должно делиться на 100. Наибольший общий делитель d чисел m и 100 может равняться 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 или 50. Чтобы $m(2n + m)$ делилось на 100 необходимо и достаточно, чтобы число $2n + m$ делилось на $\frac{100}{d}$.

Если $d = 1, 5$ или 25 , то m нечётно и таких n не существует. Если m чётно, то для некоторого натурального k имеем $m = 2k$ и условию удовлетворяют те и только те трёхзначные n , для которых $2(n + k)$ делится на $\frac{100}{d}$.

При $d = 2$ и $d = 4$ таких n существует ровно 36, так как подходящими будут те и только те n , при которых $n + k$ делится на 25 (решение аналогично решению из пункта б). При $d = 10, d = 20, d = 50$ таких чисел n будет существенно больше, так как подойдут все трёхзначные числа, для которых $n + k$ делится на 10. Значит, условию задачи удовлетворяют чётные двузначные числа m , не кратные 5. Так как чётных двузначных чисел существует 45 и 9 из них кратно 5, то подходящих чисел m существует ровно 36.

Ответ: а) например, 13; б) 36; в) 36.

20. а) Чему равно число способов записать число 1193 в виде

$$1193 = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0,$$

где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$?

б) Существуют ли 10 различных чисел N таких, что их можно представить в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$, где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$ ровно 120 способами?

в) Сколько существует чисел N таких, что их можно представить в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$, где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$ ровно 120 способами?

Решение.

Каждое число $0 \leq a_i \leq 99$ однозначно представляется в виде $a_i = 10b_i + c_i$, где $0 \leq b_i \leq 9$ и $0 \leq c_i \leq 9$ ($i = 0; 1; 2; 3$). Значит, для каждого представления некоторого числа N в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$ имеет место единственное представление N в виде $N = 10n + m$, где $n = b_3 \cdot 10^3 + b_2 \cdot 10^2 + b_1 \cdot 10 + b_0$ и $m = c_3 \cdot 10^3 + c_2 \cdot 10^2 + c_1 \cdot 10 + c_0$ — произвольные целые числа от 0 до 9999. Число способов записать число N в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$ равно числу способов записать число N в виде $N = 10n + m$.

а) Для представления числа 1193 в виде $1193 = 10n + m$ в качестве n можно взять любое целое число от 0 до 119. При этом $m = 1193 - 10n$ определено однозначно. Таким образом, искомое число способов равно 120.

б) Повторяя рассуждения предыдущего пункта, несложно показать, что каждое из чисел от 1190 до 1199 представимо в требуемом виде ровно 120 способами.

в) Рассмотрим представление некоторого числа N в виде $N = 10n + m$, где n и m — некоторые целые числа от 0 до 9999. Представим m в виде $m = 10k + l$, где l — цифра единиц числа m , а k — некоторое целое число от 0 до 999. Тогда выполнено:

$$N = 10n + 10k + l; \quad N - l = 10(n + k); \quad \frac{N - l}{10} = n + k.$$

Найдём все числа K , представимые ровно 120 способами в виде $K = n + k$, где n — некоторое целое число от 0 до 9999, а k — некоторое целое число от 0 до 999.

Пусть для некоторого числа K представления $K = n_1 + k_1$ и $K = n_2 + k_2$ таковы, что n_1 — наименьшее возможное n , а n_2 — наибольшее возможное n . Тогда $n_1 = 0$ или $k_1 = K - n_1 = 999$, иначе бы было представление $K = (n_1 - 1) + (k_1 + 1)$. Аналогично, $n_2 = 9999$ или $k_2 = K - n_2 = 0$.

Заметим, что для любого целого n_0 такого, что $n_1 < n_0 < n_2$, имеется представление $K = n_0 + k_0$, поскольку $0 \leq n_1 < n_0 < n_2 \leq 9999$, $0 \leq k_2 < k_0 < k_1 \leq 999$. Таким образом, количество представлений равно $n_2 - n_1 + 1$. Если $n_1 = 0$; $n_2 = 9999$ или $k_1 = 999$, $k_2 = 0$, то представлений больше. Значит, или $n_1 = 0$; $n_2 = 119$; $k_2 = 0$; $K = 119$; $N = 1190 + l$, или $n_2 = 9999$; $n_1 = 9880$; $k_1 = 999$; $K = 10879$; $N = 108790 + l$, где l — произвольная цифра. Таким образом, искомое количество чисел равно 20.

Ответ: а) 120; б) да; в) 20.

Задания для самостоятельного решения

- В числе 30 239 545 вычеркнули три цифры так, что получившееся число делится на 22.
 - Приведите пример какого-нибудь одного получившегося числа.
 - Укажите все возможные получившиеся числа и докажите, что других таких чисел нет.
- Натуральное трёхзначное число при делении на 16 и на 5 даёт равные ненулевые остатки, а его первая цифра слева является средним арифметическим двух других цифр.
 - Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
 - Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.
- Натуральное число, большее 2200, но меньшее 3000, делится на каждую свою цифру. Все цифры этого числа различны и не равны нулю.
 - Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
 - Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.

4. Пятизначное число делится на 22, а любые две соседние цифры этого числа отличаются на 3.
- Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
 - Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.
5. Сумма цифр чётного трёхзначного числа на 1 меньше их произведения.
- Приведите пример какого-нибудь одного такого числа.
 - Укажите все возможные такие числа и докажите, что других таких чисел нет.
6. Каждый из группы учащихся сходил в кино или в театр, при этом возможно, что кто-то из них мог сходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не более $\frac{4}{5}$ от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было не более $\frac{3}{10}$ от общего числа учащихся группы, посетивших кино.
- Могло ли быть в группе 11 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 22 учащихся?
 - Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 22 учащихся?
 - Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительных условий пунктов *a* и *б*?
7. Моток верёвки режут без остатка на куски длиной не меньше 75 см, но не больше 80 см (назовём такие куски стандартными).
- Некоторый моток верёвки разрезали на 15 стандартных кусков, среди которых есть куски разной длины. На какое наибольшее число одинаковых стандартных кусков можно было бы разрезать тот же моток верёвки?
 - Найдите такое наименьшее число l , что любой моток верёвки, длина которого больше l см, можно разрезать на стандартные куски.
8. Имеется 10 карточек. На них записывают по одному каждое из чисел 1, -2, -3, 4, -5, 6, 7, -9, 10, -11. Карточки переворачивают и перемешивают. На их чистых сторонах заново пишут по одному каждое из чисел 1, -2, -3, 4, -5, 6, 7, -9, 10, -11. После этого числа на каждой карточке складывают, а полученные десять сумм перемножают.
- Может ли в результате получиться 0?
 - Может ли в результате получиться 1?
 - Какое наименьшее целое неотрицательное число может в результате получиться?
9. Максим должен был перемножить два двузначных числа (числа с нуля начинаться не могут). Вместо этого он просто приписал одно из чисел справа к другому, получив четырёхзначное число, которое оказалось в N раз (N — натуральное число) больше правильного результата.
- Могло ли N равняться 2?
 - Могло ли N равняться 10?
 - Каково наибольшее возможное значение N ?
10. На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 27 (каждое число поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и меньшего.
- Могли ли все полученные разности быть не меньше 14?
 - Могли ли все полученные разности быть не меньше 13?
 - Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k ?

11. Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов от 1 до 15 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок.

а) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $\frac{2}{45}$?

б) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $\frac{2}{35}$?

в) Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания.

12. Из 25 последовательных нечётных чисел 1, 3, 5, ..., 49 выбрали 9 различных чисел, которые записали в порядке возрастания. Пусть A — пятое по величине среди этих чисел, а B — среднее арифметическое выбранных девяти чисел.

а) Может ли $B - A$ равняться $\frac{1}{9}$?

б) Может ли $B - A$ равняться $\frac{2}{9}$?

в) Найдите наибольшее возможное значение $B - A$.

13. На сайте проводится опрос, кого из футболистов посетители сайта считают лучшим по итогам сезона. Каждый посетитель голосует за одного футболиста. На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округлённая до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

а) Всего проголосовало 15 посетителей сайта. Мог ли рейтинг некоторого футболиста быть равным 41?

б) Пусть посетители сайта отдавали голоса за одного из трёх футболистов. Могло ли быть так, что все три футболиста получили разное число голосов, но их рейтинги одинаковы?

в) На сайте отображалось, что рейтинг некоторого футболиста равен 3. Это число не изменилось и после того, как Вася отдал свой голос за этого футболиста. При каком наименьшем числе отданных за всех футболистов голосов, включая Васин голос, такое возможно?

14. На сайте проводится опрос, кого из футболистов посетители сайта считают лучшим по итогам сезона. Каждый посетитель голосует за одного футболиста. На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округлённая до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

а) Всего проголосовало 15 посетителей сайта, и рейтинг некоторого футболиста был равен 47. Увидев это, Вася отдал свой голос за этого футболиста. Чему теперь равен рейтинг этого футболиста?

б) Пусть посетители сайта отдавали голоса за одного из трёх футболистов. Могла ли сумма рейтингов быть меньше 100?

в) На сайте отображалось, что рейтинг некоторого футболиста равен 6. После того, как Вася отдал свой голос за этого футболиста, его рейтинг на сайте стал равен 8. При каком наибольшем числе отданных за всех футболистов голосов, включая Васин голос, такое возможно?

15. Про некоторый набор, состоящий из 15 различных натуральных чисел, известно, что сумма любых двух различных чисел этого набора меньше суммы любых трёх различных чисел этого набора.

а) Может ли одним из этих чисел быть число 2015?

б) Может ли одним из этих чисел быть число 24?

в) Какое наименьшее возможное значение может принимать сумма чисел такого набора?

16. Задумано несколько (не обязательно различных) натуральных чисел. Эти числа и их все возможные суммы (по 2, по 3 и т. д.) выписывают на доску в порядке неубывания. Если какое-то число n , выписанное на доску, повторяется несколько раз, то на доске оставляется одно такое число n , а остальные числа, равные n , стираются. Например, если задуманы числа 1, 3, 3, 4, то на доске будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
- а) Приведите пример задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- б) Существует ли пример таких задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22?
- в) Приведите все примеры задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 29.
17. Задумано несколько целых чисел. Набор этих чисел и их все возможные суммы (по 2, по 3 и т. д.) выписывают на доску в порядке неубывания. Например, если задуманы числа 2, 3, 5, то на доске будет выписан набор 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10.
- а) На доске выписан набор $-3, -1, 1, 2, 3, 4, 6$. Какие числа были задуманы?
- б) Для некоторых различных задуманных чисел в наборе, выписанном на доске, число 0 встречается ровно 5 раз. Какое наименьшее количество чисел могло быть задумано?
- в) Для некоторых задуманных чисел на доске выписан набор. Всегда ли по этому набору можно однозначно определить задуманные числа?
18. По кругу в некотором порядке по одному разу написаны числа от 10 до 21. Для каждой из двенадцати пар соседних чисел нашли их наибольший общий делитель.
- а) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители равны 1?
- б) Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители попарно различны?
- в) Какое наибольшее количество попарно различных наибольших общих делителей могло при этом получиться?
19. а) Приведите пример такого натурального числа n , что числа n^2 и $(n + 16)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 200.
- б) Сколько существует трёхзначных чисел n с указанным в пункте а) свойством?
- в) Сколько существует двузначных чисел m , для каждого из которых существует ровно 36 трёхзначных чисел n , таких, что n^2 и $(n + m)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 200?
20. а) Чему равно число способов записать число 1595 в виде
- $$1595 = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0,$$
- где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$?
- б) Существуют ли 10 различных чисел N таких, что их можно представить в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$, где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$, ровно 160 способами?
- в) Сколько существует чисел таких, что их можно представить в виде $N = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$, где числа a_i — целые, $0 \leq a_i \leq 99$, $i = 0; 1; 2; 3$, ровно 160 способами?

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. В июле планируется взять кредит на сумму 6 409 000 рублей. Условия его возврата таковы:
– каждый январь долг возрастает на 12,5% по сравнению с концом предыдущего года;
– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
Сколько рублей нужно платить ежегодно, чтобы кредит был полностью погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?

Решение.

Пусть сумма кредита составляет $S = 6\,409\,000$ рублей, а ежегодные выплаты x рублей. По условию долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, \frac{9}{8}S - x, \left(\frac{9}{8}\right)^2 S - \left(\frac{9}{8}x + x\right) = 0,$$

$$\text{откуда } x = \frac{\left(\frac{9}{8}\right)^2 S}{\frac{17}{8}} = \frac{9^2 \cdot 6\,409\,000}{17 \cdot 8} = 3\,817\,125 \text{ руб.}$$

Ответ: 3 817 125 руб.

2. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
– каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 2,16 млн рублей.
Сколько млн рублей было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года)?

Решение.

Пусть сумма кредита составляет S млн рублей, а ежегодные выплаты $x = 2,16$ млн рублей. По условию долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, 1,2S - x, 1,2^2 S - (1,2x + x), 1,2^3 S - (1,2^2 x + 1,2x + x) = 0,$$

$$\text{откуда } S = \frac{(1,2^3 - 1)x}{1,2^3 \cdot (1,2 - 1)} = \frac{728 \cdot 2,16}{1728 \cdot 0,2} = 4,55 \text{ млн рублей.}$$

Ответ: 4,55 млн руб.

3. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100 000 рублей. Условия его возврата таковы:
– каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.
Найдите число r , если известно, что кредит был полностью погашен за два года, причём в первый год было переведено 55 000 рублей, а во второй год – 69 000 рублей.

Решение.

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$. По условию долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$100\,000, (100\,000k - 55\,000), 100\,000k^2 - 55\,000k - 69\,000 = 0,$$

откуда $100k^2 - 55k - 69 = 0$. Решая квадратное уравнение, получаем $k = 1,15$ или $k = -0,6$. Последнее решение не удовлетворяет условию задачи. Значит, $r = 15$.

Ответ: 15.

4. В июле планируется взять кредит на сумму 5 005 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 – каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
 – с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
 На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?

Решение.

Пусть сумма кредита составляет $S = 5\,005\,000$ рублей, ежегодные выплаты в случае погашения кредита за 3 года составляют x рублей, а в случае погашения кредита за 2 года — y рублей. По условию долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, 1,2S - x, 1,2^2S - (1,2x + x), 1,2^3S - (1,2^2x + 1,2x + x) = 0,$$

откуда $x = \frac{1,2^3 \cdot (1,2 - 1)S}{1,2^3 - 1} = \frac{1728 \cdot 0,2 \cdot 5\,005\,000}{728} = 2\,376\,000$ рублей. В этом случае придётся отдать 7 128 000 рублей.

Если отдавать погасить кредит двумя равными платежами, то долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, 1,2S - y, 1,2^2S - (1,2y + y) = 0,$$

откуда $y = \frac{1,2^2 S}{2,2} = \frac{1,44 \cdot 5\,005\,000}{2,2} = 3\,276\,000$ рублей. В этом случае придётся отдать 6 552 000 рублей, то есть на 576 000 рублей меньше, чем в предыдущем случае.

Ответ: 576 000 руб.

5. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
 – каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 – с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
 Найдите число r , если известно, что если каждый год выплачивать по 1 464 100 рублей, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 2 674 100 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года.

Решение.

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$ сумма кредита составляет S рублей, ежегодные выплаты в случае погашения кредита за 4 года составляют $x = 1\,464\,100$ рублей, а в случае погашения кредита за 2 года — $y = 2\,674\,100$ рублей. По условию долг перед банком (в рублях) в случае погашения долга за 4 года по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, kS - x, k^2S - (kx + x), k^3S - (k^2x + kx + x), k^4S - (k^3x + k^2x + kx + x) = 0,$$

$$\text{откуда } S = \frac{(k^4 - 1)x}{k^4(k - 1)}.$$

Если отдавать кредит двумя равными платежами, то долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, kS - y, k^2S - (ky + y) = 0,$$

$$\text{откуда } S = \frac{(k + 1)y}{k^2} \text{ рублей. Таким образом, получаем } \frac{(k^4 - 1)x}{k^4(k - 1)} = \frac{(k + 1)y}{k^2}, \text{ откуда}$$

$$k^2x + x = k^2y; k^2 = \frac{x}{y - x} = 1,21; k = 1,1; r = 10.$$

Ответ: 10.

6. В июле планируется взять кредит на сумму 1 300 000 рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
- На какое минимальное количество лет можно взять кредит при условии того, чтобы ежегодные выплаты были не более 350 000 рублей?

Решение.

Посмотрим, каким образом, будет изменяться долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль, если ежегодно платить по 350 000 рублей:

$$1\,300\,000, 1\,080\,000, 838\,000, 571\,800, 278\,980,$$

то есть пятым платежом, равным 306 878 рублей, кредит будет полностью погашен.

Ответ: 5.

7. 15 июля планируется взять кредит на сумму 900 000 рублей. Условия его возврата таковы:
- 31-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить некоторую часть долга.
- На какое минимальное количество месяцев можно взять кредит при условии того, чтобы ежемесячные выплаты были не более 100 000 рублей?

Решение.

Заметим, что меньше, чем за 10 месяцев погасить не удастся, поскольку за 9 месяцев суммарно будет выплачено не более 900 000 рублей, что покроет первоначальную сумму долга, но не процентов. Будем считать, что долг на 15-е число каждого месяца уменьшается по сравнению с предыдущим месяцем. За 10 месяцев долг составит не более, чем $1,01^{10} \cdot 900\,000 \leq 995\,000$ рублей, то есть возрастёт не более, чем на 95 000 рублей, а, значит, десятый платёж полностью погасит кредит.

Ответ: 10.

8. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.
- Сколько млн рублей составила общая сумма выплат после погашения кредита?

Решение.

По условию долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$5, 4,5, 4, \dots, 1, 0,5, 0.$$

По условию каждый январь долг возрастает на 20%. Значит, последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова:

$$6, 5,4, \dots, 1,2, 0,6.$$

Таким образом, первый платёж должен уменьшить долг с 6 млн рублей до 4,5 млн рублей, то есть он составит 1,5 млн рублей, и так далее.

Следовательно, выплаты (в млн рублей) должны быть следующими:

$$1,5, 1,4, \dots, 0,7, 0,6.$$

Всего следует выплатить $1,5 + 1,4 + \dots + 0,7 + 0,6 = \frac{10 \cdot 2,1}{2}$ (млн рублей).

Ответ: 10,5.

9. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 6 млн рублей на некоторый срок. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.

На какой минимальный срок следует брать кредит, чтобы наибольший годовой платёж по кредиту не превысил 1,8 млн руб.?

Решение.

Пусть кредит взят на n лет. По условию долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$6, \frac{6(n-1)}{n}, \dots, \frac{6 \cdot 2}{n}, \frac{6}{n}, 0.$$

По условию каждый январь долг возрастает на 20%. Значит, последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова:

$$7,2, \frac{7,2(n-1)}{n}, \dots, \frac{7,2 \cdot 2}{n}, \frac{7,2}{n}.$$

Следовательно, наибольшая выплата составляет $7,2 - \frac{6(n-1)}{n} = 1,2 + \frac{6}{n}$. Получаем, $1,2 + \frac{6}{n} \leq 1,8$, откуда $n \geq 10$.

Ответ: 10.

10. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 16 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 38 млн рублей?

Решение.

Пусть кредит планируется взять на n лет. Долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$16, \frac{16(n-1)}{n}, \dots, \frac{16 \cdot 2}{n}, \frac{16}{n}, 0.$$

По условию, каждый январь долг возрастает на 25%, значит, последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова:

$$20, \frac{20(n-1)}{n}, \dots, \frac{20 \cdot 2}{n}, \frac{20}{n}.$$

Следовательно, выплаты (в млн рублей) должны быть следующими:

$$4 + \frac{16}{n}, \frac{4(n-1) + 16}{n}, \dots, \frac{4 \cdot 2 + 16}{n}, \frac{4 + 16}{n}.$$

Всего следует выплатить

$$16 + 4 \left(\frac{n}{n} + \frac{n-1}{n} + \dots + \frac{2}{n} + \frac{1}{n} \right) = 16 + 2(n+1) \text{ (млн рублей).}$$

Общая сумма выплат равна 38 млн рублей, поэтому $n = 10$.

Ответ: 10.

11. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 28 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший годовой платеж составит 9 млн рублей?

Решение.

Пусть кредит планируется взять на n лет. Долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$28, \frac{28(n-1)}{n}, \dots, \frac{28 \cdot 2}{n}, \frac{28}{n}.$$

По условию, каждый январь долг возрастает на 25%, значит, последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова:

$$35, \frac{35(n-1)}{n}, \dots, \frac{35 \cdot 2}{n}, \frac{35}{n}.$$

Следовательно, выплаты (в млн рублей) должны быть следующими:

$$7 + \frac{28}{n}, \frac{7(n-1) + 28}{n}, \dots, \frac{7 \cdot 2 + 28}{n}, \frac{7 + 28}{n}.$$

Получаем: $7 + \frac{28}{n} = 9$, откуда $n = 14$. Значит, всего следует выплатить

$$28 + 7 \left(1 + \frac{13}{14} + \dots + \frac{2}{14} + \frac{1}{14} \right) = 28 + 7 \cdot \frac{15}{2} = 80,5 \text{ (млн рублей)}.$$

Ответ: 80,5 млн рублей.

12. 15-го января планируется взять кредит в банке на 19 месяцев. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 30% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

Решение.

Пусть сумма кредита равна S . По условию, долг перед банком по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$S, \frac{18S}{19}, \dots, \frac{2S}{19}, \frac{S}{19}, 0.$$

Первого числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$. Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда последовательность размеров долга на 1-ое число каждого месяца такова:

$$kS, \frac{18kS}{19}, \dots, \frac{2kS}{19}, \frac{kS}{19}.$$

Следовательно, выплаты должны быть следующими:

$$(k-1)S + \frac{S}{19}, \frac{18(k-1)S + S}{19}, \dots, \frac{2(k-1)S + S}{19}, \frac{(k-1)S + S}{19}.$$

Всего следует выплатить

$$S + S(k-1) \left(1 + \frac{18}{19} + \dots + \frac{2}{19} + \frac{1}{19} \right) = S(1 + 10(k-1)).$$

Общая сумма выплат на 30% больше суммы, взятой в кредит, поэтому

$$10(k-1) = 0,3; \quad k = 1,03; \quad r = 3.$$

Ответ: 3.

13. Производство некоторого товара облагалось налогом в размере t_0 рублей за единицу товара. После того как государство, стремясь увеличить сумму налоговых поступлений, увеличило налог вдвое (до $t_1 = 2t_0$), сумма налоговых поступлений не изменилась. На сколько процентов государству следует изменить налог после этого, чтобы добиться максимальных налоговых сборов, если известно, что при налоге равном t рублей за единицу товара объём производства товара составляет $10\,000 - 2t$ единиц, если это число положительно?

Решение.

Заметим, что налоговые сборы составляют $f(t) = t(10\,000 - 2t) = 10\,000t - 2t^2$ рублей при $t < 5000$. Графиком функции $y = f(t)$ является парабола, ветви которой направлены вниз. При этом $f(t_0) = f(2t_0)$, значит, функция $f(t)$ достигает своего максимума при $t = \frac{3t_0}{2}$. Поскольку $\frac{3t_0}{2}$ составляет 75% от $2t_0$, государству следует понизить налог на 25%.

Ответ: 25.

14. Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $3t$ единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $4t$ единиц товара. За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей. Григорий готов выделять 5 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

Решение.

Допустим, что на заводе, расположенном в первом городе, рабочие трудятся x^2 часов, а на заводе, расположенном во втором городе, y^2 часов. Тогда в неделю будет произведено $3x + 4y$ единиц товара, а затраты на оплату труда составят $500(x^2 + y^2)$ рублей. В этом случае нужно найти наибольшее значение $Q = 3x + 4y$ при условии $500(x^2 + y^2) = 5\,000\,000$.

Выразим y через x :

$$x^2 + y^2 = 10\,000; \quad y^2 = 10\,000 - x^2; \quad y = \sqrt{10\,000 - x^2}.$$

Значит, нам нужно найти наибольшее значение функции $Q(x) = 3x + 4\sqrt{10\,000 - x^2}$ при $0 \leq x \leq 100$. Для этого найдем производную функции $Q(x)$:

$$Q'(x) = 3 - \frac{4x}{\sqrt{10\,000 - x^2}}.$$

Найдем точки экстремума:

$$Q'(x) = 0; \quad 3 = \frac{4x}{\sqrt{10\,000 - x^2}};$$

$$3\sqrt{10\,000 - x^2} = 4x; \quad 90\,000 - 9x^2 = 16x^2; \quad x^2 = 3600,$$

то есть $x = 60$ — единственная точка экстремума, удовлетворяющая условию $0 \leq x \leq 100$. Найдем значения функции в найденной точке и на концах отрезка:

$$Q(60) = 500, \quad Q(100) = 300, \quad Q(0) = 400.$$

Наибольшее значение $Q(x)$ равно 500, значит, наибольшее количество единиц товара равно 500.

Ответ: 500.

15. Строительство нового завода стоит 75 млн рублей. Затраты на производство x тыс. ед. продукции на таком заводе равны $0,5x^2 + x + 7$ млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + x + 7)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении p строительство завода окупится не более чем за 3 года?

Решение.

Прибыль фирмы (в млн рублей) за один год выражается как

$$px - (0,5x^2 + x + 7) = -0,5x^2 + (p - 1)x - 7.$$

Это выражение является квадратным трехчленом и достигает своего наибольшего значения при $x = p - 1$. Наибольшее значение равно $\frac{(p-1)^2}{2} - 7$. Строительство завода окупится не более чем за 3 года, если

$$\frac{(p-1)^2}{2} - 7 \geq \frac{75}{3}; \quad (p-1)^2 \geq 64; \quad (p-9)(p+7) \geq 0,$$

то есть при $p \geq 9$, поскольку цена продукции не может быть отрицательной. Таким образом, наименьшее значение $p = 9$.

Ответ: 9.

16. В начале 2015 года Алексей приобрёл ценную бумагу за 20 000 рублей. В конце каждого года стоимость бумаги возрастает на 3000 рублей. В начале любого года Алексей может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 10%. В начале какого года Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через пятнадцать лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей?

Решение.

Заметим, что Алексей должен продать ценную бумагу в начале того года, на который 10% от имеющейся на счёте суммы превысит 3000 рублей, поскольку в этом случае доход от денег на счёте будет превосходить доход от ценной бумаги. Это произойдёт, когда стоимость бумаги превзойдёт $\frac{3000}{0,1} = 30\,000$ (рублей). Это случится через 4 года после покупки ценной бумаги. Таким образом, надо продать бумагу в начале 2019 года.

Ответ: 2019.

17. У фермера есть два поля, каждое площадью 10 гектаров. На каждом поле можно выращивать картофель и свеклу, поля можно делить между этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет 300 ц/га, а на втором — 200 ц/га. Урожайность свеклы на первом поле составляет 200 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Фермер может продавать картофель по цене 5000 рублей за центнер, а свеклу — по цене 6000 рублей за центнер. Какой наибольший доход может получить фермер?

Решение.

Заметим, что на первом поле с одного гектара можно собрать либо 300 центнеров картофеля и получить 150000 рублей, либо 200 центнеров свеклы и получить 120000 рублей. Таким образом, нужно всё первое поле отдать под картофель. На втором поле с одного гектара можно собрать либо 200 центнеров картофеля и получить 100000 рублей, либо 300 центнеров свеклы и получить 180000 рублей. Поэтому второе поле нужно целиком отдать под свеклу.

В этом случае фермер сможет заработать $10 \cdot 300 \cdot 5000 + 10 \cdot 300 \cdot 6000 = 33\,000\,000$ (рублей).

Ответ: 33 млн рублей.

18. В двух областях есть по 1000 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи $10x$ кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи $10y$ кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда.

Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель, причём 1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно добыть в двух областях суммарно для нужд промышленности?

Решение.

Поскольку не важно, какой металл добывать, а важно добытое количество, то в первой области нужно добывать только алюминий, потому что за час работы рабочие добывают его больше. Таким образом, в первой области будет добываться 1000 кг алюминия в день.

Во второй области можно добыть $10x$ кг алюминия и $10y$ кг никеля, причём $x^2 + y^2 = 5000$. При этом условии выражение $10x + 10y$ достигнет наибольшего значения, если $x = y = 50$. Это можно увидеть, например, построив на координатной плоскости множество точек $x^2 + y^2 = 5000$, являющееся дугой окружности, и заметив, что для прямых вида $10x + 10y = a$, пересекающих это множество, наибольшее значение a будет в случае, когда прямая касается дуги окружности, что достигается в точке, для которой $x = y = 50$. В этом случае будет добыто 500 кг алюминия и 500 кг никеля.

Таким образом, наибольшее количество добытого металла равно 2000 кг.

Ответ: 2000 кг.

19. На каждом из двух комбинатов изготавливают детали А и В. На первом комбинате работает 200 человек, и один рабочий изготавливает за смену 10 деталей А или 5 деталей В. На втором комбинате работает 100 человек, и один рабочий изготавливает за смену 5 деталей А или 10 деталей В.

Оба эти комбината поставляют детали на комбинат, из которых собирают изделие, для изготовления которого нужно 2 детали А и 3 детали В. При этом комбинаты договариваются между собой изготавливать детали так, чтобы можно было собрать наибольшее количество изделий. Сколько изделий при таких условиях может собрать комбинат за смену?

Решение.

На первом комбинате за смену может быть изготовлено $10x$ деталей А и $1000 - 5x$ деталей В, где $0 \leq x \leq 200$. На втором — $5y$ деталей А и $1000 - 10y$ деталей В, где $0 \leq y \leq 100$.

Нам нужно, чтобы детали А и В были произведены в отношении 2:3 (если отношение будет отличаться от этого, то можно отправить часть рабочих, изготовивших избыточные детали, на изготовление других деталей и, таким образом, увеличить количество изготовленных изделий). Таким образом, получаем $30x + 15y = 2000 - 10x + 2000 - 20y$, откуда $40x + 35y = 4000$; $8x + 7y = 800$, причём максимальное количество деталей будет изготовлено, если число $10x + 5y$ максимально. Поскольку $x = 100 - 0,875y$, получаем, что нужно достичь максимума выражения $1000 - 3,75y$, что достигается при наименьшем неотрицательном значении y , при котором x не превосходит 200. Таким образом, $y = 0$, $x = 100$. В этом случае будет изготовлено 1000 деталей А и 1500 деталей В, из которых можно собрать 500 изделий.

Ответ: 500.

20. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нём отель. В отеле могут быть стандартные номера площадью 30 квадратных метров и номера «люкс» площадью 40 квадратных метров. Общая площадь, которую можно отвести под номера, составляет 500 квадратных метров. Предприниматель может поделить эту площадь между номерами различных типов, как хочет. Обычный номер будет приносить отелю 1000 рублей в сутки, а номер «люкс» — 1500 рублей в сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет заработать в сутки на своём отеле предприниматель?

Решение.

Заметим, что на площади 120 квадратных метров можно разместить 4 стандартных номера или 3 номера «люкс». В первом случае номера будут приносить отелю 4000 рублей в сутки, а во втором 4500 рублей. Поэтому стандартных номеров должно быть не более трёх, иначе предприниматель мог бы заменить 4 таких номера на 3 номера «люкс» и заработать больше.

Если в отеле нет стандартных номеров, то в нём можно разместить 12 номеров «люкс» и зарабатывать 18000 рублей в сутки.

Если в отеле один стандартный номер, то в нём можно разместить 11 номеров «люкс» и зарабатывать 17500 рублей в сутки.

Если в отеле два стандартных номера, то в нём можно разместить 11 номеров «люкс» и зарабатывать 18500 рублей в сутки.

Если в отеле три стандартных номера, то в нём можно разместить 10 номеров «люкс» и зарабатывать 18000 рублей в сутки.

Таким образом, наибольшая заработанная в сутки сумма денег равна 18500 рублям.

Ответ: 18500 рублей.

Задания для самостоятельного решения

1. В июле планируется взять кредит на сумму 8 052 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.Сколько рублей нужно платить ежегодно, чтобы кредит был полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?
2. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 1,4641 млн рублей.Сколько млн рублей было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?
3. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.Найдите число r , если известно, что кредит был полностью погашен за два года, причём в первый год было переведено 66 000 рублей, а во второй год — 58 000 рублей.
4. В июле планируется взять кредит на сумму 4 026 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?
5. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.Найдите число r , если известно, что если каждый год выплачивать по 777 600 рублей, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 1 317 600 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года.

6. В июле планируется взять кредит на сумму 1 300 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 — каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
 — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
 На какое минимальное количество лет можно взять кредит при условии того, чтобы ежегодные выплаты были не более 300 000 рублей?
7. 15 июля планируется взять кредит на сумму 800 000 рублей. Условия его возврата таковы:
 — 31-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 — со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить некоторую часть долга.
 На какое минимальное количество месяцев можно взять кредит при условии того, чтобы ежемесячные выплаты были не более 200 000 рублей?
8. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 10 млн рублей на 5 лет. Условия его возврата таковы:
 — каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
 — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 — в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.
 Сколько млн рублей составила общая сумма выплат после погашения кредита?
9. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 8 млн рублей на некоторый срок. Условия его возврата таковы:
 — каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
 — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 — в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.
 На какой минимальный срок следует брать кредит, чтобы наибольший годовой платёж по кредиту не превысил 3,6 млн руб.?
10. Производство некоторого товара облагалось налогом в размере t_0 рублей за единицу товара. После того как государство, стремясь увеличить сумму налоговых поступлений за счёт увеличения производства товара, уменьшило налог вдвое (до $t_1 = \frac{t_0}{2}$), сумма налоговых поступлений не изменилась. На сколько процентов государству следует изменить налог после этого, чтобы добиться максимальных налоговых сборов, если известно, что при налоге, равном t рублей за единицу товара, объём производства товара составляет $10\,000 - 2t$ единиц, если это число положительно?
11. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 12,5 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
 — каждый январь долг возрастает на 12% по сравнению с концом предыдущего года;
 — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 — в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
 На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 26 млн рублей?
12. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
 — каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
 — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 — в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
 Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наименьший годовой платеж составит 1,25 млн рублей?

13. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 4,5 млн рублей на срок 9 лет. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
- Найдите r , если известно, что наибольший годовой платеж по кредиту составит не более 1,4 млн рублей, а наименьший — не менее 0,6 млн рублей.
14. В июле планируется взять кредит в банке на 19 лет. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
- Найдите r , если известно, что наибольший годовой платеж по кредиту втрое больше наименьшего.
15. 15-го января планируется взять кредит в банке на 15 месяцев. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 120% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .
16. 15-го января планируется взять кредит в банке на 24 месяца. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- Какую сумму следует взять в кредит, чтобы общая сумма выплат после полного его погашения равнялась 1 млн рублей?
17. Бизнесмены Алексей и Николай каждый планируют 15-го июля взять кредит в банке на сумму 1 млн рублей на 36 месяцев (3 года). Условия возврата кредита у Алексея таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- Условия возврата кредита у Николая таковы:
- каждый январь долг возрастает на 12% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
- Кто из двух бизнесменов суммарно заплатит банку больше и на сколько?
18. 15-го января планируется взять кредит в банке на 36 месяцев (3 года). Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- Какую сумму следует взять в кредит, чтобы общая сумма выплат за последний год (последние 12 месяцев) равнялась 2,26 млн рублей?

19. Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $4t$ единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят $3t$ единиц товара. За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 300 рублей. Григорий готов выделять 507 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?
20. Строительство нового завода стоит 72 млн рублей. Затраты на производство x тыс. ед. продукции на таком заводе равны $0,5x^2 + 3x + 20$ млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 3x + 20)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении p строительство завода окупится не более чем за 6 лет?
21. В начале 2015 года Алексей приобрёл ценную бумагу за 32 000 рублей. В конце каждого года стоимость бумаги возрастает на 2500 рублей. В начале любого года Алексей может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 5%. В начале какого года Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через пятнадцать лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей?
22. У фермера есть два поля, каждое площадью 10 гектаров. На каждом поле можно выращивать картофель и свеклу, поля можно делить между этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет 500 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Урожайность свеклы на первом поле составляет 200 ц/га, а на втором — 500 ц/га. Фермер может продавать картофель по цене 5000 рублей за центнер, а свеклу — по цене 8000 рублей за центнер. Какой наибольший доход может получить фермер?
23. В двух областях есть по 160 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,3 кг никеля. Во второй области для добычи $10x$ кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи $10y$ кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда. Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель, причём 1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно добыть в двух областях суммарно для нужд промышленности?
24. На каждом из двух комбинатов изготавливают детали А и В. На первом комбинате работает 400 человек, и один рабочий изготавливает за смену 5 деталей А или 15 деталей В. На втором комбинате работает 100 человек, и один рабочий изготавливает за смену 15 деталей А или 5 деталей В. Оба эти комбината поставляют детали на комбинат, из которых собирают изделие, для изготовления которого нужно 2 детали А и 1 деталь В. При этом комбинаты договариваются между собой изготавливать детали так, чтобы можно было собрать наибольшее количество изделий. Сколько изделий при таких условиях может собрать комбинат за смену?
25. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нём отель. В отеле могут быть стандартные номера площадью 25 квадратных метров и номера «люкс» площадью 30 квадратных метров. Общая площадь, которую можно отвести под номера, составляет 350 квадратных метров. Предприниматель может поделить эту площадь между номерами различных типов, как хочет. Обычный номер будет приносить отелю 1000 рублей в сутки, а номер «люкс» — 1300 рублей в сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет заработать в сутки на своём отеле предприниматель?

1.1. Тригонометрические уравнения

1. а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{4\pi}{3}.$ 2. а) $\pi k;$
 $k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-3\pi; -\frac{9\pi}{4}; -2\pi.$ 3. а) $\pm\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}.$
 4. а) $\arctg\frac{12}{5} + \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $5\pi + \arctg\frac{12}{5}.$ 5. а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{3\pi}{2}.$ 6. а) $2\pi n,$
 $n \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi.$ 7. а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{5\pi}{2}; \frac{13\pi}{4}; \frac{7\pi}{2}.$
 8. а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{5\pi}{3}; -\frac{4\pi}{3}.$ 9. а) $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{5\pi}{6}.$
 10. а) $2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $0; \frac{\pi}{3}.$

1.2. Показательные уравнения

1. а) $-\frac{1}{2}; 7;$ б) $-\frac{1}{2}.$ 2. а) $3; 1 + \log_3 5;$ б) $1 + \log_3 5.$ 3. а) $1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2};$ б) $1 + \sqrt{2}.$
 4. а) $-3; \frac{1}{4};$ б) $\frac{1}{4}.$ 5. а) $-2; \frac{1}{3};$ б) $\frac{1}{3}.$ 6. а) $-3; -\frac{1}{3}; 1;$ б) $-\frac{1}{3}.$ 7. а) $-\log_3 7; -\log_3 5;$
 б) $-\log_3 7.$ 8. а) $-\log_3 \frac{3}{2}; \log_3 \frac{3}{2};$ б) $-\log_3 \frac{3}{2}.$ 9. а) $\log_3 2; \frac{3}{4};$ б) $\log_3 2.$

1.3. Логарифмические уравнения

1. а) $-2; 1;$ б) $1.$ 2. а) $-7; 4;$ б) $-7.$ 3. а) $-4; 3;$ б) $-4.$ 4. а) $-1; -\frac{1}{2};$ б) $-\frac{1}{2}.$ 5. а) $-7;$
 $1;$ б) $-7.$ 6. а) $-4; 7;$ б) $7.$ 7. а) $-\frac{3}{4}; 63;$ б) $63.$ 8. а) $3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5};$ б) $3 - \sqrt{5}.$ 9. а) $\frac{4}{3}; \frac{5}{3};$
 б) $\frac{5}{3}.$ 10. а) $-3; -1; 1; 3;$ б) $-1.$

1.4. Комбинированные уравнения

1. а) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{3}.$ 2. а) $\pm\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}; -\frac{5\pi}{3}.$ 3. а) $\frac{\pi}{2} + \pi n,$
 $n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{3}; \frac{5\pi}{2}.$ 4. а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{9\pi}{2}; \frac{19\pi}{4}; \frac{11\pi}{2}.$ 5. а) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{5\pi}{3}; -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}.$ 6. а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k,$
 $k \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}.$ 7. а) $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{23\pi}{4}; \frac{27\pi}{4}; \frac{31\pi}{4}.$ 8. а) $\frac{\pi k}{2},$
 $k \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi; \frac{5\pi}{2}; 3\pi; \frac{7\pi}{2}.$ 9. а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-3\pi; -\frac{8\pi}{3}; -2\pi.$
 10. а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{9\pi}{4}.$ 11. а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $0; \frac{2\pi}{3}.$ 12. а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k,$
 $k \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{25\pi}{4}; \frac{19\pi}{3}.$ 13. а) $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi k,$
 $k \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{4}; -\frac{5\pi}{3}.$ 14. а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{4}.$ 15. а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 б) $\frac{2\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}.$

2.1. Рациональные неравенства

1. $(-2; \frac{2}{3})$, $[\frac{7}{6}; 3]$. 2. $[-\frac{4}{3}; -1)$, $(-1; \frac{4}{3}]$, $[2; +\infty)$. 3. $(-\infty; 3]$, $[4; 5)$. 4. $[1; \sqrt{2}]$.
5. $[3; +\infty)$. 6. $(-1; -\frac{\sqrt{6}}{3})$, $[\frac{\sqrt{6}}{3}; 1)$. 7. $[-2; 2]$. 8. $(-\infty; -1]$, $[0; \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{7}-1}{2}]$. 9. $[-3; -\frac{5}{2}]$,
 $[3; +\infty)$. 10. $(-\infty; -3)$, $(-3; 0]$, $[\frac{\sqrt{145}-1}{2}; +\infty)$. 11. $(-\infty; 0)$, $[\frac{5}{6}; +\infty)$. 12. $[-3,5; -3)$,
 $(1; 1,5]$. 13. $[-\frac{6}{5}; \frac{2}{5}]$. 14. $(-4; -1]$, 0 , $[3; +\infty)$. 15. $[-3,5; 1,75]$.

Тренировочная работа

1. $(-2; -\frac{1}{3})$, $[\frac{1}{10}; \frac{3}{2}]$. 2. $(-\infty; -\frac{3}{2}]$, $[-1; 1)$, $(1; \frac{3}{2}]$. 3. $[-6; -5)$, $[-\frac{9}{2}; +\infty)$.
4. $[-2\sqrt{7}; 2]$. 5. $[-\frac{9}{2}; +\infty)$. 6. $(-1; -\frac{\sqrt{3}}{2})$, $[\frac{\sqrt{3}}{2}; 1)$. 7. $[-\frac{1}{2}; 3]$. 8. $(-\infty; -2]$, $[-1; -\frac{1}{2})$,
 $(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{7}-3}{2}]$. 9. $(-\infty; 2]$, $[\frac{9}{2}; 5]$. 10. $(-\infty; -\frac{9+3\sqrt{15}}{2})$, $[-\frac{3\sqrt{10}+6}{2}; 0)$, $(0; +\infty)$.
11. $(-\infty; 0)$, $[\frac{1}{2}; +\infty)$. 12. $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}]$, $[\frac{2}{3}; \frac{3}{2})$. 13. $[-\frac{8}{3}; \frac{2}{3}]$. 14. $(-\infty; -1]$, 0 , $[2; 6)$. 15. $[-2; 5]$.

2.2. Логарифмические неравенства

1. $(-3; -2,5)$, $(-2; -1,5)$, $[-\frac{4}{3}; -1)$, $(-\frac{1}{3}; 0]$. 2. $[-3; 2)$. 3. $[\frac{1}{81}; \frac{1}{\sqrt[16]{3}}]$. 4. $(0; \frac{1}{64}]$, $[\frac{1}{4}; 16]$.
5. $(-\infty; -2)$, $(4; \frac{11}{2}]$. 6. $(0; 0,2]$, $[25; +\infty)$. 7. $[\frac{1}{64}; \frac{1}{2}]$, $(1; +\infty)$. 8. $(-\infty; -2)$, $(-2; -\sqrt{2})$,
 $[-\frac{5}{4}; -1)$, $(1; \sqrt{2})$. 9. $(2; 3)$, $(3; +\infty)$. 10. $(\frac{\sqrt{21}-3}{2}; 1)$, $(1; 2]$.

Тренировочная работа

1. $(-\infty; -1)$, $(0; \frac{1}{6})$, $[\frac{3}{2}; +\infty)$. 2. $[-1; 4)$. 3. $[\frac{1}{9}; \frac{1}{\sqrt[8]{3}}]$. 4. $[\frac{1}{8}; \frac{1}{2}]$, $[4; +\infty)$. 5. $(-\infty; -3)$,
 $[\frac{9}{7}; 2)$. 6. $(0; \sqrt{3}]$, $[9; +\infty)$. 7. $(1; \sqrt{5}]$, $[5; +\infty)$. 8. $(-\infty; -2)$, $(-2; -\sqrt{3})$, $[-\frac{3}{2}; -\sqrt{2})$,
 $(\sqrt{2}; \sqrt{3})$. 9. $(-2; -1)$, $(-1; +\infty)$. 10. $(-\frac{1+\sqrt{17}}{4}; -1)$, $[3; +\infty)$.

2.3. Показательные неравенства

1. $[-4; 2]$. 2. $(-\infty; -3]$, $(-2; \log_2 \frac{3}{14}]$, $(-1; +\infty)$. 3. $(-\infty; 0]$, 2 , $(\frac{5}{2}; 4]$. 4. $[-1; 0)$, $(0; 1)$.
5. $(-\infty; -3]$, $[\frac{9}{2}; 6)$. 6. $(0; 2]$. 7. $(-\infty; -2]$, $[1; 3]$, $[5; +\infty)$. 8. $(-2; \frac{1}{3})$. 9. $(0; \log_3 5]$, $[2; +\infty)$.
10. $[-2; 3]$.

Тренировочная работа

1. $[-9; -3]$. 2. $(-\infty; 3)$, $(4; \log_2 \frac{56}{3}]$, $[5; +\infty)$. 3. $[-8; -5)$, -4 , $[0; +\infty)$. 4. $[-2; -1)$, $(-1; 0)$. 5. $[-\frac{3}{8}; \frac{1}{2})$, $[1; +\infty)$. 6. $(0; 1]$. 7. $(-\infty; -4]$, $[1; 10]$, $[11; +\infty)$. 8. $(-\frac{1}{2}; 6)$. 9. $(-1; 0)$, $(\log_8 3; +\infty)$. 10. $[-1,5; 1,5]$.

2.4. Системы неравенств

1. $[-\log_5 5; -2)$, $(-2; 0)$, $(0; 2)$, $[3; +\infty)$. 2. $(0; \frac{1}{8}]$, $[\frac{1}{4}; \log_5 2]$. 3. $[-2; -1)$, $[-\frac{1}{2}; 0)$, $(0; 1)$. 4. $(-\frac{5}{2}; -2]$. 5. $(2; \log_2 5]$. 6. -2 , $(2; \frac{5}{2}]$. 7. $(\frac{8}{3}; 3)$. 8. -1 , 0 , $[4; \frac{3+\sqrt{29}}{2}]$. 9. -2 , $[\frac{1}{2}; 1]$. 10. 0 , $[\log_3 8; 2)$, $(2; 4]$. 11. $[\frac{17}{9}; 2)$. 12. -2 , 0 , $[4; 6)$. 13. -6 , $(3; 4)$. 14. $(0; 1)$, $(2; 3)$. 15. $(-2; -1)$.

3. Задания с параметром

1. $a = \frac{2}{3}$, $a = \frac{3}{4}$. 2. $\frac{4}{7} < a \leq \frac{7}{10}$. 3. $a = 0$, $a \geq 3$. 4. $a \leq -\frac{1}{24}$. 5. $a = 1$, $a = 3$. 6. $a = 3$, $a = 7$. 7. $a = 1$, $x = -1$. 8. $-2 < a < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < a < 3$. 9. $a < -3$, $\frac{3}{2} < a < 6$, $a > 6$. 10. $-\frac{5}{7} < a < \frac{8}{7}$, $\frac{8}{7} < a < \frac{13}{9}$. 11. $a = -2$, $a = 0$, $a > 1$. 12. $a = 0$, $\frac{1}{5} < a \leq \frac{1}{3}$. 13. $-\frac{161}{16} \leq a \leq -5$. 14. $a \leq 7 - 2\sqrt{6}$, $7 + 2\sqrt{6} \leq a < 15$, $a > 15$. 15. $1 \leq a \leq \frac{21 - 3\sqrt{17}}{8}$. 16. $a > 1,5$. 17. $a = -10$, $x = 1$. 18. $-\frac{13}{5} \leq a \leq -\frac{9}{5}$, $1 \leq a \leq 3$. 19. $a = -\frac{2}{5}$, $a = \frac{2}{5}$. 20. $-12 < a \leq -10$, $a = -9$, $-3 \leq a < 9$. 21. $-5 \leq a < 5\sqrt{2} - 10$. 22. $-\frac{7}{4} \leq a \leq 8$. 23. $1 \leq a < 2$. 24. $-4 < a < 0$, $0 < a < 18 + 10\sqrt{5}$.

4.1. Параллелепипеды

1. $6) \sqrt{1281}$. 2. $\arccos \frac{\sqrt{2}}{6}$. 3. 8 . 4. $\arctg \sqrt{17}$. 5. $\arctg \frac{\sqrt{2}}{3}$. 6. $7\sqrt{19}$.

4.2. Призмы

1. $\frac{\sqrt{42}}{14}$. 2. $76,5$. 3. $\frac{60}{13\sqrt{217}}$. 4. $\arctg \frac{4}{3}$. 5. $\sqrt{3}$.

4.3. Треугольные пирамиды

1. $\arctg \frac{2}{3}$. 2. $\frac{\sqrt{46}}{4}$. 3. $\frac{17\sqrt{57}}{285}$. 4. $2\arctg \frac{3\sqrt{23}}{23}$. 5. $2\sqrt{10}$. 6. $\arctg \frac{\sqrt{39}}{9}$. 7. $\sqrt{39}$. 8. $\arctg \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

4.4. Четырёхугольные пирамиды

1. $2\arctg \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 2. $8 + \frac{4\sqrt{130}}{3}$. 3. $\frac{27\sqrt{11}}{110}$. 4. $2\arcsin \frac{\sqrt{17}}{5}$. 5. $\frac{32}{3}$. 6. 96 .

4.5. Тела вращения

1. $\frac{32\pi}{7}$. 2. $\arctg \frac{2\sqrt{23}}{\sqrt{13}}$. 3. $6\sqrt{5}$. 4. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. 5. $18\sqrt{2}$. 6. $\sqrt{34}$. 7. 17,5.

5.1. Планиметрические задачи (одна конфигурация с окружностью)

1. б) $\frac{54}{13}$. 2. б) $\frac{25}{2}$. 3. б) 60° . 4. б) 65. 5. б) $\frac{10}{3}\sqrt{5}$. 6. б) 50. 7. б) $9\sqrt{3}$. 8. б) $4\sqrt{178}$.

5.2. Планиметрические задачи (одна конфигурация без окружности)

1. б) 6. 2. б) $24\sqrt{3}$. 3. б) 9:40. 4. б) 9. 5. б) 10. 6. б) $\frac{1}{8}$.

5.3. Планиметрические задачи (две конфигурации)

1. $\frac{18}{11}$ или 9. 2. 4 или $\frac{15}{4}$. 3. $\frac{3}{4}$ или $\frac{15}{4}$. 4. 44 или 76. 5. 6 или 26. 6. 54 или 13,5. 7. 48 или 62. 8. 14 или 26.

6. Арифметика и алгебра

1. б) 30 294 и 30 954. 2. б) 324 и 564. 3. б) 2316, 2364, 2436 и 2916. 4. б) 69 696, 63 030 и 69 630. 5. б) 124, 142, 214 и 412. 6. а) да; б) 11; в) $\frac{10}{21}$. 7. а) 15; б) 1125. 8. а) нет; б) нет; в) 4. 9. а) да; б) нет; в) 3. 10. а) нет; б) да; в) 8. 11. а) нет; б) да; в) $\frac{8}{7}$. 12. а) нет; б) да; в) $\frac{128}{9}$. 13. а) нет; б) да; в) 115. 14. а) 50; б) да; в) 80. 15. а) да; б) нет; в) 480. 16. а) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; б) нет; в) 5, 5, 5, 6, 8 или 5, 6, 8, 10. 17. а) -3, 2, 4; б) 5; в) нет. 18. а) да; б) нет; в) 8. 19. а) например, 17; б) 36; в) 18. 20. а) 160; б) да; в) 20.

7. Экономические задачи

1. 3 110 400 руб. 2. 4,641. 3. 16. 4. 950 400 руб. 5. 20. 6. 6. 7. 5. 8. 13. 9. 5. 10. Увеличить на 50%. 11. 17. 12. 20,25 млн рублей. 13. 20. 14. 12,5. 15. 15. 16. 0,8 млн рублей. 17. Николай, на 55 000 рублей. 18. 6 млн рублей. 19. 6500. 20. 11. 21. 2023. 22. 65 млн рублей. 23. 640 кг. 24. 1500. 25. 15000 рублей.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК